



5, 404 / D





INTERPRETATIONES

CLINICAE

INTERPRETATIONES CLINICAE

OBSERVATIONUM SELECTARUM,

QUAS

EX DIARIIS SUIS ACADEMICIS

AD

PROPRIAM EPITOMEN DE CURANDIS HOMINUM MORBIS

ILLUSTRANDAM COLLEGIT

JOANNES PETRUS FRANK, M. D.


EDITIO PRIMA ITALICA.

Lib. Dr. Luigi Longo

MEDIOLANI

EX TYPOGRAPHIA JOANNIS SILVESTRI

1812.



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b29291203>

LECTORIBUS.

*M*irabantur quondam non pauci, exprobrabant aliqui, nos, etsi clinicis Institutis in quinque Academiis, per totidem fere lustra praefixos, nec illorum tamen annales evulgasse, nec medendi rationem nobis propriam exemplis publice expositis illustrasse. Nec tamen aut Boerhaavius, aut Burserius, aut Tissotus, meliori nobis exemplo fuerunt; nec si Baenius, Stollius, alique celebres scholazum medicarum antistites, cum gloria hoc dederint, nulla igitur nobis excusatio conceditur. Ac primo quidem, artis, quae his in Institutis

sequebamus, praecepta, quod ultimi hi viri non fecerant, in Epitome, quae universam morborum curandorum doctrinam amplectitur, exposuimus. Secundo, cum tirones nostri in Italia, librorum, imprimis exterorum, copia minus essent instructi, stylum illum laconicum, praelectionibus academicis praescriptum, hinc illinc deserentes, historias morborum, in ipso Instituto clinico quondam pertractatorum, non paucas illi operi, aut integras intertexuimus, aut saltem levi calamo tetigimus. Nec minor observationum nostrarum numerus, in diversis, quas seorsim publicavimus, orationibus nostris academicis prodixit [1]. Tertio, Scriptores rerum medicarum, ejusmodi in scholis occurrentium, non aliis, iis gravissimis, ut nos constanter fuimus, ab officiis distracti, interrupti, impediti fuerunt. Fateamur interim, ab aliis nos etiam rationibus, ne ejusmodi in annualibus, operam collocare ambicemus, abductos fuisse. Quodsi nempe Baenii ac Stollii

(1) Continentur istae in XII. delectus nostri opusculorum, Ticini editi, voluminibus.

[ut qui, praeter aegros Instituto clinico susceptos, nosocomii amplioris simul illos ipsi curabant] rationes, ut vocant, medendi excipiamus; ex duodecim aut viginti lectulis, in usum academicum occupatis, vel morborum epidemicorum historiae parum lucis accendi potest; aut morbos unius modo speciei, hinc instruendis in omnibus, unius anni scholastici spatio, tironibus parum accommodatos, in ejusmodi Instituta clinica suscipi oportet. Accedit et istud, quod clinices autistes, scriptoris his de rebus non ignobilis sibi vices periodice assumens, morbos ordinarios atque populares, pro discentium necessitate longe praeferendos, posthabere, rariores potius, et doctorum attentionem magis ferientes venari, ac pharmaca saeculorum auctoritate coronata, novis, plerumque tamen ephemerae celebritatis, remediis sacrificare assuescat. Sed criminationem hanc annalium scriptor clinicorum refutat, morborumque pro generali magis tironum instructione debite selectorum historias elaboret! Has quidem juvenis medica cum fructu meditabitur; viris autem in artis exercitio jam satis versatis, ra-

ri natantes in gurgite vasto videbuntur; ac medicæ incrementum scientiæ abhinc aut nullum, aut paucum sæpe erit.

Atque hæc, ne nobis ipsis magis, quam ne aliis annalium scriptoribus succederent, ad ætatem usque senilem, quæ cribro in rebus medicis transmittendis quidquam angustiore atque rariore uti solet, scripti sumus. Cum vero insignem observationum, quas vel nos ipsi instituimus, vel quas amici auditoresque nostri nobiscum communicare voluerunt, copiam percurrendi occasionem nacti sumus; inter illas non solum rariores, sed eas quoque selegimus, ex quibus major in scientiam salutarem utilitas redundet.

Sæpe vero in mentem nobis venit, auditores nostros, ex illis, quæ ad lectulos, circa morbos susceptos, vel ex propria, vel ex alicuius experientia, absque omni adfectatæ eruditionis ostentatione, extemporali potius locutione usi, adducere solebamus, messem sæpe uberiores, quam quidem primo intuitu casus nobis oblatus promittere videbatur, fecisse; atque in hac nostra docendi methodo, tirones

pretium quondam majus, quam in singularium morborum siccior ac abstracta nimis consideratione posuerunt. Credebamus igitur, historias morborum quas hic tradimus, eadem face, qua quondam ad lectulos utebamur, illustratos, ac, omissis aut facilioris indaginis, quae tirones solum respiciunt, explicationibus, aut doctis magis quam utilibus commentariis, brevi modo sed ucrvosa dictione cum epicrasi expositas, academicos Instituti clinici labores posse quodanteenus supplere; ut igitur, quod nobis, ob aetatem, ad lectulos ulterius non licet, in scriptis praestare conaremur.

In ea quidem opinione semper ex nos sumus versati: medicum jam propectae quidquam aetatis, ideo non posse ab artis exercitio sese, absque propriae laesione conscientiae subducere, quod errores in aetate juvenili, ob majoris experientiae defectum, commissi, in senili aetate resarciendi, et ea, quae caro saepe pro civibus pretio didicimus, in damni restitutionem convertenda sint. Etsi vero flebili nimis physicae fragilitatis argumento nostrum a publico artis exercitio secessum excusare

valeamus ; credimus tamen , indefessa et fidei-
corum publicatione , quae nos ad meliorem
rerum medicarum cognitionem perduxerunt , nos
posse magis , quam si paucis adhuc aegris
opem nos ipsi ferre vellemus , de humano ge-
nere mereri .

Cum vero doctrina de sedibus et causis
morborum artis medicae progressus eximie pro-
moverit ; observationes , cadaverum sectione il-
lustratas , hoc in opere primo fere loco haben-
das esse censuimus ; ac praeceptis circa mor-
borum historias circumscribendas a nobis quon-
dam propositis [1] , fideles , ut Lectorum otio ,
saepe haud multo , parceremus , brevitatis maxi-
me rationem habuimus .

Quamvis opus hoc illustrandis variis locis
Epitomes nostrae de curandis hominum morbis
destinatum sit ; modo parum tamen , in refe-
rendis observationibus , ad ordinem in illa no-
bis praescriptum , nos restringere voluimus ; sed
ubi vitam nobis viresque Superi prorogaverint ,

(1) De circumscribendis morborum historiis
oratio academica , Ticini Reg. 1791 recitata.

uni vel alteri, quae hoc primum interpretationum clinicarum volumen sequentur, libris, indiscriminatum nunc has, nunc illas, Lectorum judicio ordinandas committimus.

Cum latino magis, quam patrio idiomate utamur, nisi dignum sit, quod et ab Exteris legatur, opus nihil nos praeter justum desiderium, ne lingua viris doctis per omnem Europam quondam communior, tandem proorsus inter nos obsolescat, in propriam excusationem adducendum habemus.

Inconsultam Viennensis polyscriptoris, avidique typographi, praelectionum nostrarum, ex quorundam auditorum nostrorum calamis festinante et absque judicio decerptarum, editionem, sicuti nostro pro labore laud agnoscimus, ita bonorum omnium justo vituperio exponimus.

Dabamus Friburgi, in Brisgovia, die 15^a mensis aprilis 1811.

I N D E X.

Praefatio	<i>pag.</i>	v.
I. Febris quartana duplex rebellis, cum bal-		
neo sanata.	”	1.
II. De febribus periodicis perniciosis animad-		
versio.	”	4
III. Febris cardialgica cum typo quartanae.	”	10
IV. De febre intermittente inflammatoria.	”	13
V. Observatio prima.	”	16
VI. Observatio secunda.	”	18
VII. Observatio tertia.	”	20
VIII. Febris tertiana inflammatoria cum pleu-		
ritide.	”	22
IX. Peripneumonia periodica.	”	25
X. Observatio prima.	”	28
XI. Observatio secunda.	”	31
XII. Peripneumonia periodica asthenica.	”	39
XIII. Peripneumonia subcontinua nervosa.	”	43
XIV. Peripneumonia periodica.	”	48
XV. Pleuritis periodica.	”	50
XVI. Peripneumonia cum oesophagi ab-		
scessu.	”	53

XVII. Peripneumonia cum cesophagi tumore lethali .	» 58
XVIII. De peripneumonia exitu in gangrae- nam .	» 60
XIX. Gangraena pulmonum et musculorum thoracis.	» 62
XX. Foetor quasi gangraenosus pulmonis in- flammati .	» 67
XXI. Peripneumonia per exanthema pustu- losum judicata .	» 72
XXII. Peripneumonia copioso urinae fluxu, judicata .	» 73
XXIII. Peripneumonia undecies repetita .	» 74
XXIV. Pleurae inflammatio et gangraena .	» 79
XXV. Peripneumonia senum .	» 83
XXVI. Observatio prima .	» ibid.
XXVII. Observatio secunda .	» 88
XXVIII. Bronchitis lethalis .	» 90
XXIX. Encephalitis .	» 104
XXX. Encephalitis per erysipelas faciei ju- dicata .	» 106
XXXI. Cerebri abscessus post otitidem .	» 116
XXXII. Abscessus cerebri cum paralyti .	» 118
XXXIII. Vomitus lethalis ex encephalite .	» 129
XXXIV. De glossitide .	» 130

XXXV. Glossitis catharrhalis .	” 132
XXXVI. Glossitis cum suppuratione .	” 134
XXXVII. Glossitis cum suppuratione .	” 137
XXXVIII. Glossitis ex foliis Nicotianae ta- baci .	” 140
XXXIX. Glossitis cum gangraena .	” 144
XL. Tumor et ulcus laryngis .	” 143
XLI. Cynanche laryngea cum bronchiorum hydrope acuto .	” 154
XLII. Cynanche laryngea cum ulcere et carie .	” 158
XLIII. Cynanche faucium ulcerosa in trachei- tidem conversa .	” 168
XLIV. Scirrhus glandulae thyreoideae le- thalis .	” 176
XLV. Febris continua nervosa, Phricodes Veterum .	” 181
XLVI. Vesica urinalis lacertosa .	” 186
XLVII. Retentio urinae ureterica .	” 192
XLVIII. Retentio urinae ureterica .	” 196
XLIX. Retentio urinae cum vesicae gan- graena .	” 200
L. Vesica urinaria cordis figuram aemulans. ”	205
LI. Carcinoma vesicae urinariae .	” 210

LII. Vesica urinalis in crumenam lateralem extensa .	„ 218
LIII. Altera vesica urinalis in crumenas ex- tensa :	„ 229
LIV. Vesica urinaria in cava duo divisa .	„ 231
LV. Scirrhus vesicularum seminalium .	„ 235
LVI. Scirrhus prostatae in vesicam urinalem prominens .	„ 238
LVII. Scirrhus uteri virginei .	„ 240
LVIII. Cephalaea lethalis ex cranii vitio .	„ 245
LIX. De diabete adnotatio .	„ 251
LX. Diabetes mellitus periodum annuam obser- vans , gravissimus .	„ 253
LXI. Diabetes chylosus .	„ 257
LXII. Diabetes cum dolore pleuritico .	„ 283
LXIII. Diabetes cum enuresi .	„ 289
LXIV. Cystidis felleae dilatatio morbosa .	„ 294
LXV. Vesiculae felleae inflammatio et gan- graena .	„ 297
LXVI. De trismo infantum Tergesti ende- mico .	„ 302
LXVII. Sanguinis in cavum pectoris effusio .	„ 309
LXVIII. Dolor inguinis periodicus .	„ 318
LXIX. Carus periodicus a vermibus .	„ 324
LXX. Febris intermittens urticaria .	„ 330

LXXI. Febris intermittens urticaria .	„ 333
LXXII. Febris intermittens urticaria .	„ 337
LXXIII. Urticaria typhodes cum sphacelo.	„ 340
LXXIV. Urticaria habitualis menstrua .	„ 344
LXXV. Urticaria habitualis altera .	„ 345
LXXVI. Urticaria habitualis ex terrore re- cidiva .	„ 346
LXXVII. Urticaria habitualis coeli rigidioris soboles .	„ ibid.
LXXVIII. Urticaria tuberosa .	„ 348
LXXIX. Gangraena pedum a frigore .	„ 350

FEBRIS QUARTANA DUPLEX REBELLIS CUM
BALNEO SANATA .

Anno 1786 in clinico Instituto *Ticensi* puella degit , quae febre quartana duplici per quatuor menses laboraverat . Menstruorum fluxus huic virgini suppressus erat . Dolor ad scrobiculum cordis urgebat cum oris amaritudine . Emetica , alvum purgantia , salia diversa , resolventia omnis generis , et cum dolores quasi arthritici simul in scena essent , vesicantia , antimonialia , geum urbanum , corticem peruvianum , opium , incassum praescripsimus . *Purpura* tandem , ut vocant , rubra , comparuit in cute , febrem tamen ea sola non fugavit . Hinc tepidum ad balneum confugimus , atque tam hujus ope , tam vini antimoniatu auxilio , morbum curavimus , qui ultra tres menses aliis remediis restiterat .

EPICRISIS .

Inter quàmplurimas febres intermittentes , quae medico practico quotannis curandae veniunt , sunt quaedam , ut in *Epitomes* L. I. §. 28 p. 53 monuimus , hoc vel illo anno copiosiores , quae nos memores reddere possunt fati , quo veteres medici , ante corticis chinae notitiam , dum febribus paulo

pertinacioribus mederi debuissent, premebantur. Quare *Galenus* memorat: quod febris *quotidiana* saepe sexaginta circuitus habeat et periculosa sit; *quartana* autem medicorum scandalum vocabatur. Ut plurimum scilicet ex *quartanarum* familia sunt, quae subinde artis operam eludunt. Ipse *Sydenhamus* monuit: dari aliquos, quorum corpora, ob frequentem febris recursum, contra corticem quasi communita, salutiferam ejus vim perpetim eludant (1); et *Monrous* in epidemia *Bremensi* 1761, 1762, multas intermittentes longaevas vidit omni mendedi methodo renitentes. Talis fuit epidemia, quam *Lautterus* descripsit (2). Nos ipsi talem in *Insubria* epidemiam vidimus, in qua, etsi cortex optimae qualitatis minime defecerit, per omnes tamen ejus regionis provincias non minor quantitas ejus remedii, quam novem unciarum aegrotis, ut febre intermittente liberarentur, porrigi potuit. Summum aliquando remedium in febre rebellis est, *nullum*, praeter aeris mutationem, experiri; ac semper affinitatis, quam febris intermittens cum aliis *morbis nervosis* agnoscit, memores esse debemus. Magna hinc in utroque morbi genere est utilitas peregrinationum, pietatis gratia quondam copiosius, quam nostris temporibus institutarum. Quemadmodum vero *balnea tepida* in adfectionibus nervosis praecipuâ se virtute

(1) Epistola responsoria.

(2) Hist. med. biennalis. p. 10. 11.

commendant ; ita quoque in febre intermittente rebelli , illa utique tentari frequentius , quam solent , merentur. *Antimonialium* in febre periodica virtus , etsi multos ante annos comprobata (1), nostris tamen temporibus venenosis , ac imprimis insidiosio hominis naturae arsenico magis propitiis , plus aequo vilipenditur.

Cum vero temporum injuriâ chinae cortex aut alto nimis pretio veniat, aut multis in locis acquiri nequidem queat ; fatemur omnes, remedium , quod illum quodammodo suppleant, humano generi auro potius habendum fore. Tanta interim , seu aequalis virtutis , hucusque nos fugit febrifugum ; hinc nullum, quod experientia, multis saltem in casibus , ut efficax comprobaverit , ex praeconcepta opinione spernendum est auxilium. Revocabimus huc , inconcinnae quidem compositionis , ac hodiernae chemiae minime consonum , sed in provinciis quondam *Mantuana* ac *Venetis* communissimo in usu positum hinc publica fiducia sancitum , in febribus tertianis , remedium. Adscribitur hoc celebri quondam in urbe veneta (*Rovigo*) medico , Doctori *Calabria* , atque sub nomine *aquae amarae* hujus medici , sub formula sequente, cognitum est :

(1) Dr. *Millars* de exploratione Kermes mineralis , sive pulveris Carthusianorum , in medendo efficacia. Argentorati 1752. *Unzer* , Amburg. Magazin. viii Th. 8. 356. *Klein* , select. medicam. pag. 269.

R. Aquae cardui benedicti unc. X.

Salis amari, unc. I.

Spiritus salis ammoniaci

—— sulphuris per campan.
a gutt. XV.

Tempore apyrexiae semel iterumque propinatur adultis haec compositio.

Radicem *gri urbani*, seu *cariophyllatae*, et nos in febribus periodicis constanter vidimus inutilem. Ab egregio medico *Insubriae*, ac nosodochii incurabilium, in loco *Abbiategrosso*, physico, Doctore *Magni, geum rivale* Lin. longe majore cum successu adhibitum fuisse novimus.

DE FEBRIBUS PERIODICIS PERNICIOSIS ANIMADVERSIO.

Per viginti annos artem medicam, primum *Bitus*, in Gallia; dein, apud Germanos, *Badenae*, *Rastadii*, *Bruchsalis*, *Gettingae*, exercuimus; atque toto hoc tempore, etsi insignem febrium intermittentium numerum tractaverimus, *perniciosam* tamen *periodicam*, praeter tertianam *apoplecticam* unicam, prope rheni paludes, in pago *Huttenheim*, Spirensis ditionis loco, a nobis a secunda accessione, sanatam, ac praeter *algidam*, *Rastadii* tractatam, ac primo jam insultu lethalem, nullam conspeximus. In Italiam transvecti, ac ibidem decem fere per annos inter morbos innumeros versati, frequens nobis febrium reapse perniciosarum omnis generis, in Insubria hinc illinc inter

paludes et campos oryzae colendae dicatos endemiarum ac epidemice aliquando furientium, observandarum occasio fuit; atque brevem quidem, sed succinctam istarum descriptionem in *Epitomes* L. I. §. 35. dedimus. *Vindobonae*, in Austria, duo fere per lustra medicinam docentes, quamvis circa paludes, ab inundationibus Danubii productas, magnus intermittentium numerus succrescat, rariores tamen *perniciosae* sunt, ac praeter unam, et quidem *tertianam amauroticam*, quam anno 1804 in clinico Instituto feliciter sanavimus, nullam vel hoc in loco, vel ipsa in metropoli, tractavimus. Quatuor per annos tum in *Litvania*, tum *Petropoli*, Professoris clinici officio fungentes, perniciosas quidem his in regionibus non prorsus inauditas esse percepimus; nullas tamen illinc aut vidimus, aut nos ipsi tractavimus. Atqui dum perniciosarum historiis a summo viro, *Tortio*, a *Mortono*, *Werlhofio*, *Casimiro Medico*, aliisque, ac nupperrime ab egregio *Aliberto* (1), expositis, nihil hic supperaddere contendimus; id saltem hic monendum esse ducimus: vel illis ipsis in provinciis, quae terrificis his febribus abundant, non paucos medicos, vel nimiae culpa formidinis, vel captandis sanationis gloria et lucro, denominatione *perniciosarum* abuti. Ac de frigore quidem in febribus intermittens aliquando, in quar-

(1) *Traité des fièvres pernicieuses intermittentes*. Paris 1809.

tanis autumnalibus praeprimis, diuturno ac per plures horas extenso, jam alii cum nobis monuerunt: non semper aut calorem his *rigoribus* aequalem, aut symptomata quaecunque *maligna*, subsequi. Generaliter satis tamen admittitur, frigus febrile validius et longum, quod nullus calor aut sudor insequuntur, ad febres perniciosas, quas *algidas* vocarunt, spectare; atque sic, usus, quo feбри, ex potiore ejus symptomate, epitheton impertiri amant, ut de febre *lipothymica*, *emética*, *cardialgica*, notum est, prognosin morborum aliquando satis innocentium, cum illa perniciosorum, malignorum, non exiguo curationis nimis tumultuariæ damno, confundit. Pauca, quae reprehensionem nostram confirment, exempla referemus.

FEBRIS ALGIDA, NON PERNICIOSA.

Catharina Tagliacarne, virgo septemdecim vix annorum, optimae constitutionis, necdum tamen menstruata *die 29^a* mensis martii 1793, post meridiem, derepente per duas horas artubus doluit, postea vero *per sex horas rigore* magno prehensa fuit, qui rigor absque subsequente calore aut sudore, adventante *die 30^a*, prorsus evanuit. Matutino tempore perfecta apyrexia virgo gavisata est; ast vero eadem hora pomeridiana iterum a frigore intenso et sex per horas exporrecto, absque caloris aut sudoris satellitibus, invaditur; atque sic per quinque

dies, aequali semper typo, res incessit. *Die 5^a* aprilis 1793 aegra clinicum Institutum *Ticinense* intravit, ac vespere observatum fuit febrem vix ullam, amarorem oris nullum, nec nauseam aut vomendi conatum accusari, linguam puram et nitidam, abdomen molle esse, alvum quotidie deponi, appetitum ciborum vigere. Pustulae modo aliquae ad frontem comparent. Nihil, praeter infusum sambuci, praescribitur.

Die 6^a nec rigor, nec ulla febris observanda occurrunt.

Die 7^a Nox hesternae inquieta fuit. Rigor per tres horas magnus comparuit; pulsus erant frequentes, contracti. Cortex nunc peruvianus omni hora ad drachmam sumendus, atque haustus salinus propinantur. Nulla febris ad vesperras accessit.

Die 8^a Nox fuit placida; pulsum nunc offert naturalem, de fame conqueritur, augetur victus; in iisdem continuatur remediis.

Sic per plures adhuc dies observata, nihilque amplius morbi manifestans virgo, quin a rigore tam intenso, aut calor, aut sudor unquam essent insecuti, ac sine urinis hypostaticis, perfecte restituta, ac tandem ad suos dimissa fuit (1).

(1) *Josephus Fiocchi*, Med Doctor, aegrae adstitit, auctor historiae.

FEBRIS LIPOTHYMICA, NON PERNICIOSA.

Vincentia Giorgi, Ticinensis, annuæ aetatis decimum quintum attingens, ac necdum menstruâ instructa, vermibus ex ascaridum lumbricoidum familia ab infantiae tempore saepe saepius adfecta, duobus abhinc annis febre tertiana simplici, ob neglectam curam, per octo menses et ultra laboravit. Vires abhinc prostratae fuerunt, omneque corpus intumuit. Febris interim sponte tandem cessavit, atque auctis sensim sensimque viribus corpus simul, absque omni medicina, detumuit, et aegra, si vermium aliqua hinc inde symptomata excipias, pristinam salutem adepta est.

Nulla data occasione, haec virgo die 6^a mensis aprilis 1788, ad noctem a frigore sat intenso correpta fuit, accesserunt huic calor universalis, cephalaea, oris amaror, nausea, sitis, pruritus ad nares, pondus ad ventriculum, alvus tarda, aliquis dolor lienis, sub ejusdem attactu. Post aliquot vero horas, laxata cute ac sudore oborto, febris symptomata remiserunt, ac 7^a mensis penitus profligata fuerunt. Eadem interim hac die, post meridiem, frigus iterum summum per quatuor circiter horas invasit aegram. Hujusmodi intensum frigus, constrictionis primum ad guttur sensum, dein *lipothymiam* per tres adeo horas extensam, produxit; a calore tandem dispersam. Symptomata vermium hoc etiam sub paroxysmo hinc inde comparebant, sub sudo-

re dissipanda. Ad noctem, aliquot horarum libertas a febre successit; post dimidiam vero noctem, praecedente levi frigore, calor aegram urebat, matutino tempore per sudorem difflatus.

Die 8^a post meridiem iterum tum a frigore etsi minus violento, tum a *lipothymia*, aegra correpta fuit, manente autem sudore, haec ultima quoque dispulsa, et perfecta apyrexia secuta est. Simili vero modo, ac nycthemero elapso, leve frigus mediam ad noctem aegram invasit. *Die 9^a* clinicum Institutum haec petiit, atque cortex hic chinae ad unciam dimidiam, duabus horis sumendam, praescriptus fuit. Post meridiem, frigus moderatum, cum calore satis levi, nulla vero animi deliquia secuta sunt. Cum vero et gastrica et verminosa symptomata urgerent, pulvis rhei electi, seminisque santonici, chinae supperadditus fuit. Ad vespertas alvum deposuit et somno aegra gayisa est; sed *die 10^a* ad horam secundam matutinam, absque praecedente frigore, calor exortus est, paucas post horas per sudorem sublatus. Hora 9^a matutina, os amarum, pondus ad ventriculum, summus dolor ad caput, accusantur. Evacuans hinc alvum medicina, quae sexies effectum habuit, porrecta fuit. Post meridiem, iterum miti a febre, absque frigore, et absque lipothymia correpta fuit. Gastrica symptomata quamplurimum imminuta sunt.

Die 11^a Nocte, parva febris accessit, sudavit, bis alvum, duosque vermes ascari-

des deposuit aegra. Cortex chinae iterum porrectus fuit. Febris post meridiem eman-
sit, nec nocte quidem, qua ter alvum cum
tribus vermibus excrevit, ea accessit.

Die 12^a Iterum pulvis ex cortice, rheo,
ac cina porrigitur. Vermes duo secedunt.

Die 13^a Nulla febris. Vermis iterum ex-
cretus est; pluries alvus deposita fuit. Cor-
tex iterum solus porrigitur.

Die 14^a Parva febris hora undecimâ hoc
mane secuta, vermis unicus expulsus est.

Continuato nunc chinae cortice, febris fu-
gata, et 21^a mensis aegra, perfecte resti-
tuta, ex clinico decessit (1).

FEBRIS CARDIALGICA CUM TIPO QUARANTANAE.

Joannes Boydoson, Faber Ferrarius, 27
annorum, *Hungarus*, in loco patriae palu-
doso a febre intermittente, autumnali tem-
pore endemica, corripitur, quae primum
quidem typum intermittentis tertianae, dein
quartanae, ac tandem quotidianae servabat.
Frigus sub paroxysmo erat intensissimum,
calor levis, sed sudor copiosus. Durabat haec
febris circiter per sex menses cui amara si-
ne effectu opposuit. Cessabat tandem sponte
quotidiana, et post octiduum aeger, timens
lienis obstructionem, huic febrî saepius il-

(1) *Joannes de Piccioli*, Med. Doct., posthinc
Veneti status protomedicus, ante annum ex phthi-
si pulmonali defunctus, historiam morbi con-
texuit.

line pedissequam, spiritus vini camphorati uncias circiter duas, ter in die, pro dosi hausit. Tertia die hujus usus, magnus *ventriculi dolor et constrictio* per totum fere nycthemerum continuarunt. Quinque abhinc annis, paroxysmus *die jovis et lunae*, cum materiae mucosae, flavescentis, frequente per alvum depositione ac dolore abdominis, redibat. Tempore apyrexiae, si parvam interdum oppressionem a pastu excipiamus, perfecta aegrotus libertate gaudēbat. *Die 2^a junii*, 1801, vehementior accessit paroxysmus. Sumit aeger sal amarum, unde alvus, quinquies, absque levamine, solvitur. Nosocomium *Viennense* tunc petitur, ex quo, *die junii 12^a*, pro Instituto clinico electus, sequentia sub ipso paroxysmo symptomata nobis exhibuit:

Compagem corporis sat firmam, cephalaeam, linguam siccam, sitim magnam, ructus, borborygmos, dolorem, tensionem, constrictionis sensum ad ventriculum, ab attactu non auctum, anxietatem, copiosam descriptae materiae per alvum ejectionem, urinas subrubras, turbidas, lassitudinem, cutem aridam, anserinam, pulsus frequentes, debiles, sudorem copiosum.

Die 14^a ad vesperras, quo febris accessionem averteremus, aquae menthae uncias quatuor, aquae cinnamomi vinosae unciam dimidiam, ac tincturae anodynae viginti guttas, de quibus aeger omni hora unciam semissem assumeret, praescripsimus.

Die *Lunae aut* 15^a, mane paroxysmus febrilis, sed mitior, accedit cum descriptis symptomatibus. Exhibentur extracti taraxaci, et arcani duplicati, in aquae unciis septem solutorum, aa drachmae duae.

Vespere hucusque aeger quinque modo cardialgiae insultus, ac totidem alvi depositiones mucosas, flavescentes, cum torminibus passus est. Calor erat adauctus, pulsus quidquam irritati sunt.

Die 16^a a paroxysmo liber est. Praescriptus est pulvis seminum phellandrii aquatici ad scrupulum unum, quem pulverem omni bihorio assumat.

Die 17^a nulla febris occurrit, neque cardialgia comparet.

Die *Jovis aut* 18^a, mane. Ab hora quinta ad octavam; aeger ter insultum cardialgicum, absque aliis febris symptomatibus, expertus est; alvum bis liquidam deposuit. Vespere sine doloribus ad cardiam ac sine diarrhoea, quam optime se habet.

Die 19^a levis dolor ad ventriculum comparet, a quo ter alvus deposita fuit.

Die 21^a, hora quinta matutina insultus subintrat cardialgicus, ac alvus frequenter deponitur.

Die 22^a, seu die *lunae*, quatuor cardialgiae insultus accedunt, sub quibus toties alvus liquida, paucis sanguine commista, deposita fuit. Cum igitur nullum aeger a phellandrio fructum perciperet, corticis peruviani flavi drachma dimidia, omni trihorio repetenda, praescripta; praeter hanc

vero, aquae menthae unciae tres, aetheris sulphurici guttae viginti, de quibus unciam dimidiam singulos post pulveres hauriat, traditae fuerunt.

Diebus 23^a et 24^a nec cardialgia, nec diarrhoea subsunt.

Die jovis, seu 25^a, pro prima vice, nec cardialgia, nec alvi profluvium comparuit.

Diebus 26^a, 27^a, 28^a, nihil morborum observavimus; alvum aeger compactam deposuit.

Die lunae seu 29^a altera jam vice a paroxysmo liber est aeger, nec dolorem ad cardiam, nec diarrhoeam percipit. Per aliquot adhuc dies amaris aeger usus, ac tandem sanatus ad suos dimissus est (1).

DE FEBRE INTERMITTENTE INFLAMMATORIA.

De febris *intermittentis* indole aliquando *inflammatoria*, vernali tempore imprimis occurrente, per venaesectionem cum evacuantibus alvum remediis, absque corticis peruviani usu felicius sananda, ac in *Epitomes* nostrae de curandis hominum morbis, libro I. §§. 66-71, exposita, dubia quaedam mota fuerunt (2); ac notum est, a *Brunone*

(1) *Joannes Scharcher*, Med. Candidatus, historiam morbi exaravit.

(2) *Jenaische allgemeine Literaturzeitung* 1794. No: 212. p. 820. » Unmöglich können wir dem » Verfasser Beyfall geben, wenn er behauptet,

omnem intermittentis naturae febrim, soli *astheniae* adscriptam fuisse. Cum diversis in Europae regnis ac provinciis artem medicam per novem lustra exercuerimus, fatebimur quidem, indolem febrium periodicarum in multis locis, coelo minus benigno instructis, praecipue apud illos, qui frugali magis victu, et pro potu, non tam vino, quam cerevisia utuntur, raro esse *energicam*. Convenimus adeo, vel sub coelo etiam magis tepido, aut calido, has febres vernales, uno magis anno, quam altero, prout nempe genius morborum diversus dominatur, frequentius aut rarius vestem sanguineam induere; sed certe in *rhenanis* provinciis felicioribus, praecipue vero in *Italia*, verno tempore magis sicco atque nunc tepido, nunc vero frigidiusculo, dum omnis hiberno e somno natura reviviscitur, frequens nobis fuit has febres, vere, ut vocant *inflammatorias*, seu *energicas* observandi occasio.

Quod vero nihil hac in re docuerimus, nisi quod et propriae et aliorum experientiae innixum sit; tum paucis aliquot observationibus, quas facile augere possemus, hic confirmabimus; tum virorum in arte medica clarorum testimonio illustrabimus. Sic *Donaldus Monro*, tam in *Anglia*,

„ dass *Frühlingswechsel Fieber* selten nur der Fie-
 „ herrinde bedürfen, und dass man sie welt öf-
 „ ter mit Aderlassen und antiphlogistischen Mitteln
 „ aus dem Grunde hellen kann. „

quam in *Germania*, venaesectionis, aliquando etiam repetitae, utilitatem ac necessitatem in febribus periodicis, apud milites robustos et succi plenos, observavit, imprimis ubi fortiores essent insultus, ac ubi pulsus apyrexiae etiam tempore frequentiam majorem conservarent (1). Sic apud *Mannheimenses*, vel in ipsa febre perniciosa tetanode, quo citius ad usum corticis pervenire liceret, venam semel, et aliquando bis, cum fructu secuit *Casimir. Medicus* (2). In febribus intermittentibus pertinacioris indolis, si modo vires subsisterent nimiae, *Burserius* utilitatem venaesectionis tum ex aliorum, tum ex propria experientia, confirmavit (3). In omni certe *Italia*, praecipue meridionali, in febribus periodicis, vernalibus maxime, si vires aegrorum juvenilium superabundent, venaesectione instituitur (4). In *India occidentali*, febres intermittentes comitari solent vehementes vomitus et inflammationis symptomata, quae sibi, testante *Lindio*, sanguinis missionem requirunt (5). Similis me-

(1) Observations on the means of preserving the health of soldiers. Vol. II. p. 104, 108.

(2) Sammlung von Beobachtungen, I. Theil, §. 34.

(3) Institut. med. Vol. I. pag. 119.

(4) *Baglivi* prax. med. Lib. I. c. 2. §. 1.

(5) Vid. *Lind*, Versuche über die Krankheiten, denen Europäer in heißen Klimaten unterworfen sind.

dicorum in *Gallia* observatio est (1); nec *Germaniae* medici ab ista dissentiunt (2). Clinices *Vilnensis* nunc antistes, *Josephus Frank*, *Vindobonensis* antehac nosocomii medicus ordinarius, febrem quondam rebellem periodicam in isto nec per corticem chinae, nec per opium dispellere potuit, quam sola dein venaesectio feliciter devicit. Crebrius nos, *Bruchsalis*, verno tempore, tum febres continuas inflammatorias, una alterave sanguinis missione adhibita, in periodicas intermittentes quasi dissilire, et paucis tandem alvi evacuationibus per artem excitatis, dissipari protinus conspeximus.

Etsi vero testimonia hic allata, confirmandis illis, quae quondam docuimus, sufficerent, paucas tamen, quas in *Italia* publice instituimus observationes, eundem in finem hic subnectimus.

OBSERVATIO I.

Rusticus, annos triginta numerans, forti fibra instructus, initio mensis aprilis 1791,

(1) *Ricerii* observat. Centur. IV. num. 83. *Myron*, Ergo in febribus intermittentibus venaesectio remedium. Paris 1597. *Pietre*, Ergo inclinante febris intermittens accessione peropportuna venaesectio. Paris 1637.

(2) *Stoll*, ratio medendi P. IV. p. 493. *Werfel*, in *Hufeland's* journal der pract. Heilk. IX. B. 3. St. S. 196. Vid. *Trnka*, de febrib. intermitt. p. 322.

derepente noctis tempore a calore , per tres dies continuato , atque per largos sudores dissipato , correptus fuit. Post septem, vel octo dies , horis matutinis , horrores eum invadunt , in frigus trium horarum mutati. Calor insecutus est, ad noctem cum sudoribus absolutus. Sic per mensem quotidie a febre correptus , donec Majo mense , post assumptum remedium , quod alvum copiose eduxit , a febre simul liberatus fuit. Mense septembris nova febris , quotidiana , quindecim per dies hunc virum vexavit , iterumque evanuit.

Sub fine mensis Aprilis anni 1792 , febris denuo recrudit , ad sextam Maji mensis , eodem typo incedens. Hac die vero fortior paroxysmus accessit. Octava , febris eadem , cum vomitu , redivit , et aeger sub medio paroxysmo in clinicum Institutum *Ticinense* translatus fuit. Pulsus erant frequentes , pleni ac duri , facies rubra cum cephalaea. Urina quidem clara , sed cum urethrae ardore deposita fuit. Hypochondrium sinistrum ab attactu doluit. Decoctum radicum graminis pro potu , et cremor tartari cum exigua portione tartari emetici porrectum fuit. Ad vespertas semel alvum deposuit. Febris quidem tunc nulla ; sed pulsus adhuc duri ac pleni. Venaesectio ad uncias decem instituitur , et potio alvum laxans porrigitur. Die nona , febris nulla. Die decima , pauca. Cremor tartari cum nitro propinatur. Die undecima , febris mini-

me accessit, atque sic in integrum fugata fuit (1).

OBSERVATIO II.

Joannes Modolli, juvenis 19 annorum, robustus, duris laboribus adsuetus, haemorrhagiae narium frequenter, nec minus Bacchi imperio subjectus, aestate praelapsa, a febre intermittente correptus fuit, quae, institutis aliquoties venaesectionibus, corticisque peruviani administrationi cessit. Hoc a tempore perfecta gavisus est valetudine, excepto, quod aliquoties in hebdomada sanguis e naribus prorumperet.

Die 20^a mensis martii; versus meridiem, interno a frigore, tres per horas extenso, invaditur hic juvenis. Excipitur illud a calore, per reliquum diei, et per integram noctem protenso, largo tandem sudore cutem inundante.

Die 22^a, mane, nulla febris, versus meridiem vero frigus denuo revertitur, calore ac sudore iterum terminandum.

Die 23^a, apyrexia; sub meridiem vero eadem redierunt symptomata. Vespere, pulsus pleni, duriusculi, nullus capitis dolor, tussis aut dyspnoea nulla, os minime amarum, alvus bene mota. Praeter potum ex graminis decocto, victumque tenuem, nihil

(1) Adstitit huic aegro medicinae candidatus *Joannes Baptista Giudici*, qui morbi historiam conscripsit.

fuit praescriptum. Nox insomnis, calor, sudor.

Die 24^a, cutis adhuc madida, pulsus plenus ac vibrans. Pulvis ex cremore tartari cum nitro, et serum lactis pro potu porriguntur. Febris eadem, ut alias, hora aegrum invadit, eodemque modo absolvitur.

Die 25^a a febre liber est juvenis. Praescribitur sequens remedium:

R. Salis ammoniaci,

Nitri puri, ââ drachm. iß.

Solve in aquae destill. unc. viij.

Adde Sacchar. albi drachm. ij.

M. capiat omni bihorio unciam.

Febris iterum cum iisdem symptomatibus comparuit. Nox insomnis, calor magnus, sudor multus.

Die 26^a, mane, pulsus plenus, admodum vibrans est. Sanguinis unciae decem trahuntur e vena. Suam febris iterum scenam ludit, frigus tamen nullum, et calor duas modo per horas aegrum adfligunt. Sudor largus insequitur.

Die 27^a, pulsus minus plenus, atque pacatus. Febris nulla accessit.

Die 28^a, febris non rediit, ac integra demum valetudo restituta fuit (1).

(1) Adstitit aegro, et historiam morbi consignavit Georgius Morbeck, germanus.

OBSERVATIO III.

Antonius Salamoni, Ticinensis, vir 30 annorum, fortis, ac bene nutritus, die 17^a mensis aprilis 1793, postquam humiditas vestes diu gestasset, circa horam septimam matutinam a levi frigore prehenditur, per duas horas caloribus intermixto, cui dein calor solus, sed modicus, successit, decem circiter per horas extensus, subsequente copioso sudore. Die 18^a liber omnino fuit a febre; sed circa mediam noctem ejusdem diei friguit iterum per duas horas, deinde fortius ac antehac incaluit usque ad vesperras diei 19^{ae}, quibus sub copioso sudore liber quievit. Nox placida fuit; sed hora matutina undecima diei 20^{ae} frigus iterum accessit leve, non ultra horam perdurans, quod mox calor longe major, quam alias, excepit, ad meridiem usque diei 21^{ae} continuans, sudore profuso, non penitus, sed majorem ad partem dissipatus. Ad clinicum Institutum *Ticinense* delatus aeger febrilem adhuc irritationem, calorem corporis, pulsum quidquam frequentem, plenum ac durum manifestavit. Post meridiem comparuit etiam dolor ad inferiora et anteriora sinistri lateris, sub inspiratione profunda exacerbandus, quin igitur aut dyspnoea, aut tussis, aut in hoc vel illud latus decumbendi difficultas subessent. Nulla quoque doloris sub attactu exacerbatio, dolor capitis nullus, sitis pauca, urina cruda, sub paroxysmo flammea;

lingua pura , os non amarum , abdomen molle , alvus modice aperta. Aegri constitutio robusta , tempus vernum , pulsuum conditio febrem anomalam intermittentem , eamque *energicam* , seu inflammatoriam , facile in febrem continuam , si stimulus accederet , convertendam , adesse docebant. Venaesectio hinc ad libram instituta , serum lactis pro potu , et cremor tartari cum nitro porrecta fuerunt. Continuatis per tres dies his remediis , febris , quae primo jam nycthemero emanserat , perfecte sanata fuit. Reliquum ad latus dolorem linimentum volatile fugavit (1).

EPICRISIS.

Sic tum ad *rheni* superioris ripas , tum in *Italia* , centenas certe febres periodicas , imprimis vernaes manifeste *hypersthenicas* , absque incitantium , aut corticis chinæ , aut amarorum usu , deprimentem modo per methodum felicissime dissipavimus. Rarior harum febrium *Vindobonæ* , per decennium , proventus fuit. Nullas autem hujus generis vel in *Lituanja* , vel *Petropoli* observavimus. Non paucae intermittentes , quæ , vernali tempore imprimis , post quinque sexve paroxysmos , infracti modo per largos sudores febremque ipsam stimuli ratione , vel sponte , et absque ullo alio auxilio dispa-

(1) Historiam hanc redegit , aegroque adstiterit medicinae candidatus *Thomas Monteggia*.

rent , ad febris plus minus *energicæ* genus spectarunt ; atque hinc in *Epitomes* L. I. §. 70. diximus : » Nisi limites hæc febris » excedat , et nisi calidorum , stragulorum- » que abusu exasperetur ; rarum est , ean- » dem diutius vel ipsius naturæ resistere » moliminibus. » Atqui hæc omnium nationum cultarum medicis non ignota esse jam diximus. Minus vero communis est febris *energicæ* , quasi *subcontinua* , sed ad veras intermittentes pertinentis , atque *cum locali* partis aut visceris *inflammatione periodica* incedentis , cognitio , cujus febris , ex multis quæ possidemus , aliqua modo hic exempla referimus.

FEBRIS TERTIANA INFLAMMATORIA CUM PLEURITIDE.

Georgius Morbeck , medicinæ candidatus , corpore satis robusto , succipleno , ac fibra irritabili instructus , in prima juventute *Munnhemii* transacta , febribus intermittentibus , hic loci endemicis , nonnunquam epidemicis , frequenter subjectus , crescentibus annis ab odontalgia rheumatica haud raro vexatus , adolescentiæ vero annis , interdum a vertigine , sopore , per venæsectiones dissipandis , correptus , *die* 9^a decembris 1791 , dum æstuante corpore se frigidaæ auræ exposuisset , hora quinta vespertina , a frigore , tres per horas sæviente , invasus fuit. Sequuntur hoc intensus calor , cephalæa atrox cum deliriis , summa respirationis difficultas , cum pungente ad latus

sinistrum thoracis dolore, tussi aliqua, et deglutiendi labore.

Die 10^a horis matutinis, dolor capitis, deliria cessant; cœtera symptomata continuant. Alvus a biduo clausa, lingua sicca, impura, nulla tamen oris amarities, ructus nulli, accusantur. Pulsus duri admodum, pleni ac frequentes sunt. Sanguis ad uncias quindecim mittitur, decoctum hordei propinatur cum nitro et oxymelle; clyster injicitur. Potus, ob faucium dolorem, ante secundam a meridie horam ingeri non potuit. Imminuebatur tunc quoque dyspnoea, dolor lateris; tussis nulla fuit. Pulsuum frequentia, durities, continuant. Vespere, sanguis eductus, etsi densus et siccus, corio tamen non obtectus est. Alvus ab enemate soluta, somnus noctu aliquis concessus fuit.

Die 11^a mane. Dolor lateris punctorius vix non evanuerat; reliqua continuant. Portio alvum laxans ex pulpa tamarindorum et cremore tartari solubili præscribitur. Ad noctem prorsus insomnem, exceptis solis deliriis, ea ipsa quae ad noctem diei 9^{ae} contigerant, succedunt symptomata. Sudor nullus, nullum in urinis sedimentum observantur.

Die 12^a Continuant quidem pulsum frequentia, durities; cœtera vero morbi symptomata mitiora sunt. Unciæ sanguinis tredecim educuntur, alvum laxans medicina repetitur. Hora pomeridiana secunda, recrudescunt morbi phœnomena, et quidem cum eadem vehementia. Venæsectio tertia instituitur; qua factum est, ut, respiratio-

nis difficultate ac dolore lateris dispulsis, non nisi pulsum continuarent et plenitudo et frequentia. Alvus ad vespervas bis fuit soluta, fæculenta. Cognita nunc febris intermittens subcontinuae indole, cum simul febres periodicæ regnarent, hinc inde cum pneumonia et laterum dolore infestæ; corticis peruviani uncia, binis vicibus intra duas horas, remissionis insecuturæ tempore, assumenda, dein vero ejusdem corticis drachma una, cum octo granis nitri, omni hora ingerenda, præscribuntur. Nocte sequente somnus, per horas duas extensus, ægrum restauravit. Nihil sudoris, nil sedimenti in urinis observari potuit.

Die 13^a Febris continuat, pulsus iidem sunt; alvus bis excernitur. Sequitur nox insomnis, animus diversis ab idæis obruitur; sudor nullus, nullum in urinis sedimentum.

Die 14^a iterum corticis chinæ uncia una, cum nitri drachma, medicinam constituit. Ad noctem somnus languida membra refecit, quin sudor, aut in urinis sedimentum, comparuerint.

Die 15^a Febris imminuta. Medicina eadem. Nox insomniis, agitatione corporis perturbata.

Die 16^a idem verum status; sed noctem æger quietam transegit. Nec sudor tamen, nec sedimentum in urinis se produnt.

Die 17^a Pulsuum vibratio, frequentia cessant; eorundem mollities atque tarditas redeunt. Apyrexia plenaria noxque tran-

quilla succedunt; sudor tamen ac sedimentum in urinis defuerunt.

Ab hesterna die febris in totum siluit. Corticis drachmæ duæ per aliquot adhuc dies adhibentur, post quos valetudo integerrima restituta fuit (1).

PERIPNEUMONIA PERIODICA.

Felici compage instructa, decimum nonum ætatis suæ annum agens, puella, rite semper menstruata, a peripneumonia tres ante annos conflictata fuit, debilitante sub methodo fugata. *Die 22 mensis maji 1794* hæc virgo clinicum *Ticinense* Institutum ingressa est. Ante quinque dies, ut refert, nulla data causa, hora quinta pomeridiana, illa per bihorium intense frigit, vomitus materiæ amaræ, viridescentis, cephalæa, et ad lumborum regionem dolor una adparent; calor subsequitur, atque tunc vomitus dolorque silent; ast his, difficilis respiratio, dolor ad sinistrum thoracis latus, sub mamma, tussis sicca, decubitus in sinistrum latus difficilis, succedunt. Hac sub rerum positione vena secatur, et medicina alvum evacuans administratur. Aliquot post horas, leviter ægra sudat, symptomata singula mitiora fiunt, et remissio ad tertiam usque diem morbi persistit; in qua, hora quinta antimeridiana, frigus sat validum denuo per bihorium revertitur, iterumque

(1) Morbum proprium aeger ipse descripsit.

vomitibus, cephalæa, dolor ad lumbos sese adjungunt, dolor thoracis exacerbatur, respiratio redditur difficilior tussisque recrudescit. Vesperascente die, ægra quidquam sudavit; remissio inde per integram diem conceditur, sed febris non omnino evanuit; atque thoracis dolor, licet mitior, tussis, anxietas persistunt. *Quinta* morbi die, ad horam eandem, ac nudius tertius, frigus ægramprehendit, et singula iterum, quæ supra recensuimus, symptomata comparent. Absoluto tandem frigore cum ad clinicum Institutum ægra venisset, sequentia observari potuerunt:

Facies rubra, cutis calor sano major, respiratio difficilis, dolor sub mamma sinistraurgens, sub attactu, et sub inspiratione profunda exacerbatus, decubitus utroque in latere possibilis, in dorsum vero commodior, tussis mitis, exscretio nulla, pulsus frequens, plenus et tensus, lingua impura, os non amarum, sitis summa, alvus aperta. Libra una cruoris emittitur, decoctum hordei cum oxymelle, fomenta ad locum dolentem emollientia præscribuntur.

Vespere, remissio manifesta se prodit, dolor mitis est, respiratio faciliior, pulsus sunt pleniusculi, alvus clausa, os amarum, lingua impura. Cremor tartari cum pulpa tamarindorum, prævio enemate porriguntur.

Die 23^a mane. Hac nocte quievit ægra, dolor mitis, tussis fere nulla, respiratio felix, febris pauca est, pulsus vix frequens, alvus ter mota. Vespere, dolor levis est.

Die 24^a Febris accessit praeunte per bitorium frigore; anxietas levis, tussis aliqua, dolor auctus, pulsus frequens, pleniusculus, sat vibrans; caput dolet.

Vespere, paroxysmus cessavit. Praescribitur nunc chinæ cortex ad unciam, cujus, sex in partes divisæ, portio una quovis bithorio porrigitur.

Die 25^a Levis paroxysmus accessit: dolor thoracis quidquam auctus, pulsus frequentes, non tamen duri sunt, tussis pauca, sudor ad vespertas, pulsusque molliores sunt.

Die 26^a Febris nulla, dolor mitis. Ad meridiem vero paroxysmus levis, absque frigore accessit.

Sic res ad 29^{am} optime, sine febre ingressa est. Hac vero die, aliqua febris, levi praeunte frigore, et capitis dolor accessit.

Die 30^a Ventris quidam dolores adsunt. Suspenditur pulvis ex cortice, ac ejusdem decoctum, cum laudani liquidi guttis xii. propinatur. Per plures nunc dies symptomata histericis communia sequuntur; quibus solita ex volatilibus remedia opponuntur. Die 7^a junii, virgo, perfecte restituta, clinicum institutum deseruit (1).

(1) Adstitit morbo, ac eundem descripsit *Petrus Beretta* Med. Candidatus.

PERIPNEUMONIA PERIODICA.

Rustica mulier, 44 annos nata, mater octo liberorum fuit, quos omnes feliciter debitoque tempore peperit. Per multos annos ea bene valuit; ast sex vel septem abhinc annis, modo unum, modum alterum morbum passa est, bis fere letiferum. Anno 1787 scilicet in hoc ipso Instituto clinico a gravissima peripneumonia, anno vero 1790 ex simili morbo, non minus ominoso, restituta fuit. Duobus interim ab annis, fluxus menstruus, quin igitur pejus se habuisse videretur, non rediit mulieri.

Die vero 27^a vix elapsi mensis januarii, 1792, post inordinatas frigoris et caloris atmosphaerici successiones, post sudorem saepe saepius suppressum, matutinis horis haec mulier horrere incoepit, ac dein magnum frigus experta est, cui calor successit cum dolore capitis, amarore oris, tussi, difficultate spirandi, ac dolore in dextro latere ac dorso, ad regionem scapulae, nec non inferius ad primas costas spurias, ac legitimarum ultimas. Nausca praeterea, et ad vomitum conamen aderant. Eandem scenam morbus lusit *die* 28^a, excepto frigore. *Die* 29^a hoc ipsum sub febre rediit; siluit vero *die* 30^a, atque *die* 31^a.

Praeter venaesectionem, potumque tepidum, nihil morbo primis diebus oppositum, tandem vero ejusdem sanatio ad vespas 31^{ae} januarii Instituto clinico *Ticinensi* commissa fuit.

Instituto morbi examine, praeter ea, quae jam retulimus, sequentia notanda veniebant: facies collapsa, oculi splendentes, subhumidi, genae rubentes, labia sicca, dolor capitis, os amarum lingua leviter a mucositate albo oblecta, sitis, spirandi difficultas magna, respiratio scilicet alta, frequens, cum dolore ad costas spurias, ad regionem hepaticam omnem, nec minus ad epigastricam, et in sinistrum hypochondrium exporrecto. Sub tussi, et profundiore sub respiratione, is dolor augebatur quamplurimum; augebatur etiam non ab attactu modo, sed vel a solo stragulorum pondere. Sputa erant nulla, alvus obstructa, urinae paucae. Pulsus erant duri, pleni, frequentes. Interius se urina refoverat aegra, cujus interim cutis calorem tam insignem non indicabat.

Venaesectio mox ad libram instituta, decoctum hordei cum nitro et oxymelle, fomenta emollientia et clyster praescripta fuerunt.

Die 1^a februarii. Febris pauca, paucus laterum dolor; tussis, respirandi difficultas, multum imminutae, in genere, conspicua admodum observatur symptomatum remissio. Sanguis heri emissus, corium contraxit, ut vocant, pleuriticum; pulsus 98 ictus minuto primo absolvebant. Praeter decoctum hordei, fomenta, clysterem, potio laxans, ex cremore tartari solubili ac pulpa tamarindorum, praescripta fuit.

Ad meridiem ejusdem diei, frigus aegram invasit, et febris ab eo major successit. Pul-

sationes arteriae 120 minuto primo numerabantur. Eodem, ac in ultimo paroxysmo symptomata urgebant. In omnibus itaque continuatum, et emulsio arabica cum nitro praescripta fuit.

Die 2^a Nocte quievit aegra, alvum octies deposuit, sudavit multum, dolor minor, ac magna febris remissio est. Arteriarum ictus 88 numeravimus. Dolor interim ad latus non in totum remisit.

Cucurbitulas igitur decem, scarificatas, loco dolenti adplicuimus; sequentia vero praescripsimus:

R. Decocti cort. peruv. ex unc. i. parati,
unc. ix.

pulv. cort. ejusdem drachm. vi.

Syrup. cichor. c. rheo, unc. i.

M. capiat omni bihorio tertiam partem.

Vespere. Febris vix comparuit, dolor ad thoracem fere evanuit, alvus bis deposita fuit, vertuntur omnia in melius. Serum lactis pro potu est.

Die 3^a Nox optime transacta fuit. Multum aegra sudavit. Pulsus omnino sanis sunt similes. Decoctum corticis nunc omni trihorio assumitur.

Ad vespervas, nulla febris adsunt symptomata.

Die 4^a Res optime incedunt. Ob alvum non apertam, rhei portio decocto corticis infunditur.

Sic tandem paucarum spatii dierum valetudo mulieri optima restituta fuit. Urinae

hoc in morbo, licet periodico, nunquam sedimentum posuerunt (1).

PERIPNEUMONIA PERIODICA.

Joannes Baptista Cioca, vir 48 annorum, qui decem ante annos ex peripneumonia perfecte convaluerat; *die 9^a* mensis januarii 1793, ex frigore, aestuante corpore suscepto, illico, ad horam secundam pomeridianam, corripitur a dolore circa jugulum, a tussi, et aliqua respirandi difficultate, simul a febre, in qua, praevio frigore sat forti trium horarum, subsequutus est calor per integram noctem extensus.

Mane *diei 10^a* dolor ad jugulum disparuit, ad scapulam et sinistrum thoracis ad latus conversus, cum manifesta febris remissione; donec iterum ad vespertas, eandem ad horam ac pridie, frigore, minus tamen forti ac diuturno, iterum reverso, insecutus est calor.

Sic etiam *die 11^a* concessa horis matutinis remissione conspicua, ad vespertas idem frigus rediit, nec vi quidem, nec diuturnitate alterne respondens; qua die, nulla facta medela, in clinicum Institutum *Ticinense* delato aegro, sequentia in conspectum venerunt.

(1) Historiam hujus morbi redigit *Aloysius Morelli*, Senensis. M. D. nunc praestans medicinae practicae in celebri Academia *Pisana* Professor.

Facies pallida, dolor capitis summus, respiratio difficilis, tussis absque sputis, ponderis sensus ad pectus, pulsus frequentes, non tam pleni, nec duri, calor cutis sanum superans, dolor punctorius in latere sinistro thoracis, sub profunda respiratione adauctus, decubitus in latere adfecto facilius, os amarum, lingua vix quidquam alba, sitis summa, alvus a tribus diebus non soluta, urinae jumentosae, lienis tumor.

Venaesectio ad libram, decoctum ho dei cum nitro et oxymelle, fomenta emollientia ad locum dolentem, enema, praescribuntur.

Die 12^a Ad noctem aeger male se habuit; nunc vero febris manifeste remittit; tussis cum sputis aquosis, respiratio adhuc difficilis, pulsus quidquam pleni ac vibrantes, non tamen frequentes, dolor a latere sinistro thoracis ad latus dextrum extensus, alvus semel aperta, urinae sedimento lateritio instructae, sanguis heri emissus corio obtectus, observantur.

Cognito morbi caractere, pulvis corticis chinae ad unciam in octo partes aequales divisa, praescribitur, dosi una quovis bihorio sumenda.

Vespere, Parva febris accessit; dolor lateris, respirandi difficultas et tussis continuant. Pulsus vix frequentia peccant; molles sunt, non pleni. Alvum aeger non deposuit. Urinae sedimento lateritio instructae sunt.

Enema emolliens, linctus ex mucilagine arabica, oleo amygdalino, syrupo althaeae,

fomenta circa locum dolentem praescribuntur.

Die 13^a Respiratio expedita, tussis pauca cum aliquo screatu, dolor ad thoracem imminutus, pulsus naturales, lingua quidquam alba, os amarum; alvus semel soluta, urinae turbidae, sedimentosae. Pulveris corticis peruviani drachmae duae, cum pulveris rhei electi drachma una, in quatuor doses divisae, quarum unam aeger quovis bihorio capiat, traduntur.

Vespere febris non accessit; dolor a fortiore inspiratione adauctus, dyspnoea major, pulsus non frequentes, molles; os adhuc amarum; alvus bis mota. Linimentum volatile cum camphora loco dolenti inungitur.

Die 14^a Respiratio pene libera, tussis minor, cum aliquo, eoque viscido, screata; dolor ad latus, nisi sub profunda inspiratione et sub tussi, nullus. Pulsus non frequentes, molles; alvus sexies deposita, urina lateritio sedimento praedita. Praescribitur haustus salinus cum duabus drachmis extracti corticis.

Vespere, febris nulla, dyspnoea levis, tussis minor cum sputis quibusdam; dolorem aeger non persentit nisi sub fortiore inspiratione, sub tussi; os adhuc amarum.

Die 15^a Per noctem multum, universo corpore sudavit; respiratio facilis, tussis pauca cum sputis viscidis; pulsus naturales. Vespere nulla mutatio; os quidquam amarum; urinae magis tinctae.

Die 16^a Per noctem sudavit, respiratio facilis, tussis pauca cum sputis viscidis.

Die 17^a Iterum per noctem sudavit. Febris nulla. Convaluit (1).

R E P I C I S I S.

In *Epitomes* L. II. §. 185 p. 162 » *peripneumoniam* interdum *periodicam* indolem ostendere » diximus. Quodsi hoc tunc temporis (1792) novum protinus non fuit; pauca tamen hujus rei memorabilis exempla eousque ad nos pervenerant. Atqui tamen, jam ex hoc solo, quod nullus fere morbus sit, cujus faciem *intermittens febris* aliquando non mutuetur: ut cujus naturae centenas historias, praeter *Tortium* [2], collegit et *Casimir Medicus* [3]; quam facile proteiformis haec febris et inflammationes partium ac viscerum subjugare sibi queat, concludi potuisset. Ac revera, intermittens febris, una cum *pleuritide* incedentis, quamvis ea corticis efficaciam eluserit, specimen apud *Stollium* invenimus [4] *Pleuritidis periodicae* exemplum refert et *Strackius* [5], apud quem etiam scriptorem,

(1) Historiam conscripsit medicinae candidatus *Pessina*.

(2) Therapeutice specialis.

(3) Von periodischen Krankheiten.

(4) Ratio medendi, vol. IV. p. 91. 92.

(5) Obser. med. de diversa febris continuas remittentis causa etc. p. 115. sq.

febris *perniciosae*, et *ophthalmicae* (1) *arthriticae* (2), et, quae pneumoniae vicina est, *catarrhalis*, reperiuntur historiae (3). Non raro ventriculum in perniciosa *cardialgica* inflammari, lypiriamque morbum aemulari vidit *Burserius*, ita ut ante corticis usum semel aut binis vicibus venam in brachio secuerit [4]. Eodem modo et *Bangius* vomitum inflammatorium; partim vero sanguineum, in *tertianis cardialgicis* descripsit [5]. Varios quidem in gyros hic theoria medicorum, quae huic explicando phaenomeno impar est, sese contorquet; sed facta, coram quibus ea toties, maxime in eruendis morborum periodis obmutescit, loquuntur, ac sub istorum imperio, incendia morbosa nunc aperte deflagrant, nunc sopiri, nunc protinus extinguere cernuntur.

Sic anno 1791, hiemali sub frigore, quo peripneumoniae in *Italia* quoque frequenter nimis dominantur, *Ticini* etiam dirus hic morbus epidemice, et, ut *Schedulae nosocomii mortuariae* nos docebant, sub strage civium, quam antehac, longe maiore, regnabat. Virum igitur quadragenarium, epidemica hac lue correptum, in clinicum Institutum suscepimus. Respiratio huic summa anxiosa, celer, ac prae dolore thoracis punctorio, ponderisque ad sternum sensu,

(1) L. c. p. 114 sq.

(2) L. c. p. 143.

(3) L. c. p. 128 sq.

(4) Instit. med. Vol. I. §. 165 p. 104.

(5) Acta Societ. Reg. Havniens. Vol. I. p. 2.

vix non suffocans fuit. Tussis aspera aegrum vexabat, sputa hinc inde pauca, sed cruenta, expellens. Calor magnus, facies rubra, pulsus pleni ac duri, lingua sicca et rubra, sitis magna, alvus obstructa fuerunt.

Ex brevi et anhelosa aegri relatione experimur quidem, hunc morbum tribus abhinc diebus, horis pomeridianis magno cum frigore, calore, ac iisdem quibus nunc stiparetur, symptomatibus incoepisse; horis autem matutinis eundem pro magna parte remisisse; sed ardua nimis pulmonum inflammatio hic subesse nobis visa est, quin in morbo tot aliis nunc funesto, suspensionem symptomatum matutinam aut verisimilem habere, aut adeo in aliam diem sperari posse crederemus. Ac ut verum fateamur, sub artis medicae exercitio, viginti quinque per annos tunc jam extenso; nullum nobis pneumoniae periodicae exemplum, pro tali nempe recognitum, occurrerat. Venam igitur, ad libram sanguinis, aperuimus, decoctum althaeae pro potu, fomenta lateri dolenti admovenda, et enema praescripsimus. *Altera die*, noctem inquietam fuisse, tandem vero, sudores successisse nobis referunt. Calor corporis nunc multum imminutus, respiratio longe facilior, tussis, dolor lateris leviores, pulsus, etsi adhuc frequentes, minus tamen pleni, vibrantes ac febriles sunt; loquela nunc liberior est. Mirantur omnes subitaneam tanti morbi tamque felicem metamorphosin. Hora pomeridiana, ejusdem diei, tertia,

Frigus magnum conquassat aegrum; respiratio mox anxiosa redditur, ac summe difficilis; tussis aspera dolorque lateris intensior redeunt, ac plenae discrimine peripneumoniae imago, qualis hesternae fuit, offertur. Nec tamen prima haec, a nobis ipsis tacta tam conspicuae remissionis observatio, nos retinuit, quin, tam ob dictorum ferociam symptomatum, quam ob plenitudinem vibrationemque pulsum novam venam de novo ad libram tundere vel quidquam dubitaremus. *Tertia die*; horis matutinis, promptius subintravit symptomatum remissio, hesternae adeo evidentior. Sanguis heri eductus corio iterum denso obductus est. De periodica nunc indole morbi prorsus convicti, corticis optimi unciam unam, remissionis tempore sollicitè ingerendam praescribimus. Hora post meridiem consueta, febris quidem subintrat; sed hesternae longe levior, ac nullis fere pneumoniae stipata symptomatibus. *Die quarta*, mane, perfecta apyrexia observatur; tussis pauca, dolor nullus, respiratio libera est. Corticis drachma una omni hora porrigitur. Ad vesperras, nulla febris accessit, tussis, ut horis matutinis, levior, dolor lateris nullus fuit; in urinae sedimentum lateritium comparuit. Aeger post paucas dies, a tanto morbo restitutus, lares proprios petiit. Cum vero aegrorum in nosodochium susceptorum, nisi omnium, plurimorum tamen, similis esset conditio; similis quoque medendi methodus apud istos, non minus felici sub omine, introducta

fuit. Subsequente adeo anni 1792 hieme, non pauci, pneumonias periodicas passi, vel una, vel altera sanguinis missione praemissa, corticis chinae efficaciam, ut in febre intermittente quavis alia, experti sunt.

Ab eo tempore, pleuritidem *intermittentis indolis* epidemicam descripsit *Carolus Blom* (1). Peripneumoniae intermittens historiam tradidit *von Hoven* (2); ut igitur, cur vir celebris nobisque amicus, de *periodica* pneumoniarum quarundam, nisi cum febre intermittente complicatarum, indole dubitaverit (3), non satis perspicere queamus. Quodsi *Stolio*, qui, ut jam diximus, pleuritidem cum febre intermittente incessisse vidit, hanc ipsam cum cortice jugulare non licuerit; vel incendium adhuc nimium in thoracis cavo haesisse, vel febrem ad lentas, quae periodos haud raro assumunt, quin intermittentium ideo ad classem spectant, pertinuisse suspicamur.

Ulterior vero rerum experientia nos docuit; *peripneumonias*, *pleuritides*, vere *adynamicas*, seu, ut vocant, *nervosas*, interdum *periodice* incedere, ac, ut plura in *Viennensi* nosodochio generali exempla conspeximus, absque omni cruoris detractioe, feliciter solius administratione corticis chi-

(1) In Meckel's neuem Archiv. der pract. Arzneyk. I. Th. 8. 232.

(2) Versuch über die Wechselfieber. L. 8. 143.

(3) Reil, Fieberlehre, II. §. 190. 8. 439. §. 201. 8. 467.

nae dissipari. Aliqua tantum ex istis hic adducimus. 39

PERIPNEUMONIA PERIODICA , ASTHENICA.

Josepha Tschobler, faemina caelebs, trigessimum octavum annum attingens, menstruorum quidem fluxu, debitum ad tempus, sed nimis abundante, ac vires non parum infringente instructa, dum vigesimum et tertium aetatis annum attigisset, a peripneumonia prehensa fuit vehemente, modo septem venae sectionibus fuganda. Ante quatuor annos a febre continua correpta, tres ultro menses decubuit, viribus per evacuationes tum sanguineas, tum alvinas, non parum exhausta. Ante duos annos de phthisi pulmonali suspecta fuit, quae tamen pituitosa magis ex tabe constitisse videtur.

Die 27^a mensis novembris 1800, hora nona matutina, invasit mulierem frigus ingens, quod ipsam per integram diem fortiter vexavit. Accessit dolor pungens in latere thoracis sinistro, sub inspiratione ac tussi exacerbatus. Hora octava vespertina, successit calor, vehementiae frigoris aequalis; post trihorium interim sudor universo e corpore manat copiosus, per omnem fere noctem, cum virium jactura extensus. Cesante hac cutis secretionem, sc̄ liberam a febre persentit aegra. *Die 2^a* horis iisdem, ac heri, frigus, calor et sudor eandem urgebant; sed majore cum saevitia dolor punc-

torius in sinistra thoracis parte miseram invasit cum tussi, ac impedito prorsus hoc in latus decubitu. *Die 3^a* cuncta symptomata, non mutato ordine, sed vehementia adhuc majore, redierunt. Eodem res tenore *die 4^a* morbi, seu 24^a novembris, qua aegra ad clinicum *Viennense* Institutum suscepta fuit, incesserunt. Publico vero examini hic loci submissa, sequentia exhibuit.

Habitus corporis utcunque aspectu firmum, dolores capitis, ad frontis regionem, continuos, oculos ardentes, susurrum aurium, nares impervias, linguam siccam, mollem tamen, saporem amarum, respirationem, cum ponderis sensu, impeditam, dolorem, dum spiritus profundius educitur, magnum, punctorium, tussim frequentem, fere siccam, decubitu in latus thoracis sinistrum impossibilem, cutem mollem ac humidam, calorem longe maximum, pulsus frequentes, sat plenos, duriusculos, facili tamen opere comprimendos, lassitudinem totius corporis magnum; alvum apertam.

De latente in thorace incendio dubium quidem non fuit; nec fuit de indole febris adynamica; ob accessionum interim extensionem, num continua haec esset, num vero intermittens; satis id certum videbatur. Pulmonum status, a praegressis morbis non parum labefactus, morbi prognosin satis anxiam reddidit.

Decoctum ex radice polygale Senegae, ad drachmas hujus duas, aquosum, cum liquore anodyno *Hoffmanni*, ad drachmam

tuam , praescriptum fuit. Pro potu , decoctum salep , cum infuso liquiritiae propinatum , locus dolens thoracis cum linimento volatili inunctus, huic vero fomentum emolliens impositum fuit.

Die 25^a Calor ac sudor hac nocte, quam praeteritis , mitiores fuerunt , somnus interim nullus accessit. Alvum aegra bis deposuit. Hoc mane perstabant cephalaea , oculorum ardor , aurium susurrus; linguae siccitas , tussis , lateris sinistri ad thoracem dolor , et respirandi difficultas disparuerunt. Vespere, licet capitis dolor , susurrus aurium ardorque oculorum adhuc vigerent ; lingua tamen mollis et madida fuit ; peripneumoniae symptomata ex integro siluerunt. Febris per diem integram se nulla manifestavit. Fomenta hinc et linimentum volatile seponuntur , continuatur in coeteris.

Die 26^a De nocte , et quidem incipiente, accessit frigus sat vehemens, semialteram per horam exporrectum. Calor non longior, ac sudor hoc sequuntur. Lassitudo major haec excipit, ac somnus brevior conceditur. Hoc mane , dolore capitis, susurru aurium, et oculorum ardore exceptis , aegram ab omni insultu immunem reperimus ; pulsus erant parum frequentiores , duriusculi , digito tamen perfacile cedebant.

De febris indole vere periodica jamjam convicti, Corticis decoctum cum illo polygalae junctum propinamus.

Ad vesperas , praeter urinas turbidas, se-

dimento lateritio instructas, nulla observata fuit rerum mutatio. Decoctum salep, aegrae molestum, aqua simplex supplevit.

Die 27^a Eodem tempore, quo heri, ad noctem paroxysmus, sed mitior, breviorque accessit. Somnus aliquis hunc secutus est; et nunc aegrae de aurium susurru, cephalaea, oculorum ardore parum conqueritur, pneumoniae vero symptomata nulla sunt.

Die 28^a Ad vespervas heri, per horas aliquot, horripilationes interruptae, sed fortiores, calor brevis, ac sudor accesserunt. Nox denuo fuit inquieta: dolores scilicet, rheumaticis similes, nunc in hac parte, nunc in illa vigentes, somnum omnem excluserunt. Hoc mane nulla febris vestigia supersunt, perfricantur partes cum spiritu vini camphorato. Ad vespervas, symptomata longe mitiora sunt, ciborum aliquod desiderium, mentis hilaritas se produnt. Continuatur usus corticis.

Die 29^a Quievit aegra per noctem, atque a somno, doloribus nullis intermisto, refo-cillatam se persentit. Nulla ad vespervas mutatio.

Die 30^a Levis se ad noctem insultus febrilis manifestavit, brevi spatio disparens somnumque non arcens. Ab isto, res optime incedunt. Decoctum amarum, loco corticis, praescribitur.

A. 1^a mensis decembris ad 3^{am} vires, sine quavis molestia, quotidie auctae fuerunt. Menstrua tunc omni absque turba redierunt,

de fame mulier conqueritur, et 5^a demum die ad suos hilaris revertitur (1).

PERIPNEUMONIA SUBCONTINUA, NERVOSA.

Catharina Morinelli, viginti annorum femina, hucusque complexionis felicis, tribus abhinc mensibus, nulla patente causa, nullaque tunc subsequente labe, menstruis orbatur, et sana usque ad 24^{am} mensis novembris, 1794 diem vivit; qua tandem die, aestuante corpore, refrigerio se exponit, et paulo post a coryza, cum aliquo dolore capitis, tussi, spirandique difficultate juncta, corripitur. Paucam attentionem huic malo tribuens, nulloque artis subsidio usa, per tres dies leviter aegrotavit, sed 28^a novembris, ad meridiem, sat intenso a frigore, ad vespertas usque durante, invaditur. Sequitur calor, et sub lucis ortu, sudor. Febris ista cum forti cephalaea, susurru aurium, dolore pectoris gravativo, ad sternum pungente, praecordiorumque oppressione stipata, matutinas ad horas sat sensibili ratione remittit, et eadem hora, sed majore indies intensitate revertitur. Notandum interim est, quod intervallum illum binos inter paroxysmos positum, perfecta quiete a febre non gaudeat: cum cephalaea, susurrus aurium, dyspnoea, tussis, laterisque dolor perseverent, vexentque aegrotam. Sic per bi-

(1) *Ferdinandus Stecher de Sebenitz* Galicianus, Historiam morbi conscripsit.

duum res se habuit, si vomitum, quem nudius tertius (30^a novembris) semel, sub stadio caloris, passa est, et notabile symptomatum incrementum excipias. Heri vespere nosocomium *Ticinense* mulier petiit, assumpto ibidem emeto-cathartico, quater vomuit, ac ter liquida multa per alvum deposuit.

Die 2^a decembris, mane, aegra, Instituto clinico commissa, sequentia, notatu digna nobis offert: caput nempe, sub tussi imprimis, magnopere dolet; facies rubet, tinnunt aures, viae ad fauces per nares impediuntur, os amarum, lingua albida, respiratio difficilis est, et ab intensissimo illo, sub sterno latente, dolore, magis adhuc magisque redditur ardua. Tussis frequens, sputo nullo comitata, dolorem adauget. Decubitus in utrumque latus aequae difficilis est, doloribusque ad integram vertebrarum columnam, ad lumbos imprimis, infixis, redditur difficilior. Magna, sub his, miserae jactatio, suspiria, pulsus interim sanis parum frequentiores, sed duri ac pleni sunt. Prae aliis symptomatibus vel maxime de debilitate, de doloribus ad lumbos et ad sternum, atque de aurium susurru aegra conqueritur. Praescribitur haustus salinus cum pulveris *Doweri* granis quindecim. Decoctum pro potu, emolliens.

Exacerbatio, ad meridiem, sine frigore praevio, imo cum intenso mox calore accessit. Ter alvum aegra deposuit. Dolor capitis, tussis, dyspnoea adhuc continuant;

suspiria adsunt frequentia. Pulsus parum certe frequentes, sed nunc debiles, minime vibrantes, variabiles observantur.

Praescribitur haustus salinus cum granis decem moschi optimi. Linimentum volatile cum camphora, loco dolenti illinitur.

Die 3^a Noctem tranquillam aegra transigit, ac symptomata sensibilibiter mitigata sunt: dolor nempe ad pectus sedatus, tussis pauca fuit; alvum ter deposuit; pulsus molliores magisque debiles redduntur. Haustus salini unciae septem, cum tribus moschi granis, omni bihorio ad quartam partem, propinatur.

Versus meridiem, dolor ad dextrum thoracis latus acutissimus, ejulatus aegrae exprimens, insurrexit. Versus quartam pomeridianam, exacerbatio mox cum calore vel maximo accessit. Pulsus, praeter frequentiam majorem, nil mutati sunt. De lateris dolore molesto, de nullo vero ad sternum, ad lumbos, parum etiam de tussi conqueritur. Suspiria frequenter aegra ducit. Haustus salinus absque moscho porrigitur; linimentum volatile cum camphora loco dolenti inungitur.

Die 4^a Versus mediam noctem imminuta fuerunt symptomata. Nunc vero aegra a febre quasi libere dicenda est. Dolor nempe, heri tam atrox nunc fere penitus disparuit; perparum tussit, faciliter spiritum ducit, nec tam frequenter suspirat. Caput minus quidem ac antehac, semper tamen dolet;

aures parum tinniunt; os paulo minus amarescit; pulsus fere naturales sunt.

Praescribuntur sequentia:

R. Decocti cort. peruv. unc. ix.

pulv. cort. ejusd. dr. vi.

Syrup. Cort. ejusd. unc. i.

Capiat omni bihorio quartam partem.

Post. meridiem, nova superaccessit exacerbatio. Suspiria frequentius aegra ducit; de dolore lateris sinistri versus lienem conqueritur; aures magis tinniunt, doletque magis caput; calet multum et copiose sudat. Pulsus a pristinis nihil mutati sunt. Mitior hesternae fuit haec exacerbatio. Continuatur in cortice.

Die 5^a Hae nocte, hora undecima, frigus aegram corripuit, ac per horam duravit. Accessit dein calor, ac denique sudor. Paroxysmi hujus tempore, singula symptomata, quae heri vespere jam paulo exasperabantur, valde increverunt. Nunc vero sensibilibiter adhuc aegra febricitat, frequentior tussis, sputa pauca sunt. Calet valde, pulsus pleniores sunt, et caput intense dolet. Suspenditur cortex, et haustus salinus substituitur. Cucurbitulae, numero octo, adplicentur dolenti lateri.

Ad meridiem, symptomata, quae jamjam mitigabantur, iterum sensim exasperata sunt: calor fortis accessit, ac dolor lateris profunde ad scapulam sinistram translatus est. Suspiria sunt frequentia; calet insigniter cutis, humida tamen, et aegra valde morosa est.

Praescribitur haustus salinus cum quatuor granis moschi.

Die 6^a Dolor ad scapulas silet; sed alterum aegra nunc ad latus thoracis sinistrum negat. Non nisi auris dextra nunc tinnit, sinistra vero a susurru prorsus libera est. Magna aegrae morositas est. Pulsus interea nil mutati sunt. Continuat in iisdem.

Vespere iterum exacerbatio, cum summo aestu incipiens, accessit. Continua nunc sunt suspiria; de lateris dolore conqueritur; tussis pauca est; cephalalgia molesta urget. Pulsus debiliores sunt. Alvus aperta est.

Praescribuntur aquae cinnamomi unciae tres, cum duabus unciis haustus narcotici. Capiat unciam omni bihorio.

Die 7^a Valde sudat aegra et saepe tussit. Suspiria multa, pulsus debiles sunt. Dolor ad latus et ad caput urgent. Medecina sequens praescribitur:

R. Decocti corticis peruv. unc. vj.

Extracti Cort. ejusd. drachm. iij.

Haustus narcot.

aquae cinuamomi â unc. ij.

M. Capiat unciam unam cum dimidia omni bihorio. Vini quoque libra per diem conceditur.

Vespere, dolor et cephalaea fere evanuerunt.

Die 8^a Bis vomuit aegra; coetera symptomata parum urgent, sudat copiose, pulsus nunc sunt debiles. Vespere iterum bis vomuit; pulsus lentiores sunt, dolor ad pectus imminutus est.

Die 9^a Cessavit vomitus; coetera sunt eadem. Repetitur medicina ex cortice.

Die 10^a Optime quievit aegra, pulsus naturales sunt. Dolor pectoris idem.

Emplastrum vesicans ad locum dolentem ponitur. Haustus salinus cum pulvere *Doweri* porrigitur.

Die 11^a Febris nulla; disparuerunt singula morbi symptomata.

Post paucas dies, convalescens ad suos felix revertitur (1).

PERIPNEUMONIA PERIODICA.

Vincentius Bauer, famulus Viennensis viginti trium annorum, praeter variolas, nunquam a morbis vexatus, mense junii 1804 a tertiana febre intermittente invaditur, ac, debito more tractatus, ab eadem brevi tempore liberatur. *Die 16^a* mensis julii, hora 11^a matutina, praevia siti insolita, frigus vehemens eundemprehendit, cui mox se tussis aspera, frequens, cum sputis paucis aquosis, cum dolore ad sternum pungente, urente, gravi dyspnoea, et ponderis ad pectus molesta sensatione adsociat. Succedit his calor, cephalaea; ac tandem sudor subsequitur. Ad vespervas apyrexia subintrat, ac praeter lassitudinem, aeger nihil accusat. *Die 17^a* cum primas matutinas ad horas si-

(1) Quem immatura morte, nobis ac scientiae ereptum adhucdum amare lugeamus, filius proprius, *Franciscus Frank*, historiam hanc conscripsit.

bi sanus videretur: versus horam undecimam ab iisdem ac heri, mitioribus tamen, symptomatibus tentatur; vespere denuo ab omnibus incommodis, lassitudine excepta, libero. *Die 18^a* idem redit febris paroxysmus: cephalaea, dolor ingens, oppressio ad sterni regionem, tussis continua, et magna respirandi difficultas. Circa vesperas, aeger, sensu ardoris ac doloris ad caput adhuc detentus, ad clinicum Institutum *Viennense* deferitur. Tunc vero pectus ab omni incommodo fuit liberum.

Cum igitur hic juvenis jam ante mensem a febre intermittente sanatus, evidentius in morbum eundem, cum aliis modo symptomatis, incidisset; cum apyrexia, pro febre vel quotidiana, vel tertiana duplici, solito majore hucusque gavisus esset; cum praeterea nulla de primis viis adfectis symptomata testarentur; mox pulvis ex chinae corticis uncia una, in octo partes divisus, quarum unam quavis hora aeger assumeret, praescriptus, — ultra vero aquae menthae unciae sex, cum liquoris anodyni mineralis *Hoffmanni* drachma una, de quibus unciam singulos post pulveres hauriret, porrectae fuerunt.

Die 19^a Hac nocte aeger dormivit. Hodie mane, hora octava, cephalaea nulla, sitis hesternae minor, appetitus ciborum aliquis, febris nulla, pectus liberum. Ad horam vero circiter decimam, paroxysmus iterum cum tussi admodum vehemente, cumque sputis copiosis, sanguine quidquam tinctis,

revertitur. Nulla vero pectoris oppressio, dolor nullus se manifestant. Ad horam undecimam, frigus illi se adsociat, ad meridiem usque extensum, minus tamen ac alias violentum. Succedit huic calor, ac tandem sudor; quae singula ad horam secundam pomeridianam durarunt; tussis vero ad horam tertiam usque protracta fuit, qua cessante, perfecta apyrexia secuta est.

Die 20^a Hora octava, res bene incedunt, nec tussis ulla, nec alia pectoris adfectio observatur. Per omnem sic diem a febre consuetisque illius phoenomenis aeger plena libertate gavisus est.

Die 21^a Nec hac die febris, aut ullum salutis incommodum revertitur. Corticis nunc omni trihorio drachma porrigitur.

Diebus 22^a 23^a cum optime se juvenis haberet, loco corticis, eidem decoctum amarum praescriptum; ille ipse vero die mensis 25^a, perfecte sanus, dimissus fuit (1).

PLEURITIS PERIODICA.

Maria Anna Postler, 44 annorum foemina, loca profunda et inundationibus subjecta circa Danubium inhabitans, variolas et morbillos necdum passa, decimo nono aetatis suae anno fluxum menstruum, recto semper ordinem redeuntem, experta est. Contracto matrimonio, absque graviditatis

(1) Aegri curam habuit et historiam exposuit Clemens Settale, med. Candidatus.

subsecutae ratione, hic fluxus per sex menses suppressus fuit. Tunc denuo reversus, praescriptum haec uteri secretio rythmum absolvit; sed de novo, sine causa, per novem menses retentus, fluxus ille in uteri haemorrhagiam, octodecim ante menses, conversus est. Cessante hoc profluvio, menstrua quoque hunc usque in diem cessavit secretio. Ante 14 dies, dolor lancinans brachium sinistrum, tam violens, ut ejulatus excitaverit, obsedit. Per dies quatuor hi cruciatus continuant; tunc dolor brachium deseruit, ac mox in artus omnes diffusus fuit. Venam chirurgus tunc aperit, ac praescripti medicaminis ope alvum, prima die vigesies et quinquies, altera die quinquies, sollicitat. Tunc frigus magnum, calor aequalis, ac tandem sudor subintrant. Jungitur his dolor lateris dextri thoracis violentus. Apyrexia tandem conceditur. Remanent artuum dedolatio, capitis obnubilatio, respirationis difficultas.

Idem paroxysmus tertia die, eadem hora, iisdem sub symptomatibus, redivit. Remedium et nunc chirurgus, incognitum, porrigit; febris supprimitur.

Recruduit vero ista, post octiduum, 24^a mensis junii 1804. Hac scilicet die corripitur mulier a frigore, dimidiam per horam durante; subsequitur calor, cum cephalalgia, siti, dolore ad latus dextrum thoracis pungente, oppressione pectoris ac magna respirationis difficultate. Post duas horas sudor successit. Hoc demum absoluto, capitis et dextri

thoracis dolor remanet. Nox turbatur in-somniis.

Die 25^a, circa quintam pomeridianam, eadem hora, qua primi paroxysmi apparuerant, idem paroxysmus anticipat, a prioribus, in eo, quod calor per omnem extensus esset, diversus.

Die 26^a Haec aegra ad clinicum Institutum *Viennense* delata, sequentia nobis obtulit: corpus bene nutritum, caput grave, parum dolens, oculorum ardorem, genas quidquam rubentes, linguam puram ac humidam, sitim magnam, pustulas ad oris angulos et labium inferius, respirationem difficilem, oppressam, cum dolore ad latus thoracis dextrum pungente, profundiore sub inspiratione plurimum adaucto, decubitus in latus sinistrum prorsus impeditum, tussim non adeo frequentem, cum sputis paucis, nunc albis, nunc flavescentibus, pulsum non frequentem, naturali adeo tardiorrem, debilioresque, calorem cutis non magnum, alvum apertam, totius corporis lassitudinem. Decoctum radicis saepe pro potu, fomentationes ad latus dolens emollientes, praescripta fuerunt.

Die 27^a Nox fuit quieta; hodie mane febris nulla, respiratio est facilis, absque dolore peragenda, tussis pauca, calor, pulsus naturales. Nec ad vespertas febris, si aliquam in pulsibus irritationem excipias, comparuit.

Die 28^a Somnus concessus fuit; expergefata vero aegra, respiratio quidquam dif-

ficilior est ; dolor lateris , etsi aliquomodo mitior , recrudit sub profunda inspiratione tussis , dolorque major ; abdomen , ad attactum parum dolens , caput magis grave , quidquam vertiginosum est.

Decoctum corticis saturatum cum liquore anodyno minerali *Hoffmanni* , quovis bi-horio ad uncias tres sumendum , praescribitur. Ad vespervas , symptomata matutina disparuere omnia.

Sic itaque , continuato per plures dies cortice , aegra , nulla amplius febris accessione vexata , et libere respirans , clinicum Institutum die 2^a julii laeta deseruit.

PERIPNEUMONIA CUM OESOPHAGI ABSCESSU.

Miserrimae sortis mulier 30 anorum , a 15 jam annis nupta , quatuor proles enixa , pulmonum inflammatione aliquoties correpta , per sex jam annos ab istis , respirandi difficultate ac magna in tussim proclivitate laboraverat , cum die 4^a martii 1794 ad vespervas , lumborum dolore ad dimidiam usque columnam vertebralem ascendente , frigore per aliquot horas protenso , vomitu materiae viridescantis , amarissimae , diarrhoea , debilitate magna , capitis gravitate auriumque susurru vexata fuit. His sub aerumnis , mediam versus noctem febris sat vehemens , calor , tussis et spirandi difficultas comparent. Altera die , ubera , quae , lacte satis referta , puero per sex menses jam prae-buerat , collapsa experiuntur et sieca. *Die*

3^a morbi, vomitus alvique fluxus omnino cessarunt; cum interim continuans ad lumbos dolor aegram multum vexaret, viginti cucurbitulae illis adpositae fuerunt, quarum ope dolor evanuit, ac duos fere per dies siluit, remanentibus tamen febre, tussi ac spirandi labore. *Die 6^a morbi*, novum accessit frigus, sub quo dolor ad costas spurias dexteri lateris punctorius, sub tussi ac profunda inspiratione adauctus, comparuit. Rebus ita se habentibus, *die 12^a mensis ejusdem*, morbi vero 8^a, ad clinicum *Ticinense* Institutum aegra defertur, et quae sequuntur, observanda nobis exhibuit.

Colorem faciei vix mutatum, capitis dolorem super orbitas aliquem, obnubilationem quamdam sensuum, dyspnoeam, tussim siccam, dolorem ad costas thoracis dexteri spurias, decubitus in utrumque latus non omnino impeditum, linguam aridam, sitim, calorem adauctum, pulsus duros, frequentes, magnae debilitatis sensum, oris nullam amaritiam, alvum apertam.

Venaesectio ad novem uncias instituta, decoctum hordei cum nitro et oxymelle, fomenta emollientia ad locum dolentem praescripta fuerunt.

Die 13^a Sanguis corio obductus est. Hac nocte elapsa quievit aegra, tussis pauca, dolor aliquantum imminatus, respiratio tamen valde difficilis, sitis major, et calor auctus; alvus bis mota, pulsus frequentes, duri. Repetitur venaesectio ad uncias decem.

Vespere pejus se habet. Sanguis a corio resectus; per omnem diem aegra soporosa, respiratio anxiosa, difficilis, tussis sicca, cutis arida, dolor auctus, sitis ingens, pulsus pleni, et manifeste vibrantes fuerunt. Sanguis libera e vena ducitur.

Die 14^a Nulla remissio, nulla hac nocte quies fuit ob tussim. Respiratio est difficilis, pulsus pleni, frequentes, duri sunt; alvum tractu deposuit. Vena iterum tunditur ac decem sanguinis unciae detrahuntur. Vespere exacerbatio accedit, tussis continua, sputa nulla, sitis intensa, pulsus frequentiores, duri, vibrantes sunt; dolor, sub tussi, ad nuncronatam sterni partem accusatur. Nova inituitur, ad uncias novem, venaesectio.

Die 15^a Parum hac nocte, ob tussim saevientem, dyspnoeam, quievit; caput grave dolor ad sternum quidquam imminutus; pulsus frequentes, vibrantes; sanguinis detractio fit ad decem uncias, ac eadem venaesectio ad vesperras reiteratur. Emulsio olea praescribitur.

Die 16^a Sanguis hucusque semper a corio resectus. Tussis, dyspnoea continuant; dolor quidquam imminutus; pulsus vibrantes. Item iterum sanguinis unciae mittuntur. Sicans loco dolenti nunc adponitur. Emulsio cum nitro praescribitur.

Cum symptomata ad noctem adaucta essent, sanguis de novo educitur.

Die 17^a Nox fuit inquieta continuante tussi; or tamen cutis ac respirationis dif-

ficultas quidquam mitescunt. Repetitur emissio oleosa.

Die 18^a Tussis continua per noctem fuit; respiratio difficilior, dolores tamen cessarunt; calor et sitis urgent; alvus libera. Ad vespas exacerbatio summa accedit, tussis siccā, pulsus manifeste duri sunt. Sitis ardens, calor adauctus, caput grave est. Sanguis iterum unciae octo emittantur.

Die 19^a Nox satis quieta fuit, tussis moderata, respiratio minus difficilis, aliquis mador ad cutem comparet; caput sudat, dolores nulli; et se melius habere, ipsa agnoscit. Praescribitur haustus salinis cum nitro. Vespere, omnia in melius conuant. Mixtura oleosa propinatur.

Die 20^a Pro voto res incedunt: calore nullus, sitis moderata, pulsus frequens, sed non duri, respiratio longe liberior. Prescribitur haustus salinus cum grano tartari emetici.

Die 21^a Eodem tenore incedit morbus, tussis moderata, multa vero sputa, saponae indolis, sunt.

Die 22^a Sputa continuant, sudor palmaris ad frontem, pulsus frequentes et manifeste duri.

Die 23^a Nox fuit quieta, sputa surcopiosissima; sed tumoris chronici, ad gulam haerentis, tensionem aliquam observamus; nullum tamen aegra hic dolor accusat. Vespere aliqua exacerbatio, progressu frigoris sensu aliquo.

Die 24^a Tussis et sputa eodem modo con-

tinuant; irritatio in pulsu manifesta est, et dolorem aegra ad juguli tumorem accusat. Augetur ad vespervas hic dolor, et aliqua in deglutiendo adest difficultas.

Die 25^a Omnia in eodem statu haerent. Ad vespervas, dolor sub deglutatione iterum auctus; tumor manifeste increvit. Frigus et febricula accesserunt.

Die 26^a Parum quievit aegra, debilitatem summam accusans, pulsus contracti et duri sunt; tumor summopere calet ac dolet; deglutitio difficilior quam antehac. Ad vespervas dolor lancinans ad sedem tumoris est; pulsat et rubet tumor; tussis et sputa continuant sat copiosa. Cataplasma tumori imponitur cum linimento volatili.

Die 27^a Sat bene quievit aegra hac nocte et alvum deposuit, dolor tamen, et deglutationis difficultas continuant. Tumor, adhucdum inflammatus et durus, pulsat ac dolet. Pulsus durities prodit. Solutio mannae in sero lactis propinatur.

Sic ad *diem 29^{am}* usque res incedit. Sputa magna copia prodeunt. Decoctum corticis cum emulsione arabica porrigitur. Ad vespervas dolor multum adauctus, deglutitio valde difficilis est.

Ad *diem 2^{am}* mensis aprilis res ita, sub exacerbationibus hinc inde, continuant. Post mediam noctem, tumor per oesophagum, cum insigni puris quantitate per vomitum rejecta, apertus fuit. Ex momento aegra sublevatam se sentit. Vespere tumor subsedit, mollis fuit et indolens, febris fere nulla;

deglutitio facilis. Sic ad sextam usque Aprilis diem convalescentia obtinetur perfecta, suisque aegra felix restituitur (1). Circa idem tempus, simile fere exemplum habebatur in *Ticinensi* nosodochio. Peripneumonia scilicet, cujus curam habuit vir expertissimus, ac noster in cathedra *Ticinensi* tandem successor, *Raggi*, in juguli totius praegrandem tumorem abivit, qui, profunde suppuratus, felici cum exitu sponte in oesophagum apertus fuit.

PERIPNEUMONIA CUM OESOPHAGI TUMORE
LETHALI.

Sors faeminae alterius, triginta annos natae, 1789 in clinicum *Ticinense* Institutum susceptae, non tam felix fuit. Haec scilicet, a peripneumonia vehemente admodum prehensa, quarta morbi die ad nos delata, sex vero per dies venaesectionibus aliisque remediis solitis pertractata, ab inflammatione pulmonum vix non in totum liberata videbatur; cum altera die, post noctem insomnem, de anterioris sinistrique juguli ardore, dolore, sub deglutitione auctis, conqueri inciperet. Febris tunc nova mulierem, satis tamen moderata, invaserat. Inspectis faucibus, nec in istis, nec ad velum pendulum, aut ad tonsillas, rubor comparuit; movuit vero aegra: non hic loci, sed profundius, circa

(1) Auctor historiae est *Ladislaus Robolotti*, Cremonensis, med. Candidatus.

sterni principium , ad sinistra , dolorem urgere. Tumor interim hic loci nullus, neque calor major fuerunt. Respiratio , ut heri , satis videbatur libera. Potus assumptus , locum dolentem transibat quidem , sed dolorem augebat. Cataplasma emolliens , illito prius linimento volatili, ad illum posuimus. Tres vero post dies , liquidis jam omnis negabatur ad ventriculum accessus ; atque tunc quidem locus dolens quidquam turgebat , et ad attactum valde dolebat. Febre simul ac pulsum duritie auctis , binas adhuc sanguinis missiones instituimus. Sed alterum tunc , insolitum prorsus , nec visum nobis antehac phoenomenon comparuit: manus scilicet sinistra, ad dorsum oedematosa, tumere primum, dein et brachium ac mamma sinistra sensim sensimque insigniter inflari coeperunt.

Haec ultima nempe , absque ullo rubore, cum antehac flaccida a thorace pependisset, erecta nunc, ut in virgine torosa, maximam thoracis partem sinistri occupabat , altera mamma triplo certe volumine major , ad attactum renitens , tensa, nec indolens. Tumor vero brachii, a manu incipiens, ad humerum usque procedebat, insignis plane, ac motum partis hujus prorsus impediens. Incepit nunc et respiratio fieri difficilior , ac adhibitis licet fomentis, primum siccis, dein emollientibus , et mamma et brachium mole semper ac dolore increverunt. Tumor tunc ad jugulum sinistrum auctus , tracheam comprimendo, animam ducendi facultatem vix

non omnem ademit, ac infelicem tandem mulierem die morbi decima septima suffocavit.

SECTIO CADAVERIS.

Incisis super loco juguli sinistro integumentis, ac musculis remotis, tumor ovi magnitudinis, profundus, cum vicina trachea cohaerens, a dextra oesophagi parte exoriens, ad venam jugularem, quo loco huic ductus thoracicus inseritur, extensus, et hanc non minus, quam venam subclaviam comprimens, versus apicem tracheae propiorem, jam quidquam pure subliquido repletus, comparuit. Vasa mammae lymphatica innumera, quasi injecta, suis cum glandulis turgabant insigniter. Similis fuit glandularum subaxillarium, ductuumve lymphaticorum, quidquod istorum etiam venarumque omne per brachium constitutio. In thorace sinistro unciae aliquot seri, circa pulmonem, haud multum inflammatum, stagnabant. Omnis igitur tum brachii, tum mammae tumor, ex impedito sanguinis non minus, quam lymphae his e partibus reditu, suffocatio vero aegrae, ex tracheae per tumorem vicinum compressione, venerunt.

DE PERIPNEUMONIAE EXITU IN GANGRAENAM.

Ubi de peripneumoniae exitu, in *Epitomes*, L. II §. 193. p. 148. locuti sumus, diximus simul: » de *gangraena pulmonum*,

» rarissimis, quae ipsimet nos vidimus,
 » exemplis nobis constat. In pulmonis, cum
 » pleura simul inflammata, concretionem,
 » hujus quidem cum illo communicatam
 » conspeximus gangraenam. « Non parum
 haec assertio, illi plurimorum de peripneu-
 monia scriptorum adversatur; cum interim
 centena defunctorum ex ista hominum ca-
 davera cum majore praecisione secuerimus;
 vix non omnem pulmonum ex illo morbo
plumbeum vel et *nigrum colorem*, ex san-
 guine venire intelleximus: qui cruor, aegro
 diutius in dorsum decumbere coacto, vel et
 cadavere hanc in partem, per diem aut ul-
 tra, reposito, in vasis et parenchymate po-
 sterioris maxime regionis pulmonum resta-
 gnat, atque nec partium solidarum corrup-
 tionem gangraenosam, sphacelosam, nec ul-
 lum, quem gangraenae humidae spargunt,
 foetorem agnoscit. Vel igitur aegri pneumo-
 niis detenti, nunc ex pulmonum parenchy-
 mate ac bronchiis per secretionem in illis
 morbosas celeriter infarctis, oppletis; —
 aut ab hydrope thoracis hoc viscus inundan-
 te, comprimente; — vel per vomicas, ab-
 scessus *suppurantur*; — vel a *pseudomem-*
branis pulmones exterius, in modum vagi-
 nae strictioris involventibus, angustum in
 spatium hi coguntur, *coarctantur*; — vel
 partibus vicinis pleurae costali, diaphrag-
 mati, pericardio, mediastino iidem *concre-*
scunt; — vel demum *duritiem*, futurae dy-
 spnoeae matrem, concipiunt ac foveant; raris-
 simis vero in casibus respirationis hoc viscus

gangraenae subjicitur. De hac igitur veritate convicti, ac *Vindobonensi* demum nosocomio amplissimo in rebus medicis dirigendo praefixi, dum in schedulis istius mortuariis frequentissimam *gangraenae pulmonalis* mentionem injici videremus; cadavera eorum, qui ex ista periisse dicebantur, sedulo aperiri curavimus; atque nec unum quidem ex istis, de vera gangraena testimonium dedisse reperimus. Cum vero descriptio tam rari exitus morbi frequentissimi ac simul quamplurimis lethalis, ad historiam illius naturalem pertineat; duo, quae nobis propria sunt, gangraenae pulmonalis exempla, quorum primum, ex inflammatione ad musculos thoracicos et pleuram, concreto huic ultimae pulmoni communicata venisse, — alterum, ob defectum destructae pulmonalis substantiae nequidem sine magna restrictione gangraenae nomen meretur, hic exponimus.

GANGRAENA PULMONIS ET MUSCULORUM THORACICORUM.

Carolus Antonius Fradagradi, ad clinicum Institutum *Ticinense*, die 12^a Decembris 1785 susceptus, per duos integros menses laboraverat febre erratica, intermittentium familiae adfini. Nullis contra hanc auxiliis fruitus; ac suis laboribus intentus, in febrem continuam incidit cum virium prostratione, frigore, calore, tussi, sputis sanguine quidquam tinctis, dolore thoracis sub tussi auctis ac plurimum molestis. Continuabant haec

symptomata per decem dies cum exacerbationibus vespertinis, aliquando cum deliriis. Postquam clinicum Institutum aeger accessisset, sequentia nobis obtulit morbi phenomena: colorem cutis ex rubro flavescentem, oculorum albugineam flavam, saporem inquinatum, linguam ac dentes mucro denso, flavescente obductos, pulsus exiles, debiles, subduros, respirationem laboriosam, tussim difficilem, sputa tenacia.

Praescribitur haustus salinus, cum vini antimoniatu *Huxhami* drachma una, camphorae solutae granis tribus, et oxymellis uncia una. Clyster injicitur, ac duo vesicantia ad crura ponuntur. Ad vesperas, accessio mitior, alvus ter soluta; lingua ad apicem humidior est.

Die 13^a Somnus nocte elapsa paucus accessit. Nunc tussis aucta cum sputis tenacissimis, pulsus minus humiles. De aliquo dolore versus dextram et superiorem thoracis partem aeger conqueritur. Respiratio frequentior ac magis difficilis est. Lingua, dentes puriores sunt, oris amaror continuat.

Haustus salinus cum tribus Kermetis granis, ac decoctum emolliens pro potu porriguntur.

Die 14^a Noctu sat bene dormiebat, modo tussi molestatus. Hodie pulsus minus frequentes, sputa facilia sunt, alvum aeger bis deposuit. Ad vesperas, calor ad caput maximus, pulsus frequentior. Sequitur nox insomnis. Dolor ad latus dextrum respiratio magis anxiosa, sputa copiosiora, sed fla-

va, lingua sicca. Solutio tamarindorum, cum cremore tartari, et grano tartari emetici, paulatim sumenda traditur. Ad noctem exacerbatio, sputa difficillime prodeunt. Vesicans loco thoracis dolenti imponitur.

Die 15^a Nox satis quieta fuit nunc lingua purior, os non amarum, oculorum flavedo disparuit. Tussis continuat cum sputis copiosioribus non flavescentibus, sed aspectu *purulentis*. Pulsus molles debilesque, vires prostratae, urinae cum sedimento lateritio. Haustus salinus cum vino antimoniato et camphora, repetitur. Vespere, exacerbatio, caput quasi constrictum, ponderosius.

Die 16^a Noctem placide transegit aeger, sudavit, ac alvum abunde deposuit; tussis minus molesta, sputa copiosiora sunt. Dolor in dextro thorace obtusus, ad ejusdem lateris scapulam extenditur. Urinae sedimento praeditae.

Die 17^a Nox hesternae similis, sudor copiosus, pulsus minus frequentes ac debiles. Adpetitus ciborum aliquis.

Die 18^a Nulla mutatio; cutis flavedinem amisit. Sedimentum furfuraceum in urinis. Nulla ad vespertas exacerbatio.

Die 19^a Quievit noctu, de *ardoris* sensu ad locum thoracis pridem dolentem conqueritur aeger.

Die 20^a Nox tranquilla, fames accusatur. Augetur victus. Aliqua ad vespertas exacerbatio.

Die 21^a Nox insomnis, pavoribus inter-

mista. Sitis ingens, respiratio laboriosa, sputorum rejectio difficilior, dolor ad scapulam molestus, succedunt. Vesicans ad scapulam ponitur.

Ad vespervas, symptomata augentur, ac dolor in dextro ac superiore thorace continuus est. Sputa sanguine inspersa, pulsus duriusculi, frequentes, respiratio valde laboriosa, caput grave, lingua sicca, virium prostratio. Frigus ab aegro susceptum fuisse referunt.

Die 22^a Nox minus ardua. Sudoribus aeger perfunditur. Remittunt nunc symptomata; pulsum tamen adest durities.

Ad vespervas, similis haesternae exacerbatio. Venaesectio instituitur, enema injicitur.

Die 23^a Tussis sicca, sudores copiosi, inutiles, pulsus parvi, duri, respiratio laboriosa. Sub quovis corporis motu, dolor ad scapulam dextram exoritur. Bina ponuntur vesicantia.

Ad vespervas exacerbatio, et cum symptomata dyspnoeae, doloris urgerent, sanguis ad septem uncias emittitur.

Die 24^a Nox admodum molesta. Dyspnoea, tussis, dolor vexaverant aegrum. Sic ad 27^{am} usque res aequo more, cum vespertinis exacerbationibus incedebant, viribus semper magis fatiscentibus. Hac die magna sputorum fuit copia; oedema in dextrae manus dorso, et ad pedes comparuit. Continuus in dextra scapula dolor. Corticis decoctum praescribitur.

Ad vespervas, cum vesicans emplastrum

adplicare chirurgus contenderet, ad locum dolentem, tumor in eodem sensibilissimus comparuit et fluctuans, quo illico inciso ichor non modica quantitate effluxit. Sublevata fuit inde quidquam respiratio.

Die 28^a Nox flebilis praecessit. Frigus summum omne corpus, praecipue vero locum thoracis jam diu dolentem, corripuit. Difficilior sputorum rejectio est. Sub tussi dolor nullus ad scapulam se prodit, oedema vero manus dextrae auctum, facies ipsa tumidula, aeger inquietus est.

Eodem sic tenore incessit morbus tabem manifestam adnuncians. Rigor bis in die comparuit; frigus maxime circa vulnus urgebat; sequebatur ad noctem sudor copiosus, post cibum genae rubebant.

Die 32^a Ichorem manifeste ex pulmone venire, bullae aereae illi commistae denotabant. Tandem viribus quotidie detritis, vulneris labia, vicinaeque partes livescere coeperunt. Accedunt *die 34^a* deliria, extrema debilitas; ichor e vulnere, sanguine commistus, prodibat. Sequenti die, mors finem posuit miseriis.

SECTIO CADAVERIS.

Maculae ex rubro nigrescentes cadaveris superficiem confertissimae occupant. Ulceris labia partesque proxime adjacentes, de gangraena testantur. Dorsales musculi plerique de hac ipsa participant. Ipse musculus infrascapularis in tabum conversus. Via, qua

ichor ex pulmone effluebat, erat inter secundam et tertiam costam, pone dorsum; ac eo loco muscoli intercostales tam externi, quam interni a gangraena erant correpti. Aperto vero thorace, pulmones utrimque cum pleura cohaerebant, dexter longe magis sinistro. In utroque cavo pectoris aquae copiosae stagnabant, subrubro colore tinctae. Pulmo dexter inflammatus summopere, pars vero ejus superior, arctissime cum pleura revincta, et quo loco ulcus inter costas haerebat, *sphacelosa* fuit, ac tetrum foetorem spargebat, sinum offe-rens, ex quo ichor in vita propullulaverat. In cavo abdominis, aquae non multum repertum fuit. Lien mole auctus, hinc inde durus, hepar solito majus non vero morbosum repertum fuit (1).

FOETOR QUASI GANGRAENOSUS PULMONIS
INFLAMMATI.

Syrus Compari, triginta annorum rusticus, floridus, robustus, nullis unquam morbis vexatus, anno elapso ab equo dejicitur. A lapsu, dolor ad epigastricam regionem, respiratio difficilis, et susurrus ad aurem dextram successerunt; nulla tamen aut contusionis vestigia externa, aut febris compa-ruerunt; hinc nulla adhibita medela, spon-

(1) Morbi historiam adnotavit *Dominicus Farina*, Med. Doctor.

te sensim ab istis, dyspnoea quadam et auris susurru exceptis, convaluit.

Tertia die mensis decembris 1792, ad meridiem, vir hic a frigore per horam protracto, subsequente calore, nullo tamen sudore, derepente corripitur. Dolor pristinus, quem per multos jam menses non amplius persenserat, sub tussi ac profunda inspiratione nunc recurrit, vox rauca superaccedit. *Die mensis 4^a*, symptomata singula mitiora videntur; ad meridiem vero frigus cum illorum omnium augmento aegrum adoritur. *Die 5^a*, mane, symptomata iterum remittunt. Ad meridiem, frigus denuo supervenit, quod calor ac pristina symptomata, violentia majore comitantur. Sic eodem ritu singula incedunt 8^a mensis et 6^a morbi, dum circa vespervas ad clinicum Institutum *Ticinense* accederet. Facies tunc subflavo colore notata est, quem vultus colorem tribus abhinc annis, sub oryzae cultura laboriosa, humidoque sub tecto degens, aeger contraxerat. Dolor capitis sat fortis accusatur; auris dextrae susurrus auctus est, ac si magnae avium cohortes, ut aeger se exprimit, cantum in aure exererent. Os amarum, lingua humida, muco albo quidquam obducta, sitis magna, dolor et ardor faucium, cum raucedine sat magna; difficultas deglutiendi respirandique, tussis aspera, sub qua dolor ad scrobiculum cordis augetur sputa pauca, viscida, se produnt. Nec ructus, nec nausea nec vomitus obveniunt; abdomen molle, alvus aperta, calor

cutis ardens et siccitas, pulsus frequentes, pleni ac duri comparent. Nullam morbi causam aeger, nisi frigus admissum, accusat. Venaesectio ad uncias novem instituitur; pro potu decoctum hordei cum nitro et oxymelle praescribitur.

Die 9^a Febris eadem, pulsus pleni, duri, vocis raucitas continuant, alvus bis deposita fuit. Vena iterum ad novem uncias secatur. Emulsio amygdalina cum nitro et mucilagine gummi arabici praescribitur. Serum lactis pro potu est. Linctus demulcens conceditur.

Vespere alvus bis mota fuit. Ardor faucium continuat, similisque sensus tracheam occupat. Pulsus minus frequentes minusque duri ac pleni sunt. Vapores ex aqua et aceto hauriri curavimus.

Die 10^a Nox fuit inquieta; alvum aeger ter deposuit. Ardor, dolor faucium, tracheae, tussis, continuant. Dolor ad caput et scrobiculum cordis imminutus est. Pulsus frequentes ac duri sunt. Hirudines decem circa laryngem ponuntur.

Vespere, bis alvum deposuit; de cephalaea auriumque susurru, nec minus de laryngis ardore, aeger maxime conqueritur. Venaesectio repetitur; vapores continuantur et linctus.

Die 11^a Parum quievit hac nocte, bis alvum deposuit aeger. Os non amarum, lingua pura est. Aurium susurrus minor, tussis aucta, sicca, sputa aquosa, dolor, ardor, siccitas per omnem tracheae decur-

sum ; respiratio difficilis , anxiosa ; deglutitio laboriosa ; pulsus frequentes ; vibrantes , duri sunt et pleni . Sanguis hucusque emissus , corio semper obductus fuit . Alter nunc ad libram emittitur cruor . Vesicans laryngi adponitur . Cum eadem ad vespertas urgerent symptomata ; sanguinis adhuc unciae quatuordecim eductae fuerunt .

Die 12^a Nox inquieta ; alvus bis mota , urinae fere naturales , facies collapsa , hippocratica , dolor maximus ad aures ; lingua sicca . Dolorem ardoremque tracheae non amplius aeger accusat , sed modo magnam per omnem ejus decursum siccitatem esse conqueritur ; sputa vix ulla , respiratio anhelosa , difficilis , tussis sicca , sub qua aeger dolorem punctorium ad hypochondrium sinistrum , inter ultimas duas costas veras indicat . Pulsus vibrantes , pleni durique . Venaesectio ad libram — oleum olivarum ad uncias sex cum mucilagine arabica et syrupo althaeae , ad duas uncias omni bihorio sumendum , — fomentationes emollientes ad locum dolentem , praescribuntur .

Vespere eadem symptomata continuant . Alvum quater deposuit , respiratio anhelosa , difficilis . Dum bibit aeger , tussis sicca , et dolor ad hypochondrium sinistrum excitantur ; aliqua deliria obveniunt . Medicinae ultimae portionem evomit . Unguentum mercuriale laryngi et tracheae illinitur .

Die 13^a Hac nocte fere semper soporosus fuit aeger ; expergefactus delirat . Labia livida , facies collapsa , magna debilitatis sensa-

tio, surditas aliqua, respiratio inaequalis, anhelosa, adnotantur, tussis pauca, sputa *subinembranacea*, alvus bis deposita, pulsus adhuc vibrantes, pleni ac duri, ad novam sanguinis missionem sollicitant.

Ad vespervas singula in pejus ruunt; sopor, tussis continuant, sputa nulla, pulsus adhuc duri, sed inordinati sunt. Vesicans thoraci imponitur. Hora noctis circiter octava cum dimidia, aeger suffocatus periit.

SECTIO CADAVERIS.

Post diem unam et dimidiam a morte, sub coelo frigido et sicco, cadaver hoc dissectum, nec minimum putredinis externae signum manifestavit: musculi thoracis erant firmiores, sicci; aperto thorace, foetor multus ex eodem prodiit. Pulmones anterieus flaccidi, hinc inde exterius rubri. In sinistro pectoris cavo, ad quod dolorem punctorium aeger ad ima persenserat, modo inferior lobus pulmonalis mole ac duritie quidquam auctus, sed inter loborum interstitia aquae rubellae plures unciae haerebant, pseudomembranis inclusae. Pulmo dissectus ubique insignem, toleratu difficilem, et cadaverosum prorsus foetorem spargebat, sanies ex eodem infensissimi odoris, et corrupta effluebat. In dextro thoracis cavo, in quo pulmo non inflammatus haerebat, serum sanguinolentum, ad uncias quinque circiter, stagnabat. Pulmo hic etiam dissectus, etsi non turgere, foetebat. Bronchiis, trachea, ac ipso

demum larynge apertis, et mucro abinde absterso, tenaci, rubro subflavo, superficie sua interna nulla ruboris ac inflammationis vestigia illa prodebant. Ad fauces quoque nec rubor, nec tumor comparuit. Ad aurem vero dextram, internam, vera inflammatio superficialis adnotata fuit; nec a mucro abstersione rubor hic disparuit. In ipso etiam pericardio aquae rubellae ac sanguine tinctae, tres circiter unciae haerebant. Nec ipsum ad cerebrum, nec ad viscera abdominis, morborum quid detectum fuit (1).

In *Epitomes* L. II. §. 193. p. 150. de peripneumoniae diverso exitu loquentes, diximus: « Exanthemata pustulaeque urentes ad
« superficiem corporis depositae, maxime vero erysipelas cum constantia ad cutem
« comparens, peripneumonias, imprimis malignas, interdum dissiparunt. » Praeter aliorum vero, quae hanc assertionem confirmant, observationes, propriam habemus, quam hic, breviter contractam exponemus.

PERIPNEUMONIA PER EXANTHEMA PUSTULOSUM
JUDICATA.

Mense decembris 1792, faemina ad Institutum clinicum *Ticinense* suscepta, punc-

(1) Historiam morbi exaravit *Franciscus Nocetti*, celebris nunc Chemiae in Academia *Ticiniensi* Professor.

torio lateris sinistri thoracis dolore adfecta, difficulter admodum respiravit, de gravi pectoris oppressione conquesta. Febris aderat magna, pulsus durus ac plenus, decubitus in latus adfectum denegatus, tussis aspera. Instituta venaesectione, pustulae urentes, *Zosteri* non absimiles, insignem ad numerum, ad brachium dextrum, circa cubitum, comparuerunt. Ardorem hae pustulae insignem excitabant, ac indies dolor, cutis tensio et phlogosis crescebant, tumebat omne fere brachium; sed morbus principalis evanuerat, pulsus, ex plenis ac duris, reddebantur molles, fere debiles, hinc inde intermittentes, vix febriles. Post octo circiter dies, dolor, a superimpositis emollientibus non imminutus, ab aqua vegeto-minerali *Goulardi* et ab unguento saturni dispersus fuit, posito tamen simul inter scapulas vesicante emplastro, ac antimonialibus remediis interne adhibitis.

PERIPNEUMONIAE COPIOSO URINARUM
FLUXU JUDICATAE.

Annis 1791 et 1792, cum plurimae peripneumoniae, eaequae gravissimae, *Ticini* regnarent, conspicuum aegrorum, hoc morbo adfectorum, numerum conspeximus, qui, sub urinae, licet pallidae aut clarae, atque omni sentimento destitutae, copiosissima excretionem felicissime judicati fuerunt. Ad libras scilicet decem, duodecim et ultra, per multos satis dies mingebantur tales uri-

nae nec recordamur aegri ullius, qui sub tam insolito phœnomeno hoc a morbo perierit. Nec tamen sitis his in aegris, quam in aliis peripneumoniis, major, nec alterius naturae vel potulenta, vel medicamina, quae aegris obtuleramus, fuerunt. Modo unum, ex multis, exemplum huc faciens adducimus, in hoc etiam, etsi non inauditum, memorabile tamen, quod aeger, de quo agimus, *undecima* jam *peripneumonia* correptus, hanc etiam felici sub omine superaverit.

PERIPNEUMONIA UNDECIES REPETITA.

Josephus Massara, 33 annos natus, vir robustus ac bene pastus, licet temperate satis vixisset, plurimis tamen morbis subiectus fuit, quos inter aliquae febres periodicae numerandae veniunt, a quibus insignis, et lucusque persistens, lienis intumescencia natales traxit. Sed morbus huic viro maxime familiaris, peripneumonia fuit, ita ut decies jam et ultro fatali hoc malo conflictaretur, ex quo bis in clinico Instituto *Ticinensi*, sub methodo debilitante, seu, ut vocant, antiphlogistica, felicissime convaluit. Dolor lateris punctorius, sub diversis his pneumoniis, gradatim varias thoracis partes peragrarè, nec unum sibi ac eundem semper locum, quod in aliis solenne est, eligere soluerat, ita ut nullus fere in theca pectoris locus esset, ad quem morbus idem non quondam resedisset.

Die 15^a mensis novembris 1792, hic vir, dum iter parvum absolveret, a diarrhoea invasus fuit, atque eadem ipsa die, domum redux, sub vespere, a febrili frigore, sat tamen levi, invaditur; iterum atque iterum mox mediocriter calet, ac multam bilem, repetitis vicibus per vomitum rejicit; tandem a dolore lateris sinistri thoracis, cum tussi ac dyspnœa prehenditur. *Die sequente*, longa jam experientia methodum curandi edoctus, venam sibi aperiiri voluit, et copiosum ex ea sanguinem eduxit, unde levamen quidem non paucum persenserat; sed copiosum quoque cruorem per sputa rejicere coepit. *Die 16^a mane*, ab audacis manu chirurgi pulvis aegro emeticus porrigitur; nec tamen magis abhinc, quam alias in decursu morbi vel sponte solebat, vomuit. Hac eadem vero die aeger, ad vesperras, idem ad institutum clinicum delatus, admodum difficulter celeriterque respirabat. Aderat quoque punctorius sinistri thoracis, cum ponderis sensu conjunctus dolor; tussis, sat quidem frequens, sed non vehemens erat; decubitus in latus adfectum faciliior, in sanum difficilis, os amarum, lingua subalba, sat tamen pura, facies rubra, oculi splendentes; venter, si lienis regionem excipias, sat mollis, diarrhoea, cutis calor moderatus, pulsus non adeo frequentes, sed admodum pleni ac vibrantes. Mox cruoris unciae sedecim e vena emittuntur, decoctum hordei cum nitro et oxymelle pro potu propinatur, fo-

mentationes emollientes loco adfecto imponuntur.

Die 17^a Alvus ter mota, respiratio quidem facilior, dolor lateris minor, novus ad posteriora thoracis dolor, leve hora quinta matutina frigus, sputa quidquam sanguine tincta, cruor emissus heri, denso corio obtectus, calor et sitis mitiores, pulsus minus frequentes et duri. Vena interim ob reliquam, nec imminutam, dyspnoeam, sanguinis libra una depletur.

Vespere, febris aucta, sed respiratio a detracto sanguine, longe facilior, alvus quater mota, pulsus frequentiores et duri. Sanguis ad libram mittitur.

Die 18^a mane. Noctu, copiosus sub somno sudor; sed a denudato tunc corpore insignis refrigeratio, ac febrilis quasi frigoris sat longus sensus. Exinde mox dolor ad posteriora disparuit, et ad latus denuo increvit. Sputa sanguine striata sunt. Mittitur sanguis ad libram. Ad vespertas febris aucta, pulsus pleni ac duri. Repetita fuit ad libram unam venaesectio. Clyster injicitur.

Die 19^a mane. Alvus ter mota, tussis frequens, sputa cruda, parum tincta, respiratio difficilis, pulsus pleni ac duri. Cruor ad libram deducitur.

Vespere, alvus semel mota, febris exacerbatio exigua, pulsus minus pleni, sed duri, facilior respiratio, dolor minor. Enema injicitur.

Cum ad noctem difficultas spirandi au-

geretur, novem unciae sanguinis detractae fuerunt.

Die 20^a Respiratio adhuc difficilis, dolor sub profunda inspiratione auctus, pulsus pleni ac duri; debilitas et sese erigendi impotentia. Sanguis tamen ad libram extrahitur.

Vespere, febris aucta, pulsus duri, sat pleni, respiratio difficilis, ventris hinc inde tormina levia et flatus copiosi licet alvus bis fuerit excreta. Venaesectio ad novem uncias instituitur.

Die 21^a Respiratio facilior, pulsus minus pleni ac duri, dolor lateris minor. Alvus semel soluta. Haustus salinus praescribitur.

Vespere melior aegri status est: respiratio facilius absolvitur, pulsus sat molles sunt. Clyster infunditur.

Die 22^a Dormivit aeger, sudavit per omne corpus; dolor lateris continuat, ad posteriora quidquam extensus; respiratio sat facilis pulsus vix duri, urina cum sedimento, exscreatus facilior. Granum tartari emetici haustui salino superadditur.

Vespere, febris quidquam aucta, pulsus pleniores, subduri, dolor lateris idem, alvus ter mota. Hirudines octo ponuntur ad latus dolens, clyster injicitur.

Die 23^a Tussis frequentissima, vehemens fuit, vox rauca, aliqua pulsum vibratio, minor lateris dolor.

Vespere febris exasperata, pulsus pleni

ac vibrantes , dolor lateris idem , alvus semel mota. Venaesectio ad uncias octo.

Die 24^a melius aeger se habet , pulsus minus pleni sunt. Aliquis adhuc dolor lateris est , respiratio facilior , alvus non mota , urina cum sedimento. Enema porrigitur.

Vespere , exacerbatio notabilis , raucedo , pulsus plenior , dolor lateris perstat.

Die 25^a et 26^a Eadem rerum constitutio. Linctus , praeter haustum salinum praescribitur.

Die 27^a Dolor lateris idem. Oppressio ac dolor ad ventriculum , pulsum aliqua vibratio. Mannae unciae tres in sero lactis solutae , omni hora ad vasculum propinantur. *Urinae copiosissimae* , sed naturalibus similes , redduntur.

Vespere ; insigne malorum levamen habetur , febris nulla , alvus bis copiose soluta , dolor lateris idem. Linimentum huic volatile cum camphora inungitur.

Die 28^a Copiosae admodum , sed clarae pellucidae , fere pallidae , urinae fluunt.

Die 29^a *Ultra duodecim libras urinae* ejusdem minxit aeger , ac magnum inde levamen persensit ; ciborum desiderium , sub febre nulla , subintrat , vires redire incipiunt.

Die 30^a magna iterum urinae similis quantitas , effluxit.

Die 31^a Eadem urinarum , nisi major , quantitas , per plures adhuc dies excreta fuit ; majorem aeger victum desiderat et ob-

79
tinet. Ob dolorem lateris non penitus fugatum, vesicans huic emplastrum imponitur, unde dolor omnis disparuit, aegerque sensim perfecte convaluit (1).

PLEURAE INFLAMMATIO ET GANGRAENA.

Joannes Antonius Abelli, bubulcus, annorum 30, vino deditus, bonaque valetudine instructus, anno praterlapso per coitum impurum medorrhoeam contagiosam cum bubone contraxerat, quo bubone tandem suppurato, sanitas aegro restituta fuit. Prima nocte anni 1789, cum sanus lectum petiisset, post somnum quatuor horarum, per tussim expergefactus, dolorem validum ac dilacerantem inter scapulas persensit cum horrore totius corporis, cui calor successit, nullo tamen sudore pedissequo. Hic dolor paulatim a scapulis ad lumbos usque propagatus, febrique continuae junctus fuit. *Die 2^a* mensis, ad vespertas, clinicum *Ticinense* aeger petiit, ac mox instituto morbi examine, sequentia nobis obtulit: dolorem ad utriusque orbitae partem superiorem, respirationem anxiam, perdifficilem, tussim asperam, dolore plenam, cum sputis sanguine tinctis; ruborem quasi scarlatinum ad jugulum partemque superiorem pectoris; os amarum, linguam mucosam albo obductam, nauseam, vo-

(1) *D. Andreas Sniadecki*, nunc celebris academiae Vilmensis Professor, historiam morbi conscripsit.

mituritionem, vomitum ipsum materiae amaræ, sitimque magnam, ponderis ac distensionis molestæ sensum in epigastrica regione, hypochondria tensa; ad attactum sensibilissima, abdomen quidquam turgidum, alvum constipatam, pulsus exilissimos, vix percipiendos, celeriores tamen et intermittentes, jactationes, stuporem quemdam, sensibilitatem imminutam, et frigus extremitatum inferiorum. Interrogatus aeger de causis: quatuor abhinc diebus se, ebrium, in aere gelido ac patulo diu jacuisse, nec non duos ante dies, cum grave pondus repetito nixu elevasset, se lacerationis quasi sensum circa dorsum, brevi tamen tempore durantem, habuisse, respondet.

Aceti ammoniacalis unciae quatuor, aquae florum sambuci unciae sex, ac tartari emetici grana duo, de quibus omni bihorio unciam sumat aeger, — linimentum volatile cum camphora, dorso ac lumbis inungendum, — fomenta calida, et enema praescripta fuerunt.

Vix assumtam medicinam aeger per vomitum rejecit. Injectum clyisma mox, inscio eodem, effluxit. Tandem tertia post mediam noctem hora, suffocationis metu percussus miser, corpus a sedendum in lectulo erexit, ac brachia, petendi auxilii gratia, attollens, supinus iterum concidit, spiritumque efflavit. Ex ore defuncti spumante, fluxus ex nare dextra sanguineus ex sinistra vero serosus insecutus est, commoto quidquam pectore ad libram et ultra auctus.

SECTIO CADAVERIS.

Dorsi superficies, extremitates inferiores aurisque sinistra livorem manifestant. Aperto thorace sinistro, pauca sanguinis fluidi portio detegitur. Pulmo sinister, ad posteriora lividus, inferius cum diaphragmate, ac ad latus cum pleura concretus, et quasi sanguine adperso notatus, lobi inferioris substantia, quidquam crassior, turgida, ponderosior, et aliquomodo, posterius praecipue, inflammata est. Pulmo dexter, ad superiora, cum pleura concretus. Hoc eodem in cavo, sanguinis fluidi unciae quatuor, circa, haerent. Aperto pericardio parca fluidi quantitas, solita non superior, reperitur. Cor flaccidum est. In ejus cavo dextro, sanguinis paucus, grumosus, in sinistro polyposa molisque substantia detegitur. Atrium cordis sinistrum, ad superficiem internam, lividum, valvula septo medio proxima, inflammata, dissecti cordis interna superficies magis rubra, valvulae ipsae semilunares rubescentes sunt. Hoc de rubore pulmonalis arteria minime participat. Pleura dextri lateris, sanguine licet sollicite absterso, inflammata, livida, inter quartam vero et septimam costas veras, nigra conspicitur. Dissecta pleura lividae magis ac molliores sunt fibrae musculorum intercostalium. Pleura quoque sinistri cavi thoracici, affecto pulmone respondens, inflammata pariter ac livida observatur. Hac detracta, comparet ecchymosis cum infarctu, fibris intercostalibus, a tertia

costa vera, ad ultimas usque, intermedio. Tracheae superficies interna valdopere inflammata, et sanguine quidquam tincta. Haec tracheae inflammatio, per bronchia extensa, in minoribus ex istis quasi major est visa. Nullum in thoracis cavitatibus disrupti vasis vestigium reperitur. Dissectis musculis dorsalibus, ac iisdem a columna vertebrali separatis, circa septimam apophysin vertebrarum spinosam, livor, utraque ex parte, occurrit conspicuus simulque profundus. In genere, versus cervicem, vasa sanguinea magis sunt turgida. In abdominis cavo, nihil, quod morbosum esset, delegitur. Dissecta deinde per longum dura meninge, medullam spinalem cingente, humorem haec, ultra quam solet, aquosum, ac a sanguine leviter tinctum, continebat. Arteria spinalis posterior turgida et quasi injecta comparebat. Ablata superiore calvariae portione, sanguinis quidquam congrumati portio intra duram matrem et ossa cranii, praesertim in parte posteriore, reperta fuit. Dissectis cerebri meningibus, vasa corticalis substantiae venosa dextri hemisphaerii, turgida fuerunt, alia minora, quasi injecta. Eadem et sinistrum ad hemisphaerium. Cerebrum ipsum ubique sanguine infarctum erat, anatomici manus tingente. Vasa venosa plexus choroidei ventriculi dextri, quasi nigra, ita et in sinistro, reperta fuerunt. Cerebellum quoque a sanguine summopere fuit tinctum (1).

(1) Adstitit aegro morbumque brevem descripsit, *Franciscus Maria Fortina*, Med. Candidatus.

PERIPNEUMONIA SENUM.

Modo satis firma sit febris, quae peripneumonias, non parum certe diversa, comitatur, diagnosis; ubi indolem illa eurgicam seu *hypersthenicam*, agnoscit; nec aetas, nec sexus, nec uteri aut gravidæ, aut puerperalis conditio, quo minus sanguis, pro varia morbi dominantis indole, ac pro aegri natura diversa, manu nunc moderata, nunc fere profusa, prout in *Epitomes* L. II. §. 198. cum aliis docuimus, impediunt. Quod autem eundem ad locum p. 161. in hujus praecepti confirmationem, *senis* fere *octogenarii* exemplum leviter tetigimus, hoc nostris ex diariis depromptum, hic fideliter exponimus; et alterum mox viri *septuagenarii* morbum huic similem subjungimus.

PERIPNEUMONIA VIRI OCTOGENarii.

Petrus Antonius Galbarini, rusticus alias, nunc urbis *Papiensis* incola, aetatis annum fere octogesimum attingens, constitutionem a natura robustam obtinuit. Scindendis trabibus occupatus, solo indusio obtectus, saeviente adeo hieme, ad profusum usque sudorem laborare assuetus quinquies pleuritidem, modo in dextero, modo in sinistro thoracis latere, contraxit, morbum tamen semper devicit; et si levior erat, absque medicis auxiliis, cum solo decocto panis vinoso, et excitatu posthinc sudore, profliga-

vit. Cum tamen de novo sudoribus difflueret, *die 25^a* mensis februarii 1787 refrigerio expositus, a dolore versus costas spurias dextri thoracis, cum frigore maximo, per diem integrum extenso, inde vero a tussi, et dyspnoea, correptus fuit. Ad vinosum iterum panis decoctum, sed infausto sub omine, confugit, ac morbum potius adauxit. Tertia igitur hujus die, chirurgi consilio, venam solvit, et quarta etiam die sanguinem sibi detrahi curat. Cum tamen morbus aequo tenore proserperet, septima hujus die, 3^a nempe martii, nosocomium *Ticinense* adivit. Hic binis vicibus venae-sectio repetitur. *Die 4^a* circa vespertas aeger ad Institutum clinicum deducitur. Dolor punctorius dextro thoracis in latere, sub costis ultimis urgebat, a tussi ac profunda inspiratione auctus; respiratio difficilis; sputa, striis sanguinis remista, aegre prodibant, pulsus frequentes, magni, pleni ac duri, lingua arida, sitis magna, oris amarus aderant. Haerebant adstantes, ne morbus, tam provecta aetate, debilitantem sibi methodum exigeret; decem interim cruoris unciae detractae fuerunt. Decotum hordei cum nitro et oxymelle pro potu porrectum fuit.

Die 5^a Sanguis heri ad vespertas emissus, non, quod a primis venaesectionibus contigerat, a corio obtectus fuit. Noctem aeger insomnem transegerat alvum quinques liquidam excrevit. Coetera symptomata, ut heri, continuant. Cruoris iterum

detrahuntur decem unciae, mox a corio obtegendae. Vespere, dolor auctus, bis alvus mota fuit; a potu ingesto anxietas, ventris tensio, subnascitur. His, et pulsum conditione ita jubentibus, libra sanguinis extrahitur, fots ex lacte ac sapone, dolenti loco imponitur; et enema emolliens injicitur.

Die 6^a In densam et concavam insulam sanguis heri emissus contractus, dolor acerbior, pulsus plenus ac durus est. Venae-sectio ad uncias decem repetitur; vesicans emplastrum costis dolentibus imponitur. Ad vespervas, eadem premunt symptomata, respiratio difficillima est; pulsus pleni ac duri, subinde intermittunt. Sex unciae sanguinis jubentur detrahi.

Die 7^a Nox fuit insomnis. Dolor, nisi sub tussi, ad latus conticuit; respiratio vero difficilis est, oppressionis et constrictionis in abdomine sensus accusatur; alvus semel, sed parce, fuit deposita, tussis frequens, sputa parca et flava, sicca, urina rubra, sapor oris amarus, pulsus pleni, fortes. Vena aperitur denuo ad novem uncias. Cremor tartari solubilis cum pulpa tamarindorum in aqua solutus propinatus; enema injicitur.

Ad vespervas, eadem occurrunt; sed dolor pungens locum mutavit, et ad cordis scrobiculum migravit. Sub tussi, cultri quasi ictum, ad umbilicum usque adacti, aeger accusat. Alvum bis, copiosam, deposuit, ac ventris tensio minor est. Fau-

ces tam aridae sunt, ut difficulter potum transmittant. Emulsio arabica, fomenta, inunctio ventris cum linimento volatili camphorato, imperantur.

Die 8^a Dolor in latus pristinum reversus, pulsus adhuc plenus, durus, respiratio difficilis est, deglutitio facilior. Venaesectio ad uncias novem instituitur; serum lactis pro potu conceditur.

Vespere, pulsus adhuc pleni, sed nec duri nec vibrantes sunt; respiratio, tussis, faciliores sunt; sputa pauca, minus flava. Vomitus spontaneus insecutus est. Dolor cessavit. Alvum aeger copiosam semel et liquidam deposuit. Sudor nullus.

Die 9^a Dolor ad costas rediit, tussis aucta est; sputa ex flavo sanguinea, magis densa, respiratio ardua, pulsus molles. Solutio mannae, pulpaе cassiae, ac salis medii gradatim porrigitur; vesicans emplastrum dolenti lateri imponitur.

Febris ac tussis ad vespervas imminutae, sputa magis cocta sunt.

Die 10^a Omnia in melius conversa sunt; quater alvus soluta fuit, urina turbida sedimentum offert lateritium, febris minor, ac minor spirandi difficultas est. Haustus salinus cum nitro, et cum grano tartari emetici praescribitur. Nec ad vespervas exacerbatio contingit.

Die 11^a Nox inquieta, tussis continua, sicca fuit, dolor in latere dextro se manifestat, absque sedimento sunt urinae; pulsus pleni, fortes, minus tamen frequentes

sunt, respiratio non admodum difficilis. Sanguis interim ad decem uncias mitti jubetur. Cum vero singula ad vespervas symptomata eodem pede incederent, sanguinis sex adhuc detrahuntur unciae.

Die 12^a Eadem rerum est positio; pulsus tamen contracti, sputa pauca, tenacia sunt. Kermetis mineralis granum dimidium cum saccharo, quovis bihorio, cum decocto emolliente sumendum praescribitur. Enema injicitur, fomenta apponuntur. Vespere, dolor imminutus, sputa tenaciora, sed facilia sunt; cutis madescit.

Die 13^a Nox quieta fuit, sputa pauca, sed facilia, cocta, sudor universalis prorumpit, dolor cessat, respiratio liberius absolvitur; ciborum quoddam desiderium se prodit.

Die 14^a Res optime incedunt, urina sedimentosa, alvus laxata est. Sub lachrymis vinum petit senex, et cum pulsus molliores, febris imminuta sint quatuor ejusdem unciae conceduntur.

Cum *die 15^a* aequali se modo habuisset aeger; *die 16^a* nox insomnis successit; coetera interim symptomata spem sustinent. Sic iterum *18^a* nox, ob tussim continuam et siccam, inquieta fuit. Decoctum hordei cum vino antimoniato, Kermeti substituitur.

Die 19^a Sudor multus, universalis, tussis minor, sputa liberius secedunt. Febris nulla est. *Die 22*, ob tussim siccam, ad vespervas haustus narcoticus porrigitur. Ab hac die

tandem et tussis sensim imminuitur, atque die 27, ad suos redeundi veniam petit, eaque obtenta, solo baculo suffultus, viri instar quinquagenarii domum petit. Post mensem, nil nisi vini potum sibi domi deesse, subridens conqueritur, viribusque pro sua aetate sat firmis instructus fuit (1).

PERIPNEUMONIA VIRI SEPTUAGENarii.

Antonius Locati, agricola septuagenarius, robusto corpore donatus, refrigerationibus saepe expositus, jam ter, ante biennium, acute decubuit, semperque venaesectionum ope sanitatem recuperavit. Ante decem dies, sub rudiore labore exaestuans, frigido se aeri exposuit, ac ea ipsa nocte a dolore faucium, tussi molesta, et screatu hinc inde sanguineo correptus fuit. A febre necdum prehensus, nullum artis auxilium adhibuit; donec die 2^a aprilis 1793, ad vespervas, rigorem circa dorsum persentiret. Huic successit calor, quo, cum illo alternante, laboribus consuetis aeger adhuc interfuit. Crescit vero ad noctem febris, quam frigus insigne praecedat. Post istud, calor magnus, tussis, sudor, ac dolor ad partem thoracis sinistram sub mamma accedunt. Sibi ipsi tamen adhuc morbus committitur, donec die 5^a aprilis *Ticinense* nosocomium aeger peteret. Hic vena tunditur illico. Ad

(1) Curam aegri gessit, ac historiam exaravit Med. Candidatus de Zucchi.

clanicum vero Institutum, *die 6^a* delatus sequentia nobis exhibet symptomata.

Calorem magnum, faciem rubram, sudore madidam, dolorem faucium sensibilem absque phlogosi ad illas conspicua, linguam aridam, respirationem difficilem cum dolore ad pectus indicato, sub tussi ac profunda inspiratione adauctum. Tussis interim satis moderata, sat facilis etiam utroque in latere decubitus est. Alvus a quatuor jam diebus obstructa, abdomen interim molle, pulsus frequentes pleni, ac duri sunt.

Cruoris unciae decem mittuntur, decocum althaeae cum nitro, fomentationes emollientes ad locum dolentem, ac enema praescribuntur.

Die 7^a Nox fere insomnis transacta, dolor lateris adhuc viget, tussis aucta, respiratio difficilis, sputa pauca, alvus non mota, pulsus pleni ac duri sunt. Libra sanguinis educitur, linctus, ob fauces adhuc amentes, et clyster praescribuntur. Ad vespertas febris exacerbat, respiratio magis oppressa, facies rubra, eadem ac mane pulsum conditio; dolor nullus ad costas. Nova venaesectio ad libram instituitur.

Die 8^a Aliquantisper quievit aeger; ast dolor novus, etsi levis, sub mamma insurrexit; respiratio difficilis, tussis aspera est. Cruoris unciae decem funduntur. Ad vespertas nova exacerbatio fit, pulsus adhuc pleni, minus tamen frequentes sunt, alvus adhuc clausa est. Sanguis de novo mittitur, et clyster injicitur.

Die 9^a Nocte melius quievit aeger, respiratio nunc longe facilior, tussis levior, nullus vere dolor est. Alvus necdum respondit. Potio laxans ex tamarindis et cremore tartari cum sero lactis propinatur, et enema injicitur. Vespere, alvus quinquies mota fuit. Respiratio facilior, et pulsus naturali parum frequentior est. Emulsio arabica praescribitur.

Die 10^a Ob alvum frequentius deponendam, parum aeger quievit, in cæteris tamen bene se habuit. Emulsio arabica cum haustu narcotico praescribitur.

Ab hoc tempore salus integra restituta, et *die 15^a* senex ad suos dimissus fuit (1).

BRONCHITIS LETHALIS.

Antonia Maria Gatti, Papiensis, annorum 25, unius prolis mater, cum altera nunc, a quatuor fere mensibus, gravida, semper sana, et optime menstruata, *die 12^a* mensis decembris 1792, media fere nocte, a frigore intenso per quadrihorium correpta, hoc absoluto, calorem, magnum, levem sudorem, debilitatem, cum doloribus crurum, digitorum, hinc inde divagantibus, percepit. Quin apyrexia successisset, *die 13^a*, hora quinta pomeridiana, frigus, per duas horas extensum, dein calor et sudor, cum iisde doloribus succedunt. *Die*

(1) Curam praestitit, ac morbum descripsit
Josephus Fiocchi, Med. Doctor.

91

14^a eadem symptomata, eodem sub ordine, comparent. *Die* 15^a, his ipsis junguntur tussis, femoris dextri torpor, movendi impotentia et insensibilitas, per viginti quatuor horas extensa, haec interim cruris paresis tunc sponte disparuit. *Die* 16^a, febre nec quidquam cedente, post meridiem, adauctis articulorum doloribus, tussis acerrima successit, sub qua dolor ad fauces, deglutitionem fere supprimens, et ad sternum, tussim liberam intercipiens, insurrexit. Continuant haec symptomata *die* 17^a; qua demum, in clinicum *Ticinense* Institutum suscepta mulier, sequentem nobis statum exposuit.

Dolor capitis gravativus, oculi fulgentes, genae rubentes, aurium susurrus, os amarum, lingua muco albo oblecta, respiratio difficillima primum in conspectum veniebant. Dolor ad fauces, deglutitionem, — alter, ad sternum, tussim impediabant. Haec vero ultima fuit sicca, decubitus in latus dextrum difficilis, dolores ad dorsum, suras, brachia, debilitas magna, sudor universalis, pulsus frequentes, pleni, sed non tam duri erant.

Porriguntur emulsio arabica, et decoctum hordei cum nitro et oxymelle.

Die 8^a Somnus nullus, ob tussim continuam, accessit. Magna fuit doloris, sub ista, ad pectus, ad artus, exacerbatio. Pulsus hodie pleni et vibrantes sunt. Alvum aegra bis deposuit. Fit venaesectio ad de-

cem sanguinis uncias, atque haec, easdem ob rationes, ad vespervas repetitur.

Die 19^a mane. Somnus nullus, febris ad mediam noctem aucta fuit. Tussis continua, dolor ad pectus sine remissione, urgebant. Ad uteri regionem dolor comparet. Debilitas manifestior fit; pulsus non pleni, duri tamen et frequentes, facies pallet, alvus semel deponitur. Decoctum corticis cum quindecim guttis laudani, cum linctu praescribitur. Vespere exacerbatio accedit notabilis; per duas vices foetus motum se cum dolore percepisse, monet gravida, dolor ad uterum huc illuc intercurrentes, accusatur. Stillicidium narium oboritur. Respiratio difficillima, sputa nulla, facies iterum rubra, pulsus nunc pleni et duri, nunc collapsi comparent. Haustus salinus unciae septem, pulveris Doveri ac moschi orientalis anagrina quindecim, ut omni bihorio uncia una propinetur, et linctus, praeterea vini albi sex unciae porriguntur.

Die 20^a Optime, ac fere absque tussi, quievit aegra; horis interim matutinis, dolor ad sinistram thoracem, scapulae sese communicans, accessit; bilem aegra vomuit; pulsus haud frequentes sunt; pejor tamen rerum status ex aspectu mulieris comparet. Haustus salinus cum moscho et liquore anodyno minerali, nec non vini albi portio, porriguntur.

Ad vespervas, frequentia pulsuum quidquam major. Dolor thoracis a superiore parte, ad costas spurias sinistras transfer-

tur; tussi pauca, sed cum dolore aucto. Quinques aegra vomuit. Debilitas, aurium susurrus accusantur. Motus foetus binis vicibus perceptus fuit. Fomenta ad locum dolentem, et clyster ponuntur.

Die 21^a Nox inquieta fuit. Dolor versus dorsum, sensibilior, transmigrat. Tussis pauca est; sed sub illa, prae doloris vehementia, jactatur aegra. Respirationis tamen difficultas cessavit. Bis vomitus, semel alvus, mota sunt; pulsum frequentia sanae similis, sed magna debilitas est. Lini-
mentum volatile dolenti loco inungitur, emulsio arabica, et vini pauxillum propinquantur. Ad vespervas, dolor ab applicitis fomentis, valde imminutus, sitis tamen multa tussis vero pauca est. Respiratio facilis, vox tamen rauca. Nulla in pulsu frequentia, aurium susurrus disparuit; debilitas vero persistit.

Die 22^a Somnus nullus, continua tussis fuit. Dolores ad costas, ad uterum disparuerant. Sitis summa, lingua sicca; debilitas magna. Alvus excreta. Emulsioni arabicae cum moscho, extractum corticis superadditur.

Vespere, dolores penitus disparuerant tam ad costas, quam ad uterum; ad guttur tamen ardorem aegra accusat, tussis continuat, febris augetur; sitis, debilitas persistunt. Motum foetus mulier persensit.

Die 23^a Nox placida fuit, tussitat aegra hinc inde; dolores nulli, sed pulsus parvi et molles sunt, lingua sicca; semel vomuit.

Decoctum corticis cum emulsione arabica praescribitur.

Vespere, omnia assumpta revomuit aegra; dolor ad hypochondrium dextrum fortissimus, cum scapula et brachio correspondens, insurrexit. Lingua sicca. Fomenta cum linimento volatili adplicantur.

Die 24^a mane. Nox minime insomnis fuit; dolor tamen hodie atrox continuat; pulsus vibrantes ac pleni observantur. Cucurbitulae tres scarificatae, loco dolenti admoventur; emulsio arabica praescribitur. Ad vespervas, dolor idem; pulsus tamen haud frequentior, tussis mitior est. Vesicans costis adponitur.

Die 25^a Somnus paucus fuit, dolor persistit; tussis rara, sed fortis, sputa difficilia; pulsus contracti, duri; debilitas. Haustus salinus, cum pulvere Doveri et moscho, pro medicina est. Vespere, dolor continuat, respiratio anhelosa est, pulsus contractissimi, constanter duri sunt. Emulsio arabica, cum haustu narcotico et moscho, praescribitur.

Die 26^a Nox infelix heri successit. Respiratio summe difficilis; erecta sedere cogitur aegra; dolor ad dextrum hypochondrium, attactum adeo recusat; ac dolores cunctam thoracis dextri partem superiorem occupant; tussis acerrima urget; sputa difficilia, viscosa sunt; pulsus duri, contracti. Continuatur in moscho. Linimento volatili laudanum liquidum superadditur.

Vespere dolor fortissimus continuat, respi-

ratio eadem , jactatio , tussis , facies rubra , pulsus duri et pleni sunt. Vena tunditur ad uncias sex cruoris.

Die 27^a Somnus nullus , jactationes corporis continuae , tussis molestissima , sputa multa , viscosa ; dolor idem ad hypochondrium. Ad ventrem hinc inde dolores insurgunt vehementissimi. Os uteri exploratum , pollicis diametro hiat. Adplicantur cucurbitulae scarificatae octo , et vesicans loco dolenti admoventur. Mannae unciae duae in emulsione arabica solutae , divisas portionibus ingeruntur.

Vespere , dolor idem , respiratio anhelosa , tussis aspera , sputa viscida , vomuit aegra , alvum semel deposuit ; pulsus duri et pleni. Sanguinis unciae octo detrahuntur. Emulsio arabica praescribitur.

Die 28^a Nox fuit inquietissima , tussis fortissima , sputa multa ; suffocationis sensum sub tussi aegra persensit. Dolor lateris idem , ad scrobiculum cordis novus insurgit. Flavescent oculi , sitis summa , jactatio continua ; pulsus duri , contracti. Vespere , jactationes multae , dolor atrox , dyspnoea summa. Alvum deposuit.

Die 29^a Dolores ventris ante noctem hesternam fortius urgebant ; foetus excluditur mortuus. Abhinc dolores ad ventrem cessant , ad costas imminuti sunt. Respiratio ac tussis quidquam faciliores. De debilitate conqueritur ; quidquam vini conceditur.

Vespere , mulier pejus se habet : dolores ad ventrem fortiores redeunt , ad hypochon-

drium exacerbantur. Respiratio difficillima est; jactatur mulier, tussis dolorque fortiter; alvum ter deposuit. Lochia parcissima fluunt. Emulsio arabica, cum hanstu narcotico, porrigitur.

Die 30^a mane. Eadem urgent symptomata. Post meridiem, dolores jactationesque quam maxime augentur, deglutitio supprimitur, tussis, ob constrictionis ad guttur sensum, praepeditur. Tandem soporosa decumbit, nec ullum doloris signum exerit, extrema frigent, ore aperto aerem hiat, pulsus frequentissimi, filiformes sunt. Camphora porrigitur.

Hora septima matutina, dolores iterum violenti ad ventrem urgent et ad hypochondrium, huc illuc jactatur misera; nec deglutire nec tussitare valet. Hora quinta matutina sequente expirat.

SECTIO CADAVERIS.

Aperto thorace dextro, aer cum impetu ex illo exploditur; mox aquae foetentis, ex bruneo luteae quantitas partim effluxit, partim hoc thoracis in cavo detecta fuit, quindecim libris vix minor. Pulmo compressus, parvus; rugosus flaccidus, hinc inde ruber, alibi pallidus, comparuit. Ad lobum superiorem, tria, pisi magnitudinis, foraminula deteguntur, quorum viciniis compressis, humorem illa puriformem ac rubrum plorabant. Pollicis profunditatem haec foramina habebant. Pleura, exceptis punctis rubris,

hinc illinc, ad posteriora et inferiora distinguendis, sana videbatur. Aperto thorace sinistro, aquae hic tres librae circiter, magis rubrae, stagnabant. Pulmo quoque sinister collapsus erat, nec ullum inflammationis vestigium exhibuit. Pleura non minus intacta fuit. Bronchia, et aspera arteria, in longum dissecta, colore rubro undique nitebant et coccineo. Quo profundius vero culter descendit, eo major hic rubor in bronchiis comparuit. Pulmo interim nec tumidus nec ponderosus fuit.

Inciso pericardio, ejusdem indolis aquae, quam ex thorace, ad pondus unciarum septem circiter, eductae fuerunt. Nec ullum, tam ad cordis superficiem, aut subsantiam, quam ad pericardium, inflammationis signum compertum fuit.

Secto abdomine, hepar magnum, ad quartam usque costam assurgebat, minime morbosum. Vesicula fellea bile non tenaci, sed aquosa, repleta erat. Omentum retractum, hepaticae superincumbens, copiosa pinguedo ad mesenterium fuit.

Utero inciso, universa ipsius interna superficies atro et corrupto cruore replebatur. Vasa hujus visceris valde dilatata comparebant. Vesica urinaria contracta et vacua. Intestina sana, si saccum, quem colon sinistrum majorem efformabat, sed vacuum, excipias (1).

(1) Curam aegri gessit et morbum conscripsit
Med. Candidatus *Ripamonti*.

Morbi pectoris acuti, ubique certe discrimine pleni, in gravidis tamen mulieribus in genere longe magis ominosi sunt. Sub primis scilicet impraegnationis mensibus, promptior sub illis morbis *abortus* imminet; aliquando quidem, ubi hypersthenicum latuerit in thorace incendium, salutaris mulieri; in casu vero contrario, sub jactura sanguinis majore, plerumque et foetui, et matri lethalis. Dum uterum sub ultimis impraegnationis mensibus profundiorē diaphragmatis descensum non parum impediat, et musculi abdominales jam nimis extensi sint, praeter *partus praematuri* pericula, viscera thoracis et a morbo vexata, et arctiore simul spatio coarctata, compressa; respirationis officio inepta, hanc citius et in foetus, et in matris perniciem suspendunt. Utroque vero in casu, consensus uteri, pectoris lacerati symptomata exasperat; haec autem viscus proliferum ipsumque foetum, ad motus perversos sollicitant et rapiunt. Haec gravidarum, a peripneumonia prehensarum, summa discrimina, nec juvenili quidem in aetate, nos, prognostici *hippocratici* jam tunc non ignaros, latebant, cum anno 1766 praegnantem in septimum mensem mulierem *Bitensem* a gravi pulmonum incendio correptam, pertractandam haberemus. Atque tamen, in casu pro fama junioris medici tam ambiguo, mulieri robustae ac nullis hucusque morbis vexatae, sanguinem, quasi

gravidā non esset , sub magnis vetularum recalcitrationibus , novies detraximus , ac matrem non minus , quam foetum , praescripto tandem termino exclusum , feliciter salvavimus. Haud raro interim medica juvenus , *somnambulis* similis , in praecipiti , mediis sub periculis , sibi haud satis perspectis , tuta , nec vertiginosa versatur ; expergefata vero , trabem angustam , qua pede certo incesserat , et audaciam miratur , et terrore perculsa horrescit. Saepe tamen alia , quam praeceps , via medentibus non patet ; nec tam nobis , quam aliis , ejusdem cum gravidis , pulmone inflammatis , feliciter tentatae exempla desunt. Cur aegra , cujus hic commentamur historiam , meliore hac sorte non gavisā sit ; tum gravioris et vagae arthritidis , per sex primos morbi dies , neglectus , tum , argumento plus quam probabili , anterior illo pulmonis *dextri* labes occulta , nobis explicant. Etsi nempe hanc mulierem constante antehac sanitate instructam fuisse , ex propria ejus relatione , perceperimus ; tria tamen illa *foramina* , in lobum pulmonis dextri superiorem , vel *minime inflammatum* , profunde exporrecta , quasi fistulosa , atque , vicinis sibi partibus compressis , humorem purulentum ac rubrum fundentia , — aer , foetore impraegnatus , thoracis huic cavo coercitus , ac eodem vix inciso , cum impetu explosus , de praegressis hujus lobi pulmonalis abscessibus antiquis , ut videtur , tuberculosis , abunde testantur. Quamvis etiam pneumoniae frequentius ma-

gno hominem cum frigore adoriri consue-
 cant; vix tamen unquam hic rigor quatuor
 per dies, quod nostra in muliere contigit,
 ut in febre periodica, tam intense revertitur;
 nec morbus, dum ista successerunt, aliam,
 quam arthritidis acutae ac vagae, minime
 vero adfectionis thoracicae, scenam lusit;
 donec quinta modo, vesperscente jam die,
 post praeviam paralysis nycthemerae in crure
 dextro, non minus arthriticae, solutionem,
 tussis, mox acerrima, cum dolore ac incen-
 dio ad guttur et ad sternum, accesserit.
 Tunc vero, et qua die aegra curae nostrae
 commissa fuit, singula certe morbi gravis-
 simi symptomata, maxime vero pulsum
 plenorum atque duriorum ratio, de indole
 illius energica testata sunt. Cum tamen
 sanguine, moderata licet manu, binis modo
 vicibus emisso, vires magis conciderent,
 aegra facie palleret, ac dolores quasi ad
 partum accederent: fatemur, nos de pro-
 prio forsitan in diagnosi, quoad febris indo-
 lem hypersthenicam, vel de tarda nimis san-
 guinem mittendi occasione, eo magis cogi-
 tasse: quod non rarum esse noverimus, fe-
 bres etiam *nervosas*, visceris sensibilis inflam-
 mationi conjunctas, sub morbi principio, ple-
 nitudinem vasorum, eorumque duritiem
 mentiri; atque haec fuit ratio, cur, deposi-
 to mox debilitantium auxilio, ad corticem,
 — et cum frequens spasmodorum apud gravi-
 das abortum contribuentium, occasio sit,
 exiguum ad opii dosin, confugerimus, ac re-
 vera, sub istis, ac demum sub blando sti-

mulo volatili, die morbi *decima*, tussis pauca
 fuit, ac respirationis difficultas, pulsuum
 frequentia, et aurium susurrus cessarunt.
 Nec tamen prognosin idcirco feliciorē, ex
 eo, quod nec sudor universalis, nec urinae
 sedimentosae, nec sputa cocta hucusque se
 proderent, quod dolor minime sileret, sitis
 vero continuo urgeret, instituimus. Quam-
 vis etiam, quidquam tardius, et dolor late-
 ris, et uteri cruciatus evanescerent, nox-
 que placida succederet, non tamen quietos
 nos esse, constans linguae ariditas, cum ae-
 grae habitu externo, sinivit. Morbi dies
 decima tertia nimis hos timores confirmavit,
 ac decima denique et quinta die, ad vespe-
 ras pulsus pleni atque duri, orthopnoea, do-
 lor thoracis attactum fugiens, tussis atrocis-
 sima, ad novam sanguinis missionem nolen-
 tes nos coegerunt. Novam scilicet tunc, et
 quidem utriusque pulmonis, diram inflam-
 mationem subintrasse vix nobis dubium su-
 perfuit. Paucorum autem tunc signorum
 defectu, a vero aberravimus. Haud raro
 nempe, in aegris aliis, dum sub media pneu-
 moniae, et quidem conspicua remissione, in-
 opinata pectoris oppressio, summa respira-
 tionis difficultas, anxietas, ac decumbendi
 impossibilitas contigerent, sectionum patho-
 logicarum auctoritati suffultis, vel ex brachii
 unius torpore, vel ex manus unius (rarius ex
 latissimi dorsi) oedemate, maxime vero ex
 pulsu ad unum carpum *intermissione*, ad
hydropem thoracis, eodem in latere, *acutum*
 conclusimus, atque in undecim certe pneu-

moniis sic lethalibus, haec morbosa phenomena nec semel nobis fucum fecerunt, sic ut nobis, sub primo eorundem occurso, hucusque semper deleterio, *thoracis* adfecti *paracenthesin*, quae *Senacii* venatorem regium fortuito salvaverat, ut unicum, quod spem sanationis aliquam concederet, subsidium, instituendam, proposuerimus. Sed nostra in aegra haec nos signa diagnostica deseruerant, ac nova pulsum plenitudo, vibratio, ut ad novum potius in pulmone incendium, quam ad hydrothoracem acutum et subitaneum, oculos ferremus, induxerant.

Atqui dum sectio pathologica nobis, praesente in casu, utriusque thoracis hydropem, majorem ac unquam hucusque vidissemus (vidimus autem frequenter in aliis, ad novem, vel adeo ad duodecim libras aquae in uno etiam thoracis cavo collectas) praesentaverit; ex altera parte, eadem haec sectio, *tracheam* modo et *bronchia singula*, *minime vero pulmonum parenchyma*, *inflammat* fuisse, spectaculo nobis antehac, post signa pneumoniae tam evidentia, nunquam oblato, nos docuit. Nullum scilicet nos, nec ad hanc usque diem nec serius pulmonum incendium, absque bronchiorum simul inflammatione plus minus conspicua, perspeximus; quotiescunque vero, a morte, *bronchitidem* fortio-rem, — toties etiam parenchymatis pulmonalis molem, duritiem, pondus, adaucta, et puriformis in eodem materiae collectionem reperimus. Cum vero, hoc in casu, dolor simul ad latera thoracis tam atrox, ut

omnem attactum recusaret, sine quavis ad *pleuram* inflammatione, comparuerit; concludimus: nec pleurae costalis, nec pleurae pulmonalis, seu externae hujus visceris tunicae, inflammationem, ut *dolor* punctorius, quem aegri, *pleuritidis* sub nomine, ad costas referunt, oriatur, requiri; sed solius membranae bronchiorum internae incendium hos ad dolores provocandos, jam sufficere. Ac revera, inter centena cadavera, post sublatos ejusmodi dolores punctorios, aperta, pleurae costalis inflammationem vix septies, — nunquam vero hoc solo casu excepto, absque illa parenchymatis pulmonalis, reperimus; ac pleuram adeo intense rubram et turgescens, quin dolor ad illam accusatus fuisset, vel dum alium thoracis ad locum eundem aegri retulissent, conspeximus. Cum vero pulmonem aegrae nostrae dextrum tribus in locis perforatum videremus, nata nobis est suspicio ideo illius parenchyma sub medio ac forti bronchiorum incendio subsedisse, quod humor puriformis, alias a parenchymate pulmonis susceptus ac fatus, per hos abscessulos in thoracis cavum effluisset, ac tumorem hujus visceris spongiosi praevenisset; ast vero pulmonis sinistri integerrimi bronchia non minorem inflammationem, nec tamen ullum tumorem, conceperant; et aquae in ejus cavo minorem copia collectae, colorem adeo magis rubrum, quam in dextro thoracis cavo, in quod abscessuli patebant, contraxerant. Quod vero hujus cavi thoracici dextri, tanta copia

aquarum inundati, angustias augere debuit, *hepar magnum*, et ad costam usque, ex veris quartam protensum, fuit; atque summa ejusdem cavi extensio, certe non parum ad majores in dextro thorace cruciatus contulisse videtur. Pericardii ab aquis subitanea repletio, doloris sensum ad cordis scrobiculum, ab aegra accusatum, satis explicat. Vomitus aegrae, sicut in pneumoniis non tam rarus et consensualis esse solet: ita uteri quoque, tam gravidi, quam ad abortum excitati, effectus esse potuit. Hoc unum his addimus: sputa, hoc in morbo rejecta, quod in pneumoniis solet, nunquam a cruore fuisse tincta. Hoc interim signum *bronchitidem a pulmonum inflammatione* eo minus distinguere factum est, quod in fortissimo pulmonum incendio sputa nimis saepe nulla, aut etiam sanguini non commista; secedant.

ENCEPHALITIS.

Die 23^a mensis decembris 1785 cadaver juvenis torosi in nosocomio *Ticinensi* adperuimus, qui dicebatur jam sex per dies apud suos ferociter delirasse. Deferebatur ille hoc sub statu ad dictum nosodochium. Curam hujus mali habuit dexterrimus hujus instituti medicus, post duos vero dies aeger e vita decessit. Pulsus hoc tempore erat frequens et fortis. Totum corpus, ut aqua ebulliens prae sudore fumabat. Jacebat supinus aeger, respirabat frequenter,

et aerem plenis buccis efflabat, spumabat; non amplius furiebat, neque ad questionem respondebat; jussus tamen linguam exerere, conatus ad id faciebat. De capitis dolore interrogatus, et ad illud compressus, brachium dextrum elevavit, versus calvariam porrexit, erectum ibi tenuit, tandem capiti sat diu admovit, sicut illi faciunt, qui capitis vulnere laborant. Oculi erant ruberrimi, ut vix album illorum cerneretur, torvi simul; facies accensa.

SECTIO CADAVERIS.

Cadaver, quod nostros in usus convertere volumus, juvenes inexperti cum serra, calvariae admota, tam incaute tractare inceperant, ut duram matrem circa occiput, ipsumque cerebellum, quibus scilicet e locis multus aterque sanguis utrimque effluerat, laeserint. Calvariae parte, jam divisa, a nobis detracta, dura mater, quamvis ejus vasa hinc inde turgerent, non erat inflammata. Utrumque cerebri hemisphaerium quamplurimum rubebat; vasa venosa valde turgebant, atque arteriolas ubique comites habebant quasi injectas, alibi sectionum visui obiectas. Sinus longitudinalis, sanguine crasso et nigro adhuc valde plenus, non tamen coacto. Cerebrum solito firmitus, ut cultro magis resisteret. In substantia medullari, plura puncta, quam in aliis, comparebant, et ubi comprimebatur cerebrum, sanguis transudabat. Ubicunque

per substantiae corticalis anfractus pia mater descendebat; ibi vasa plura infarcta sanguinem fundebant magis. In ventriculo cerebri laterali dextro, uncia una circiter aquae haerebat. Corpora striata vasis depicta erant, et eodem se modo thalami nervorum opticorum habebant. Cerebellum ubique vasis rubris, minimis, ornatum, quasi roseum. Ad internam substantiam, eodem modo, ac cerebrum, firmitus, puncta rubra quamplurima offerens. In basi calvariae aquae unciae circiter tres haerebant.

Historia morbi et sectionis quam hic exposuimus, est illa, de qua in *Epitomes* L. II. §. 140 p. 46 breviter diximus: » nos (in encephalitide) conspexisse sudorem copiosum, ac vaporem quasi ab ebullientibus aquis e corpore toto elevari; et caput, cum ad unum bregma intensius doluisset, ad oppositum corporis latus paralysin induxisse. » De causa hujus morbi, ejusque primo incessu, nihil rescivimus.

ENCEPHALITIS PER ERYSIPELAS FACIEI JUDICATA.

Dominica Masseroni, quindecim annorum famula, catameniis necdum subjecta, sat irritabili fibra dotata, si febrem, ante annum sponte sanatam excipias, semper sana, postquam ante tres circiter menses per nionibus ad manus vexata fuisset; die 3^a mensis februarii 1792; cum vini generosi duo pocula, talibus non adsueta, ingurgi-

tasset, dein reclinato capite aranea texta verrisset, a tam vehemente capitis dolore correpta fuit, ut lectuli petendi necessitas subintraverit. Post paucas horas, hunc dolorem secutus est calor magnus, febrilis, cum vomitu materiae amarae ac viridis frequente. Cum haec symptomata indies maxime circa vespervas, augerentur, die sexta februarii, tertia morbi, ad clinicum *Ticinense* Institutum aegra delata fuit, ubi sequentia notanda obvenerunt.

Notabilis virium prostratio, cutis sicca, calor, dolor per omne caput expansus, internus, continuus, acutus, pulsatorius, dentium nervos in consensum trahens, et somnum quemcunque avertens. Facies erat tumiduscula, sitis inexplebilis, tussis hinc inde cum aliquo exscreatu, respiratio tamen sat facilis; os amarum, lingua muco albidobducta, ructus, nausea, vomitus materiae amarae viridescens, abdomen molle, alvus quotidie aperta; pulsus pleni, duri, tam frequentes, ut minuto primo, centum triginta quatuor ictus formarent.

Decoctum hordei cum nitro et oxymelle pro potu, venaesectio ad uncias decem, cataplasma frigidum ex panis mica, aceto, sale ammoniaco, capiti adplicandum, et clyster emolliens praescribuntur. Noctem aegra transegit insomnem; vomitus sexies circiter ejusdem materiae successit.

Die 7^a Eductus heri sanguis corio obtectus est. Arteriarum ictus ad centum et triginta per minutum primum ascendunt, ple-

ni, duri, ac minus ordinate micantes. Tendinum subsultus hinc inde occurrit. Alvus occlusa.

Praescribuntur pulpaë tamarindorum, et mannae ââ uncia una, Cremoris tartari solubilis uncia dimidia, in sero lactis solutae, ac enema emolliens. Venaesectio altera ad uncias novem instituitur.

Ad vespervas, aegrae aspectus quidquam melior, sanguis nullo corio obductus, sed ponderosus est. Tendinum subsultus iidem ut mane. Ortus est dolor, tactum non perferens, ad utramque parotidum regionem, in quarum sinistra, glandula lymphatica intumuit. Vomitus aliquoties redivit. Faeces quater copiose egestae. Porrigitur ad noctem emulsio arabica cum duabus nitri drachmis. Hirudines decem temporibus adponuntur. Fomentationes frigidae *Schmuckeri* fronti adplicantur. Parotidum regioni, prius cum linimento volatili inunctae, cataplasma emolliens superimponitur.

Die 8^a Nox insomnis, capitis dolor anteriora praecipue tenet. Summopere dolet parotidum, imprimis sinistrae, regio. Extenditur dolor ad oculos, dentes, et jugulum, quod externe tactum haud perfert; glandulae submaxillares quidquam tumidae, dolens est deglutitio, nec maxillas facile deducere, nec linguam expedite exserere aegra potest. Oris amaror accusatur, vomitus tamen nullus accessit. Alvus ter soluta, abdominis dolores aliqui; tendinum subsultus continuant. Pulsus adhuc pleni, duri,

centum viginti et quatuor ictus minuto primo offerunt. Etsi hucusque deliria nulla se manifestaverint, de latente tamen in calvaria inflammatione dubium nobis non superfluit. Venaesectio igitur ad uncias decem repetitur, et potio laxans alvum praescribitur. Externa quoque continuantur ut heri.

Ad vespervas, doloris sedes dilatatur ad omne caput internum, ad aures, oculos, dentes, a jugulo ad mammarum regionem usque extensa. Has omnes nempe partes, absque ejulatu aegrae tangi non licet. Difficulter os aperitur, semper adhuc amarum; loquendi hinc facultas vix non ablata est. Potum interim et praescripta medicamina aegra assumit. Haec tamen aliquoties cum vomitu rejecit. Abdominis dolor, soluta alvo, disparuit. Tendinum subsultus frequentius redeunt. Sanguis ultimo emissus; corio, etsi densus, destituitur. Tota die de statu proprio querula, soporosa nunc jacet aegra. Pulsus frequentiores sunt matutinis, minus pleni, sed duri. Vesicans nuchae emplastrum imponitur, serum lactis pro potu porrigitur.

Die 9^a Dolor capitis multum imminutus, de aurium vero et juguli dolore aegra adhuc conqueritur; mandibulas ea facilius deducit. Facies hodie tumidior est, vomitus cessavit. Alvus aperta, urinae jumentosae sunt. Pulsuum ictus numerantur centum et sexdecim minuto primo, minus pleni: sed duri; nulli tendinum subsultus occurrunt.

Somnus aliquis, sed terrificis imaginibus intermixtus, accessit.

Omittuntur nunc fomenta frigida; linimentum volatile et cataplasma circa parotides replicantur. Haustus salinus cum nitro ac roob sambuci, pro medicina est; serum lactis pro potu.

Hora quarta vespertina, manifesta accedit exacerbatio: dolor ad caput, pone aures, ad jugulum, intensius urget. Summe dolent oculi, quorum dexter praecipue a tumidiore facie ex toto fere clauditur. Evidenter nunc inflammatio, ab internis, exteriora versus propagatur. Abdomen quantisper tumet ac dolet. Pulsus frequentiores, pleniores sunt; minus tamen constans haec plenitudo sub digitis tangitur. Emulsionem iterum arabicam praescribimus; enema injicitur. Linimentum volatile pone aures et jugulum, cum camphora junctum, inungitur; his partibus vero cataplasma emolliens imponitur.

Die 10^a Tota nocte aegra soporosa jacuit. Dolor internus capitis vix non disparuit. Sed omnem faciem nunc *erysipelas* corripuit, ut quae tumida et livida conspicitur, summopere dolens, imprimis pone aures, dolor ad jugulum extenso. Vomitus non rediit. Pulsus pleni, ac duri, centum et sexdecim ictus minuto primo nobis offerunt.

Venaesectionem ad sex uncias instituimus, pedes balneo tepido immergimus, cataplasma seponitur.

Ad vesperas sopor, qui omnem per diem continuaverat, minor est. Dolor nec in ca-

pite, nec ad jugulum est. Facies tumida, dolens, sublivida, cum vesica ad auriculam parva, quam aperiri curavimus. Pulsus, etsi matutinis frequentiores, minus tamen duri ac pleni. Sanguis emissus, corio obtegatur. Haustus salinus pro medicina est. Facies cum linteo obtegatur.

Die 11^a Aliquantulum aegra dormivit, et a somno levamen habuit. Dolor ad faciem, adhuc tumidam, imminutus est. Pulsationes arteriae centum et quinque numeravimus, parum plenas, non duras. Oris amarities cessat, lingua pura est; alvus aperta. Sedimentum in urinis nullum.

Ad vesperras, res melius incedunt: erysipelaceus faciei tumor quidquam subsedit. Sudor copiosus insequitur, alvusque solvitur.

Die 12^a Per omnem aegra noctem dormivit, sudavit; bis alvum deposuit; cutis ad faciem desquamari incipit; ciborum desiderium subintrat.

Sic sensim sensimque, continuante, levio-
re tamen sudore, desquamatio faciei absolvitur, vires redeunt; et vigesima quarta mensis, aegra sibi suisque restituta fuit (1).

EPICRISIS.

Etsi nulla hac in aegra deliria sese ma-

(1) Historiam hanc egregius tunc juvenis, Josephus Antonius Nicolai, Cremonensis, conscripsit.

nifestaverint; ex causa tamen praegressa, ex febre tam acuta, ex atroci et fixo ad caput internum dolore, ac vomitu, non ex primarum viarum saburris, sed ex ventriculi cum capite consensu inducto, ex statu soporoso, ad internum capitis incendium, quod ad meninges fuisse, hariolati sumus, conclusum fuit. Sub tanto febris in puella necdum menstruata, sed menstruis vicina, impetu, sub pulsu constanter pleno ac duro, tendinum nos subsultus, quo febrem inflammatoriae contrariam vereremur, minime induxit. Cum vero dolor ad parotidem ac circa aures se proderet, prognostici *Hippocratici* (1) non immemores, *erysipelas* faciei praediximus; nec tamen, vel hoc ipso, etsi aliquo cum levamine, comparente, cum febris nimiae symptomata urgere continuarent, donec stimuli moderamen haberetur, ab ultima venaesecutione abstinuimus.

Verum in virgine nostra vel cerebri ipsius, vel potius meningum, *erysipelas*, priusquam hoc *exterius* prodiret, subfuisse, dubitari haud potest. Ne vero, comparente, post signa encephalitidis, in facie *erysipelate*, hoc ipsum aegro sanitatem praedicere credamus, nisi incendii capitis interni symptomata vel plurimum sedentur, aut cessent, prout in *Epitornes* L. III. §. 289. p. 52, occasione hu-

(1) » Rubores circa aurem ex praegresso dolore in febribus orientes, signum quidem sunt *erysipelatis* in facie futuri. « Coac. 200. » *Erysipelas* ab externis partibus intro converti, malum, ab internis vero, extra, bonum. « Aphor. vj. 28. Coac. 103.

jusce exempli , jam monuimus , cavendum est.

Sic vir illustris , ac universitatis *Ticinensis* moderator , tumores sibi ad caput externum folliculosos , contra medici ordinarii opinionem , aperiri curaverat , ac refrigerio expositus , erysipelas ad caput et ad faciem contraxit. Dissipato hoc vitio per annos aliquot illaesa valetudine gavisus est ; sed folliculis ad capitis partem capillatam de novo turgentibus , sectioni eorum se iterum , et mox ab hac , solis verni radiis sub vento satis frigido , caput exposuit. Imminentis sibi morbi sensum , declinante vix die , percipiens , ne caro nimis proetio salutis suae haec incuria veniret , timorem , ante cubitum expressit. Altera jam die , somno apoplectico sepultus miser jacuit. Cum tertia morbi die erysipelas ad faciem prodiisset , spem amicorum erexit medicus aegri ordinarius. *Mediolanum* , in consilium accersiti , clari viri prognosi ex eo , quod erysipelatis ad *exteriora* propagatio , sensus aegri internos nec quidquam sublevasset , adhaerere , eheu , non potuimus. Morte aegri jam alteram in diem subsecuta , praeter tumorem faciei insignem ac lividum , inflammatio duram meningem validissima , cerebro a lymphatica et coacta materia inundato , oppresso , tenuerat.

Sic anno 1787 , vetula in clinicum *Ticinense* Institutum delata fuit , quam , decem ante dies , praecedente anorexia , frigus intensum , tres per horas exporrectum , calor summus , cephalaea atrox , cum narium ob-

structione, prehenderant. Tertia jam morbi die, erysipelas pustulosum ad faciem comparuerat. Die duodecima dolor et erysipelas in crure, absque tumore, se manifestarunt. Sic per septem dies. Tunc pulsus parvi, virium prostratio, facies tumida, foeda, acutissimus cruris dolor. Die decima tertia, dolores ad brachium articulos omnes. Surditas, pulsus inordinati, parvi, dyspnoea. Erysipelas nunc ad brachium, intense inflammatum. Accedunt meteorismus, sopor, stupor, surditas major, debilitas; faeces aegra inscie emittit. Die decima quinta, aphona est, tendines subsiliunt, difficulter respirat, pulsus minimus, crustae faciei sunt nigrae, alvus liquida. Mors die sequente scenam claudit. In cadavere, sub meningibus serum flavum, cerebrum materia lymphatica coacta obtectum, vasa cerebri a cruore quasi injecta. Cerebellum aqua rubella obtegit. Simile serum ad brachii musculos inflammatos in tela cellulosa stagnabat. Hic igitur morbus, malignae febris sub specie incessit; sed in vera *encephalitide*, per erysipelas ad exteriora comparens nec quidquam mitigata, constitit.

Sic mulier, anno 1791 in clinicum Institutum *Ticinense* suscepta, die sexta februarii, ad noctem, dolore forti ad aurem internam correpta fuit. Die septima, tota facies ejusdem, et collum et fauces tumuerunt, cum magno dolore, ad aurem etiam persistente. Nunc febris cum frigore atque calore. Die octava, purulenta multa ex ore

rejecit; dolor auris mitigatus fuit. Facies interim valde tumet sine pustulis. Oris fauciumque phlogosis, collum tumidulum, dyspnoea observantur. Die undecima, deliria, sopor accedunt. Venaesectio instituitur. Die duodecima, deliria continua, disparuit erysipelas; respiratio stertorosa, pulsus inaequales sunt; moritur mulier. Secto cadavere, pulmones inflammati, in aure dextra abscessus ad cellulas mastoideas. Omnia haec in aure, per tubam inflammata, cariota reperta fuerunt. Fauces, aspera arteria, bronchia inflammata. *Symptomaticum* igitur et hic fuit erysipelas, nec eodem in externis comparente, strages minor ad interna fuit. Os temporum hujus foeminae cariosum, museo pathologico *Ticinensi* commisimus.

Sic denique jam a, 1787 mulier erysipelatè faciei correpta, ad idem Institutum clinicum delata fuit. Die 14^a mensis accesserant frigus, calor, cephalaea, membrorum gravitas, febris magna, erysipelas, stupor. Die 18^a ad nos deferitur. *Loqui aegra non potuit.* Die 19^a facies tumida, livens, oculi clausi, dentes nigri, lingua siccissima, aphonia, respiratio frequens, pulsus celerrimus, intermittens, contractus. Floccos capit mulier, stupida est. Vena secta, et vesicans nachae impositum fuit. Die 20, os clausum, contractum, sopor, prostratio virium, subsultus tendinum, pulsus intermittens. Posita fuerunt duo vesicantia; sed eadem die obiit aegra. Sectio cadaveris, serum copiosum ad cerebellum, et circa foramen

occipitale magnum, — cerebellum tamen molle, cerebrum vero durum, ostendit.

CEREBRI ABSCESSUS POST OTITIDEM

Antonius Quaglia, rusticus 40 annorum, quindecim diebus, antequam ad nosodochium *Ticinense* accederet, *dextrae* auris internae inflammatione correptus fuit. Tertia morbi die gravissimo universi capitis dolore prehensus fuit et insigni frigoris sensu, ad caput constanter relato. His igitur quotidie auctis aeger ad nosocomium deferitur, ubi sequentia adnotata fuerunt.

Hemiplegia lateris *sinistri*, quamvis imperfecta, aliqualis enim aderat motus. Certa stupiditas, summa virium dejectio. Cephalaea et frigoris sensatio eadem. Venae-sectio ad venam jugularem instituitur; vesicantia ad nucham, sinapismi ad plantas pedum admoventur. Interius haustus salinus cum grano tartari emetici, tandem vero cum duobus hujus granis, propinatur. Aeger continuo stupidior redditur; facies inter trucem et moestam; pulsus debiles, parvi et tardi redduntur; interrogatus, de dolore capitis, et de sensu illo frigoris conqueritur. Ad corticem peruvianum, serum lactis vinosum, et ad vinum ipsum, sat larga dosi, confugitur. Sensim sensimque musitat, subdelirat; lingua est aridissima; summa virium prostratio, pulsus iidem, manus sinistrae tremores, in manu paralytica nulli. Camphora, serum lactis vinosum praescri-

buntur, sinapismi, vesicantia hinc inde replicantur; sed stupiditas indies augetur, ita tamen, ut mane sui potentior, vespere autem stupidior, quasi comatosus, et aphonus esset. Pulsus semper minimi, non adeo frequentes. Abdomen jam multis a diebus insigniter retractum, et quasi concavum. Iterum ad corticem, cum liquore anodyno minerali *Hoffmanni*, dein ad moschum, valerianam recurritur. Fomentationes quoque frigidae, glacies ipsa, capiti admoventur. Tandem magis magisque aeger collabitur, abdomen semper retractum, brachia spastice inflexa, musculi faciei quoque rigent, venae frontis, dum spastica partium contractio urget, in tumorem elevantur seu turgent, ista vero cessante, subsidere observantur. Cutis, quae semper hucusque frigebat, calidior nunc redditur. Pulsus, ut minimi, jam frequentiores redduntur. Summa corporis est macies. Mors denique his aerumnis succedit.

SECTIO CADAVERIS

Aperta calvaria, dura mater prope aurem lateris dextri, tam firmiter cum subiectis sibi membranis ac cerebri substantia cohaeret, ut nonnisi vi adhibita ab eadem potuerit divelli. Subtus vero, in ejusdem auris directione, substantia cerebri erat durior, et nucleum offerebat ad castaneae magnitudinem; quo transversim dissecto, substantia durior, ex cinereo nigra, in ejus

centro reperta fuit. Canalis exinde ad parvi digiti diametrum, prodibat, qui altero suo fine hunc ad tumorem, — altero in amplam cavitatem, ducebat. Haec cavitas in ipso cerebri hemisphaerio dextro haerebat, et ex medulla laesa, destructa, et penitus consumpta constabat. Pomi mediocris volumen hocce cavum aequabat, atque nec cum cerebri ventriculis, nec cum nervis communionem aiebat. Pulmones rubri, graviores, inflammati fuerunt (1).

ABSCCESSUS CEREBRI, CUM PARALYSI.

Vir 35 annorum, Faber lignarius, robustus, 10^o mensis februarii 1792 ad clinicum Institutum *Ticinense* accessit. Huic, ex causis externis, violentis, nares interdum sanguinem fundebant. Ante quinque circiter menses fortiter ad *dextram* narium partem, cum capitis concussione, percussus fuit: unde magnam cruoris copiam per nares amisit, et exinde tantam in hoc profluvium proclivitatem contraxit, ut vel a levi narium allisione facillime sanguis ex iisdem prorumperet. Tredecim ante dies, hinc post quatuor fere menses cum dimidio, a quibus ultimam narium laesionem expertus erat, nulla data occasione, *stuporem in dextra manu* persensit, qui stupor lente increscens, omnem tandem digitorum mo-

(1) Observationem hanc nobis anno 1796, prima Januarii, communicavit Joannes de Felici M. D.

tum abstulit. Hunc stuporem, brevi *dolor ad sinistram* capitis partem insecutus est. Dum ad nos pervenisset, nulla amplius digitos ad manum dextram movendi aderat potentia; aderat tamen sensus et calor aliquis. Brachium ipsum facile movebatur. *Crus dextrum* interim cum pede, gravitate quadam et stupore, brevi praetereunte, quandoque corripiebatur. Aderat simul quaedam loquelaе difficultas, orisque, sub ista, evidens ad sinistram distorsio. Alvi et urinae facilis excretio, retentio. Capitis dolor continuus, in sinistra imprimis parte, noctu cum aliqua febricula insurgens, facies admodum rubra, oculi splendentes, fulgentes, pulsus pleni, fortes, vibrantes sunt. Sanguinem mox ex jugulari vena sinistra, ad libram, detraximus, ac alvum cum pulpa tamarindorum et cremore tartari evacuavimus.

Die 11^a Mane, dolor ad caput sinistrum insigniter auctus, nulla tamen febris fuit. Cucurbitulas scarificatas occipiti adponimus. Ad vespertas dolor paulo minor, pulsus vix frequentior est. Alvus difficulter, et purganti medicinae, et clysteri respondet.

Die 13^a Dolor quidquam minor, pulsus pleni et fortes sunt. Venaesectio ad libram instituitur. Ad vespertas pulsus paulo frequentior, alvus soluta est.

Die 15^a Formicatio in manu sinistra, dolor oculi sinistri, sub erecta corporis positione evanescens. Parvum vesicans, ut ru-

benefaciens, tempori sinistro adponimus, unde insigne doloris decrementum fuit.

Die 16^a Manum aeger dextram quidquam movit. Ad vespertas dolor oculi auctus, altera die adhuc major, cum lucis impatientia. Octo hirudines tempori sinistro admovemus. Abinde dolor oculi imminuitur, ac lucis aufertur impatientia.

Die 19^a Cephalaea major, pulsus pleni, fortes, rubor faciei major. Hirudines duodecim tempori sinistro, mox vero vesicans imponitur.

Die 20^a Dolor quidquam minor, atque sic nunc major iste, nunc minor fiebat.

Die 23^a Valde hic auctus fuit levi sopore, stupore universali, pulsu pleno, forti, alvo clausa. Os amarum est. Sanguinis iterum unciae decem detrahuntur, et potio laxans praescribitur.

Die 25^a Mane. Pulsus molles, exiguus capitis dolor, alvus soluta.

Die 27^a Melius aeger se habuit; hinc inde tamen pedis dextri contractiones observantur.

Die 28^a Aliquoties in die visus obnubilatur, pulsus tardi, 54 in minuto primo.

Die 29^a Formicatio manus paralyticae, pulsus lenti, motus in illa aliquis hinc inde. Levis interdum vertigo, cephalaea moderata.

Die 2^a mensis martii, nulla; pulsus naturales.

Die 3^a pruritus, pustulae (aegro antehac solitae) ad brachium sinistrum, sequente

die adauctae. Hinc brachio huic vesicans imponimus.

Die 5^a Nullus capitis dolor; disparuit impetigo, sed urina copiosior est. Cruris impotentia. Dantur calomelas grana duo.

Die 8^a Vertigines; et visus obnubilatio recurrentes. Alvus adaperata.

Die 9^a Liber fuit aeger a capitis dolore, vertigine.

Die 10^a Surditas auris sinistrae. Vespere frigus diuturnum, calor auctus, pulsus quidquam febriles, pleni. Altera die loquendi difficultas, rubor faciei, aliquis capitis dolor.

Die 12^a Oculi dolor aliquis.

Die 13^a melius se habet, manum quidquam movet. Circa meridiem *convulsiones epilepticae* ad latus utrumque. Vespere satis bene se habet, dolor capitis nullus.

Die 15^a Pulsus pleni, dolor capitis, facies accensa, loquelae difficultas. Sectio venae jugularis ad uncias novem. Ad vespas, dolor capitis exiguus, sed magna loquendi difficultas, altera die adhuc major, cum pulsu pleno, tardo.

Die 20^a iterum pejus aeger se habet: dolor capitis auctus, rubor faciei, major loquelae difficultas. Cucurbitulae sex, rasis capillis, capiti imponuntur.

Die 22^a Capitis dolor exiguus, summa loquendi difficultas, stupiditas, inscia urinae in lectulum excretio.

Die 22^a Loquelae potentia fere sublata est, dolor capitis nullus. Pulsus vibrantes, ac pleni sunt. Venaesectio ad uncias decem.

Sanguis a corio quidquam obtegitur. Parum aeger sudavit.

Die 23^a Capitis dolor, loquela vix ulla.

Die 25^a Eadem rerum conditio, sed pulsus pleniores, fortiores sunt. Sanguis ad octo uncias detrahitur.

Die 26^a Singula imminuta sunt symptomata.

Die 27^a Haec iterum augentur, cura pulsuum plenitudine, nova venaesectio ad uncias decem.

Die 30^a Cucurbitulae ad nucham et ad tempora. Pulsus vero magis vibrantes et pleni reddebantur. Hinc sanguinis ad libram unam ducitur ex vena jugulari.

Sic per dies aliquot res semper in pejus ruebant, donec constans demum lateris dextri paralysis accesserit. Sic multos adhuc per dies eodem in statu res permansit; tandem vero *die 16^a* aprilis iterum convulsiones epilepticae, *21^a* die repetitae, accedunt, et aeger *22^a* *apoplectice* extinctus fuit. *Nulla unquam deliria!*

SECTIO CADAVERIS.

Adaperto cranio ac dura meninge, mox in cerebri hemisphaerio *sinistro*, ad posteriora, tumor prosilit, quatuor digitos in transversum latus, et ultra duos pollices profundus, mollis, et duabus maculis lividis notatus. Apertus hic tumor retulit cavum amplum, materia coacta, brunea, molli, cum sanguine remista, et cerebri corrupti

substantiam referente; plenum, cui digitus anteriora versus, ad pollicem unum cum dimidio immitti potuit. Huic ulceri, anterieus, alterum ulcus, superius primo, comparuit in ipsa pariter medullari substantia positum, nullibi cum priore communicans. In media cerebri, sinistri hemisphaerii, medullari substantia, prope sinum falciformem, macula sese obtulit livida, quae, semper latior, ad ipsum usque ventriculum sui lateris descendebat, incipientem in medio sui veluti suppurationem offerens. In dextro hemisphaerio, similis ventriculo laterali macula superimponebatur, lata admodum, similemque atram materiam sistens. Ventriculus cerebri lateris uterque, praeter paucum serum, materia brunea, molli, quasi polyposa, opplebatur; quae materia ex uno ventriculo in alterum, communicationem alebat; hac vero sublata, fundus ventriculorum integer erat. Cerebellum sanissimum. Reliquae cerebri partes intactae fuerunt.

EPICRISIS.

Confirmat haec observatio, quae in *Epitomes* L. II. §. 142. p. 49. docuimus: « aliquando scilicet, post encephalitidem, in uno alterove cerebri hemisphaerio, aut in ipso cerebello, tumoris fere circumscripti, ex pallido rubentis, flaviusculi speciem detegi, in quo pullacea quasi ac cinerea, pure tamen quodammodo crassior ac fere sicca invenitur materia. » Sectionum pathologicarum

huic spectantes historias plurimas collegit *Lieutaud* (1), atque *Morgagnius* similiter recensuit (2). Quamvis autem *Bursierius* speciali de *Sphacelismo Hippocratis* capitulo tractaverit, atque hunc morbum a cephalitide disiunxerit (3); nimis tamen inconstantia sunt unius ejusdemque morbi a gradu inflammationis symptomata, quam ut ideo genus inflammationis diversum per certos characteres exprimere queant. Graphica interim egregii quondam nostri antecessoris ac amici de *sphacelismo* cerebri descriptio est: « Facies, « inquit, tumet rubetque; oculi venis sanguine turgidis distenti, ac fere defixi immobilesque prominent; mens veluti stupida torpet; aeger ab imo pectore trahit suspiria, ingemiscit subinde, obsurdescit, aut certe difficiliter audit. Interrogatus, respicit quidem alloquentem; sed vix respondet unis plerumque intercisisque vocalis; deinde mox ab alto silentio premitur, sensusque prope amittit, solo motu superstite, quo adeo irrequieto plerumque agitur, ut locum, quo conquiescat, in cubili invenire

(1) Hist. anat. med. T. II. L. 3. pagina 169. 170. seqq.

(2) De sed. et caus. morb. Ep. vii. Legi quoque meretur *Fischer*, Abhandl. von einer verborgenen Entzündung und Eiterung des Gehirns. S. Samml. der auserles. Abh. für Wundärzte, 7 St. S. 237.

(3) Instit. med. Vol. 3. §§. 168 -- 180.

« non posse videatur. Exsilit etiam quando-
 « que, inordinate modo huc, modo illuc se
 « revolvit; modo crura pedesque dimovet;
 « modo brachia projicit; modo manus ad ca-
 « put convertit, modo capillos, modo bar-
 « bam evellens, modo faciem unguibus sibi
 « dilacerare aggreditur. Morbo autem jam
 « propecto, sensibusque prorsus extinctis, se-
 « datur, languet, ex toto obmutescit, oculos
 « interdum, alta voce excitatus, aperit, sed
 « nihil respondet, imo ne annuit quidem, et
 « quandoque, vel acriter punctus, membra
 « non retrahit, nec ejulatum emittit, apo-
 « plectico tum haud dissimilis, atque inter fu-
 « nestissima haec symptomata citissime in-
 « terimitur. In pueris saepe vidi resolutio-
 « nem unius lateris, aut opisthotonum, aut
 « motus convulsivos aliqua in parte, impri-
 « mis circa faciem, mortem praecedere (1). »
 Eximie certe cum hac descriptione convenit
 sequens, quam hic breviter modo ex nostris
 diariis excerpimus, historia.

Vir juvenis *Ticinensis*, triginta circiter an-
 norum, anno 1790, sine causa manifesta,
 in lethargum incidit, quem atrox capitis do-
 lor praecesserat. Succiplenum floridumque
 hunc juvenem tunc per venae jugularis sec-
 tionem, ac per hirudines ad tempora, et
 post aures positas, nec non per alviductio-
 nes blandiores, sine reliqua paralysi, unius
 spatio hebdomadae, restituimus. Anno ve-
 ro 1792 vir hic idem ab atroci capitis dolore,

(1) l. c. §. 170.

faciei rubore insigni, correptus fuit. Febris tunc pauca fuit; et pulsus pleni ac vibrantes, eandem sibi, quae duos ante annos tam utilis fuit, medendi rationem exegerunt. Nunquam tamen, sub morbi principio, sopor accessit, neque aeger aut ferociter unquam, aut aliter, quam vel ante, vel post somnium solent homines, deliravit; sed per dies adeo extra lectulum versatus, sub pulsu non amplius febrili, etsi pleno, nihil praeter perpetuum cephalaeae incrementum accusavit. Sic aliquos per menses, modo plus, modo minus, de hac ipsa conquestus est. Tandem supinus ac in dorsum semper jacuit, et oculis semiclausis dormire videbatur; sed facta quaestione, nihil quidem respondit; manum vero utramque versus caput tulit, hoc ipsum non tetigit, sed quantum id doleret, quasi mutus, manifestavit. Oculi aperti, vasis rubris ac turgidis undique picti, turbidi ac moesti fuerunt, mox iterum a palpebris obtecti. In altos interdum ejulatus aeger rapiebatur; aliquando lectulo cum impetu prosilit, per cubile, desperabundus, citiore gressu ambulavit; nunquam tamen vomuit, aut mentis impos est visus. Sub fine morbi lethalis, nobis tunc *Papia* absentibus, quietus et quasi stupidus, in unum latus capite conversus, nec oculos amplius aperiebat, nec verba proferebat; sed ambabus manibus capiti admotis, profunde suspirabat; ac tandem sensu omni destitutus, more apoplecticorum extinctus fuit. Amplissimus in cerebri hemisphaerio sinistro

abscessus, vix tamen pure, sed caseosa quasi ac pultacea, cinerei coloris materia repletus detectus fuit.

Sic etiam vir quadragenarius, mense Januarii 1786 ad clinicum Institutum *Ticinense* susceptus, sinistro in latere paralyticus, sub fine morbi lethalis, enormes capitis dolores, continuos ejulatus extorquentes, manifestaverat; *parum* interim *deliravit*, parum dormire potuit. In cadavere, *dextrum* cerebri hemisphaerium, ad centrum semiovale *Vieussenii*, largum is nobis abscessum obtulit. Similem etiam abscessum in parte cerebri posteriore deteximus.

Partem vero cerebri conspicuam, sine functionum mentalium laesione devastari posse, quod jam ab aliis adnotatum fuit, ex propria etiam observatione fuimus convicti. Mercator, prope *Bruchsaliam*, a latronibus ad caput percussus, fertur ad urbem. Ob vim summam calvariae illatam, spes vitae servandae pauca chirurgis conceditur. Post novemdecim tamen hebdomadas, hunc virum per plateas versantem, praeter parvum ad frontis partem dextram vulnusculum, fascia munitum, aspectu sanum vidimus. Cum igitur chirurgus expertus, hoc vulnusculum, pertinaciter apertum, specillo, caute admoto, examinandum, in supino aegro subjiceret, cariam ille quidem ad os frontis detexit; sed specillum suo pondere calvariam, plures ad pollices, ut vastum in cavum, penetravit ac delapsum fuit. Perterritus chirurgus, instrumentum, quin aeger hujus

sensum habuisset, ex cerebro retraxit, ac terroris percepti rationem amice nobis exposuit. Cum vero hic mercator, *Frankofurtum* altera jam die petiturus, per urbem nobis obviam prodiret, ab itinere eundem, etsi nullius incommodi sibi conscium, donec vulnusculum ad frontem clauderetur, deflectere incassum tentavimus. Ipsa scilicet nocte insequente, hoc iter in curru publico suscepit, nec de importuna corporis ab eodem conquassatione conquestus est; vix autem urbem alliderat, cum, subitaneo ad caput erysipelate correptus, tertia hujus symptomaticis die e vivis discessit.

Sic anno 1766 virum robustissimum *Rotalbae*, quo loco primam lucem conspeximus, tractavimus; qui vir probus, ut vicini sui boves ab interitu salvaret, ex altissima rupe in vallem profundam ipsemet praecipitatus fuit. Ad prominentem rupis angulum, capite, sub lapsu, allidens, calvariam miser in octo partes diffregit adeo, ut digitum inter ossis parietalis sinistri fragmenta transversim imponere potuerimus, et ut singula hujus lateris integumenta capillata, horrido aspectu, cum ipsa aure externa, ab ossibus cranii divulsa, super humero penderint. Atqui tamen hic vir, non modo novem per dies supervixit; sed nec minime deliravit, semper sibi praesens, si duas ultimas ante mortem horas, quibus utique delirium accessit, excipias.

VOMITUS LETHALIS EX ENCEPHALITIDE.

Mense martio 1792, mulier 30 annorum, clinicum Institutum *Ticinense* adivit, sexto mense gravida. A quadraginta duobus jam diebus illa vomitu fere continuo laboraverat. Insignis ad caput dolor praecesserat, nec ullum huic remedium oppositum fuerat. Caput nunc quoque doluit, sed facies pallida fuit atque cachectica. Amaror oris, vomituritio perpetuo urgent, et frequens est bilis aeruginosae ex ore rejectio. Deliria, quod noverimus, hucusque nulla fuerant; foetus sese in utero adhucdum movebat. Ad vespervas, pulveres ex cremore tartari cum quarta parte grani unius tartari emetici mixto, porreximus. Die sequente maximam aeruginosae bilis copiam ad horas matutinas evomit, continuas nauseas accusans. Praebuimus tunc radicis *Ipecacuanhae* grana duodecim. Mox ista revomit. Cum vomitus ad vespervas urgeret, laudani liquidi viginti guttas porreximus. Ex instanti et ista revomit. Eadem tunc medicina, absque alio vehiculo, propinata fuit. Retinetur haec per horam, tunc partum praematurum mulier passa est. Mox vomitus iterum ingruunt, et ad finem noctis moritur aegra.

SECTIO CADAVERIS.

Aperto cadavere, nihil morborum in abdomine comparuit, exceptis vermibus, ex
Frank tom. I.

ascaridum lumbricoidum familia, tribus, flava viscidaque bile obductis, et in ventriculo repertis. Vesicula fellea collapsa et fere vacua fuit. Aperta calvaria, duram meningem ad utrumque os parietale summo opere inflammata, atque versus cerebrum a pseudomembrana investita, ruberrimam conspeximus. Serum puriforme cerebrum non durum, ac piam matrem inundaverat.

EPICRISIS.

Erravimus igitur, dum, morbum biliosae indolis credentes, levissimum licet, emeticum porreximus. Absentia delirii, soporis, quadraginta duo dies, sine alio, quam vomitus, phoenomeno transacti, hunc nos in errorem in muliere, quam certe nulla methodus salvasset, traxerunt.

DE GLOSSITIDE.

Dum *Epitomes* secundum, de inflammationibus, librum ederemus, viginti sex annorum in rebus medicis experientiam, non communem sane, habuimus. Ingenue interim tunc fassi sumus (§. 163), *glossitidem primariam* illuc usque, unico modo exemplo nobis ipsis comparuisse. Aliorum hac de re scriptorum observationes ignorare certe non potuimus. Ab eo tempore, sexies hunc morbum conspiciendi occasionem nacti sumus; ut igitur in amplissimo artis, per novem

fere lustra, exercitio, modo *septem* hujus morbi specimina nobis ipsis oblata sint. Cum senioribus variarum regionum medicis non paucis, ut consuevimus, hunc etiam circa morbum conferentes, et illis eundem aut raro, aut nunquam obvenisse intelleximus (1). Casu interim, aut forte fortuna, junioribus aliquando talia, quae senum oculos fugerant, videre pluries conceditur. Sic occasione primae glossitidis a nobis *Ticini* inspectae auditorum nostrorum unus (2), cui fidem denegare non licuit, sibi octo hujus morbi, *Heidelbergae* ante annum quasi *epidemici*, exempla vel unico in anno oblata esse publice testatus est. Quamvis autem varii glossitidis casus in fastis medicorum descripti legantur; ob morbi nihilominus raritatem, aliquos ex illis, qui, praeter illum, quem in *Epitome* nostra l. c. §. 164, retulimus, aut nobis aut amicis nostris oblata sunt, hic referri, non inutile fore ducimus.

(1) *Viennense* in nosocomium, cui novem per annos dirigendo praefixi fuimus, *sexdecim* circiter millia aegrorum ac parturientium quotannis suscipiuntur. Deductis his ultimis, 13000 incirca aegrorum per annum superstant. In tanto vero aegrorum numero, nec *septem* quidem glossitidis exempla fuerunt.

(2) *D. Edmundus Schmuck*, *Heidelbergensis*, morte praematura literis ereptus.

Mitioris specimen glossitidis hic primum tangimus. *Josephus Schwedler*, novemdecim annorum juvenis, opifex scriniarius, robusti satis corporis, praeter psoram et aliquem ventriculi dolorem, a quibus ante annum liberatus fuit, sanus semper vixit, donec ante mensem, pectoris nariumque catarrhus eundem corripuerit. Quatuor ante dies, horripilationes vagae, caloribus interruptae, dolor capitis, tussis inanis, deglutitio impedita accesserunt, quibus singulis neglectis, dolor faucium increvit. Tandem, 8^a mensis decembris 1796, de nocte, ardentem aeger dolorem ad apicem linguae persentit. Mox haec intumuit multum, exaruit, doluit, et ad loquelam inepta, oris cavum moleste implevit. Nosodochium igitur Viennense ingressus juvenis, alvo primum purgatus est, sine levamine, decies.

Die 9^a decembris, aeger ad Institutum clinicum susceptus, doluit ad caput, ad frontem imprimis, sensibilior ad lucem fuit oculus, coryza perstitit, lingua rubro admodum colore notata, tumida, arida et ardens, nec porrigi, nec retrahi potuit, tumuerunt glandulae sublinguales, tonsillae, vox simul et deglutitio fere impeditae, libera quidem respiratio, nisi per tussim turbata, sitis magna, cutis sicca et ardens, pulsus frequentes, quidquam elevati, horrores caloribus intermisti, adnotata fuerunt.

Cataplasma emolliens sub mento, vesi-

cans ad nucham posita, vapores tepidi ad linguam dirigendi, collutorium ex lacte, enema nutriens ex jusculeo carniū cum ovi vitello, pro medicina vero, infusum, ac roob sambuci, cum aceti ammoniacalis uncia una et dimidia, praescripta fuerunt.

Die 10^a Noctem aeger sat bene transegit; lingua mobilior, dolet minus, toto corpore sudor prorupit, alvus quinquies soluta fuit, tussis arida, dolor capitis continuant; urina rubra, parca est.

Die 11^a Linguae tumor dolorque magis imminuti; capitis dolores cessant; liberior est deglutitio. Sudor undique profluit; alvus bis mota fuit.

Die 12^a Nox inquieta fuit, dolor ad oculorum orbitas haeret, dolent artus, tussis inanis aegrum divexat, cujus interim lingua minus dolet, magisque detumuit. Pulsus molles ac debiliores sunt.

Corticis chinae decoctum, cum liquoris anodyni Hoffmanni drachma dimidia pro usu interno, infusum vero sambuci cum melle, pro collutorio, propinantur. Cataplasma, vapores continuantur.

Die 13^a Sudor hac nocte copiosus fuit; tumor linguae, tonsillarum, disparuit, somnus placidus, febris vix ulla.

Ad vespervas, caput iterum dolet, sitis urget; dolent artus, pulsus iterum febriles, sed molles sunt; lingua iterum humida, deglutitio non dolent, transpiratio cutis acidum redolet. Decocto corticis camphorae superadditur scrupulus.

Die 14^a Nox melior successit. Dolor capitis evanuit, sudor aliquis, nullus ad linguam aut fauces dolor accusatur, pulsus naturalem frequentiam observant.

Die 15^a Praeter tussim, disparuerunt morbi symptomata. Camphora seponitur, removentur cataplasmata, vapores.

Die 18^a convalescens juvenis ad suos laetus rediit (1).

GLOSSITIS CUM SUPPURATIONE.

Quindecim annorum puer, vitae campestri adsuetus, ab omni morbo hucusque immunis, octo circiter ante dies, cum, sub gelu acuto, levi veste munitus, labori fortius incumberet, dolorem a dorso linguae versus apicem extensum, simul vero ad fauces dilatatum, expertus est. Lingua hoc rerum sub statu intumuit. Successit nunc frigus per tres dies continuum, nulli calori intermistum.

Die 8^a mensis decembris 1792, hic puer ad clinicum Institutum *Ticinense* defertur. Facies illius rubet, caput vero dolore liberum est. Verba, quae proferre tentat, intelligi ab aliis haud queunt. Difficilis maxillarum diductio est. Lingua dura, situm mutare, aut porrigi medico haud potest. Cochlearis per manubrium quidquam ea depressa, mucos tenaci obducta, tumorem ad radicem

(1) Aegro adstitit, ac morbi historiam conscripsit *Antonius Seichter*, medicinae candidatus.

suam, ab attactu dolentem, modice elevatum, praesentat. Scretio, vel tussi nulla. Praeter fluida, jam duobus a diebus, degluti-
turi nil potest. Glandulae submaxillares tum-
ment, et omne quasi mentum occupant. Nullum adest ciborum desiderium; respira-
tio tamen facilis, pulsus pleni ac duri sunt: venter mollis est.

Cruor ad uncias decem e vena emittitur. Sub mento, cum linimento volatili illito, ca-
taplasma emolliens imponitur, lac tepidum, ore detinendum, enema praescribuntur.

Die 9^a Somnus nocte nullus, cutis ari-
da, coetera symptomata continuant. Sedi-
mentum in urinis puriforme conspicitur. Oc-
to hirudines sub mento ponuntur. De-
coctum hordei cum nitro et melle pro collu-
torio praescribitur.

Ad vespervas, pulsus pleni, frequentes, subduri; dolor glandularum sublingualium acerbus est. Famem puer nihilominus ac-
cusat; lactis vaccini libra, tepide haurienda, conceditur.

Die 10^a Absque sudore noctem transe-
git. Dolor submaxillaribus in glandulis major est. Lingua magis rubet, ac a lym-
phae coagulo obducitur; mobilior tamen, verba quaedam melius pronunciat. Febris imminuta, pulsus tamen adhuc frequentes sunt.

Praescribitur haustus salinus cum grano tartari emetici; continuantur reliqua.

Nulla circa vespervas exacerbatio fit; du-

rities glandularum interim perseverat, et ad minimum attactum hae dolent.

Die 11^a Nox quieta fuit, sudor nullus, puriformis in urinis materia subsidet, febris vix manifesta est.

Post prandium sudor accessit, non quidem largus, sed tamen per omnem corpus diffusus. Pulsus magis pleni sunt, deglutitio liberior.

Die 12^a Tumor ac durities ad glandulas continuant; in urinis nihil subsidet; sudor nullus est.

Die 15^a Tumor in glandulis submaxillaribus hucusque increvit, rubore, dolore pungente, pulsante, ad attactum aucto, distinctus. Hirudines octo iterum adponi iussimus.

Die 16^a Manifestum in tumore suppurationis initium digito se prodit. Cataplasma illi adponitur.

Die 17^a Fluctuatio manifesta nunc in tumore percipitur, febris vero nulla est.

Die 19^a Pus per foraminula tumoris sponte prorumpit, per duas dies effluere continuans. Sic tumor magis magisque immixtus tandem evanuit, ac naturalem sibi formam mentum adeptum est.

Die 26^a puer, sanitati perfectae restitutus, decessit ad suos (1).

(1) Historiam morbi descripsit, et aegro adstitit
Edmundus Schmutz, medicinae Candidatus.

GLOSSITIS ALTERA , IN SUPPURATIONEM
VERSA.

In pago *Mandelli*, Auditor noster, *Vincen-
tius Pini*, Medicinae Doctor, virginem rusti-
cam, 24 annos natam, morbo nullo hucusque
vexatam, pinguem ac robustam tractavit ex
glossitide correptam. Die nempe 15^a men-
sis augusti 1793, illa, postquam pridie su-
dor ei suppressus fuisset, in tussim siccam,
cum faucium titillatione et loquelae difficul-
tate, incidit; quibus vesperascente sole, fe-
bris consociata fuit. *Die* 16^a mane, haec
quantisper remisit; sed paulo post exacerba-
ta fuit cum diuturno, et membra concutiente
frigore, tussi sicca, faucium et linguae ari-
ditate, ardore atque tensione, ad vespertas
adauctis. *Die* 17^a nulla accessit febris remis-
sio, sed symptomata recensita increverant,
ac omnis tam deglutiendi, tam loquendi fa-
cultas ablata fuit. Ad noctem febris, cum
magna cephalaea, intensior facta est.

Die 18^a Accersitus nunc medicus prae-
ter symptomata relata, faciem observat ru-
bram et tumidam, oculos splendentes, ca-
pitis gravedinem; os, ob linguae, ultra den-
tes propendentis, tumorem, apertum. Pars
linguae, oculis subjecta, materia lardacea
ac alba obtectata est. Magnus tumor glan-
dularum sublingualium, maxillarium, ad
magnam juguli partem, in sinistro praeci-
pue latere, extensus, aderat. Urgebat si-
tis, sed nulla fuit deglutiendi possibilitas,
respiratio erat difficilis. Pulsus oppressi ma-

gis, quam pleni, abdomen tumebat, alvo a tribus jam diebus minime reserata; cutis arida fuit et sicca. Vena tunc ad libram secta, cataplasma emolliens mento et collo admotum, et enemata praescripta fuerunt. Ut lactis tepidi, quantum liceret, vel ore retineret, vel deglutiret, imperatum fuit.

Die 19^a mane. Sanguis emissus nullo obtegatur corio, sed admodum tenax est. Aclystere, alvus copiose motus fuit; noctem aegra valde insomnem transegit. Pulsus magis elevati, duriores sunt. Glossitidis, cynanchis symptomata vigent. Altera hinc venaesectio ad libram instituta, in coeteris vero continuatum fuit. Ad vespervas, sanguis extractus corium aliquod obtulit. Faciei rubor, splendor oculorum, capitisque gravedo vix amplius persistunt. Faucium pariter ardor et tensio imminuuntur; respirandi interim atque deglutiendi difficultas continuant. Pulsuum eadem et plenitudo, et durities est. Tertia hinc venaesectio instituta, cum coeteris autem continuatum fuit.

Die 20^a mane, sanguinis heri emissus crusta evidentiore obtectus est. Alvus bis laxata fuit. Quamvis autem febris aliqua symptomata remitterent; lingua tamen mole sua omne oris cavum adhuc implebat: quapropter decem hirudines sub mento et ad colli anteriora positae fuerunt, quarum ope septem circiter cruoris unciae effluxerunt. Liuteoli ope tenacior materia caute a lingua abstersa fuit. Ad vespervas, tumor externus non pa-

rum imminutus comparuit. Dolor et tensio faucium minores sunt. Nulla febris observatur exacerbatio. Cutis erat madida et pulsus non amplius aut duri, aut vibrantes fuerunt. Infusum hinc sambuci propinatum, enema praescriptum, ac in cataplasmate continuatum fuit. Versus horam nonam nocturnam, medicum, mater aegrae, ut ad filiam, morti vicinam, properaret supplex orat. Ad circi fauces revera haec haeserat. Omnem nempe spiritum linguae tumor strangulans adimebat. Hoc tremendo rerum sub statu, de tracheotomia cogitavit medicus, si mortis augerentur discrimina; sed novam prius cruoris missionem instituit, quam, nisi terror id adfinium impedivisset, ad venam jugularem tentasset. Mox a misso sanguine, respiratio aegrae facta est liberior; stertor et anxietas moderari cœperunt. Post aliqua vero minuta, sub valido ad tussim nisu, nemine id suspicante, *abscessus*, qui ad latus sinistrum basis linguae haerebat, diruptus fuit, et puris concocti tres fere unciae, cum summo aegrotantis levamine prosilierunt.

Die 21^a Nulla amplius febris comparuit, lingua glandulaeque detumescunt. Magnam puris quantitatem illa primis diebus fundebat. Cutis coepit madescere; alvus bis mota. Ter quater in die linguae ulcus cum hordei decocto et melle abstergitur.

Die 24^a Nullam hucusque febrim accusavit aegra; ulcus, nova substantia repletum, parum puris fundebat. Nocte copiosus sudor manabat sub calore vix non naturali. Uri-

na sedimentum deponit lateritium. Loquela indies fit clarior.

Die 28^a Cum linguae abscessus coaluerat, tuberculum ad latus illius durum remansit, quod sub loquendo dentes allidens, difficilem reddere verborum pronunciationem, ac ingrata sensationem aegrae adferre solebat. Hinc uncia mellis cum acidi sulphurici drachma una remista et bis terve in die cum istis tuberculum ad linguam illitum fuit. Quindecim dierum spatio hoc ipsum, hac sub methodo, dispersum, perfectae vero aegra saluti restituta fuit.

GLOSSITIS, EX NICOTIANAE TABACI FOLIIS
ORTA.

Audotia Tichonova, nautae uxor, 37 annorum, constitutionis haud robustae mulier, et praegressis morbis variae indolis, tum aliis, aut syphiliticis, nec non venaesectionibus ex consuetudine institutis, exhausta. Anno 1805 haec faemina duorum foetuum abortum passa est, et ab hoc tempore urinae laboravit in voluntario profluvio. Anno 1806 odontalgia vehementissima suborta est, ad quam sopiendam, aegra, consilio agyrtae, *nicotianae tabaci folia* dentibus adplicuit. Remedio hoc per nycthemeri spatium in oris cavis detento, lingua ad tantum tumorem, sub summis doloribus, increvit, ut os nullo modo claudi potuerit. Rubebat pars haec summopere. Salivae fluxus uberrimus, continuus, sub tussi adauctus, accessit. Hoc

misero sub statu, aegra, sine omni auxilio adhibito, vix deglutire potuit, vix verba quaedam proferre. Magna simul respirandi difficultas, vigiliae nocturnae, has miserias ita augebant, ut, *die* 12^a novembris, haec aegra, in clinicum Institutum. Academiae medico-chirurgicae *Petropolitanae* delata, moribundae faciem faeminae nobis offerret.

Examine hoc in loco subjecta, foetorem haec mulier insignem vixque tolerabilem late sparsit. Salivae magna copia perpetuo ex ore fluxit. Lingua tumefacta, dura, pirae-rubra, muco albo, cremori lactis simil, copioso, involuta, immobilis haerebat, ad omnem attactum sensibilissima. Parotides simul dolent tumentque; urgent vertigo, cephalaea. Deglutitio prorsus fere est impossibilis, ac parum modo liquidi fauces transire valet. Respiratio laboriosa, loquela fere nulla, ut solis cum signis aegra se exprimat. Pectoris quoque et hypochondrii sinistri dolorem manifestat; facies pallida, oculi moesti, lachrymantes sunt. Maxillae inferioris motus impeditus, os vero late adpertum est. Ad noctem aegra frigus, quod calor insecutus est, persensit. Lassitudinis insignis imago coram habetur. Conatus urinam mittendi frequens est, nihilominus ista nolenti foeminae profluit. Abdomen molle, sub attactu non dolet.

Pro collutorio praescribitur infusum florum chamomillae, cum lactis aequali portione remistum. Glandulae parotides, mentique regio, cum linimento volatili inun-

gantur, ac pauni lanei calefacti adplicantur his partibus.

Die 13^a Noctem aegra sine somno transegit, sitis summa; pulsus exiles frequentes fuerunt. Alvum hoc mane liquidam, paucam, excrevit. Linguae tumor, rubor, dolor insignis. Post meridiem, frigus in longum tempus extensum, ab aegra percipitur. Sequitur hoc calor cum paucio sudore. De pectoris, nec non de sinistri hypochondrii dolore, novae querelae. Fauces dolent ac ardent. Respirationis difficultas quidquam imminuta est; pulsus semper exiles ac debiles sunt. Ex oris cavo foetor, cum illo ex urinis, in lectulum continuo demissis, conjunctus, per omne spargitur magnum cubile. Decoctum malvae, cum melle despumato pro collutorio nunc praescribitur. Lac tepidum, aut jusculum, qua potest, ratione ingeritur.

Die 14^a Somno interrupto per horam aegra dormivit. Foetor oris hodie quidquam magis est tolerabilis. A jusculi quidquam calidi deglutitione, frustum sanguinis coacti, durum, magnitudinis unius pollicis cum dimidio, ex ore decidit, unde quidquam levaminis mulier percepit. Alvus hodie non fuit deposita; urinam vero aegra, hujus excretionis conscia, minxit. Ad noctem febris augetur, cutis vero mansit sicca; caput doluit, lachrymabantur oculi; dormivit parum, sed quidquam facilius respiravit aegra. Pulsus semper debiles et frequentes sunt. Alvus parum soluta, foetidissima et fluida. Linguae dolorem aegra, sub at-

tactu, minorem accusat; sub verborum vero articulatione pungentem experitur. Alba spissaque materia omnem linguae superficiem superiorem obtegit, nec tumoris in illa decrementum observatur. Volumen interim parotidum, saepius cum linimento volatili cum camphora iunctarum, sensim imminuitur. Mellior etiam hic tumor est, parumque doloris inducit.

Die 15^a Cephalaea quidquam minor, dolor vero linguae, sub loquela pungens, continuat. Pectoris atque hypocondrii sinistri dolores dissipati, ad articulationes conversi sunt.

Pomeridianis horis, sitis magna fuit, ac frigus intensum accessit. Linguae, paucum nunc muco obductae, durities imminuta est, ac tumor quoque subsidet. Salivae fluxus foetidae perpetuus est. Pulsus frequentes, molles, et quidquam elevati sunt.

Collutorium hodie praescribitur ex infusi florum chamomillae libris duabus, et laudani liquidi *Sydenhami* drachma una.

Die 16^a Nulla rerum mutatio est.

Die 17^a Febris parva, sitis exigua, capitis dolor nullus observantur.

Per tres dies symptomata mitiora sunt.

Die 21^a loco laudani liquidi, opii puri grana decem collutorio superaddimus.

Die 22^a Lingua, ad naturalem quasi magnitudinem redacta, aliquem jam motum exercet. Parotidum etiam tumor ac dolor dissipati sunt. De sola debilitate aegra, nunc hilaris animi, conqueritur. Febris eam nulla tenet, clare ac distincte loquitur, foetor

oris disparuit. Parum interim somni conceditur. Porriguntur hinc ad noctem laudani liquidi guttulae duodecim.

Die 23^a Somno aegra bono gavisata est; lingua mollis, ac fere pura est. Decoctum amarum pro medicina praescribitur.

Restitutis tandem, sub victu nutriente, viribus, aegra die mensis ejusdem 30^a dimissa fuit (1).

GLOSSITIS CUM GANGRAENA.

Summum quendam foetorem, sub nosocomii *Viennensis* inspectione, in uno ex ejusdem cubiculis, aegrorum curae destinatis, percipientes, medicum istorum ordinarium, qui tantam atmosphaerae corruptionem toleraret, ex officii ratione compellavimus. At ille, praescriptam rerum aerisque puritatem religiose observari confirmans, nos ad lectulum aegri, qui cadaverosum hunc foetorem ex *linguae gangraena* spargeret, conduxit. Vir, quem hic observas, inquit, scorbuto detentus, in typhum incidit, cujus praecipuum symptoma *glossitis* fuit. Ad apicem linguae scilicet suborta est inflammatio; quae paucorum spatium dierum, ac antequam hunc ad locum aeger, morti vicinus, deferretur, in sphacelum abiverat. Ac revera, mox linguam hujus viri quinquagenarii, ad duas tertias sui partes in tabum conversam, nigerrimam, cum horrore conspeximus.

(1) Historiam conscripsit, ac aegrae adstitit alumnus Academiae *Worobjewitsch*.

Hunc igitur aegrum, ne tam saevam mephitim exhalans, sociis obesset, separatim ac amplum ad cubile deportari, ac ibidem, ob summa vitae, tam ex typho, quam imprimis ex instante vasorum linguae conspicuorum profluvio cruento, discrimina, proprio chirurgo et custode mox instrui curavimus. Post triduum, a media nocte, sanguis, quo loco eschara gangraenosa separari incepit, primum non plurimus, vianæ sibi paravit. Interea chirurgus *secundarius*, de imposito sibi gravi officio minus sollicitus, lectulo se proprio commiserat, ac tertia licet vice in auxilium, non sine instantis admonitione periculi, accersitus, stragula, donec fatale aegrum ex linguae vasis profluvium, die 20^a septembris 1796, e vivis rapuisset, deserere neglexit. Etsi vero nobis pro aegro, vel solum ob typhum gravissimum, scorbuto adsociatum, spei parum, aut nihil, adfulsisset; ac licet haemorrhagiae ex linguae gangraenosae vasis majoribus, profundo in oris antro, compescendae difficultas nos minime lataisset; chirurgus tamen, utpote de iis, quae tanto sub discrimine tentanda forent, probe instructus, ob tam sancti neglectum officii, a nosodochio relegatus fuit.

EPICRISIS.

Ex quinque his *glossitidis*, expositis a nobis, exemplis, tum causarum, quae hunc morbum producant, tum symptomatum,

Frank tom. I.

tum febris eundem comitantium diversitas, ac methodi medendi, huic ipsi adaptandae, ratio elucet. Tam ille ipse, cujus in *Epitomes* L. II. §. 164. meminimus, quam alii quatuor, quorum historiam hic tradidimus, subitaneae transpirationis interceptioni hanc adlectionem adscripserunt; atque sic, quemadmodum *cynanchis*, ita etiam *glossitidis*, scaturigo, quavis longe rarius hujus ultimae, hoc ex fonte, prout eodem in opere §. 165. indicavimus, derivanda est. Aegram *Petropolitanam*, nicotianae tabaci e foliis hunc sibi morbum adscivisse, licet eorundem foliorum frequentior masticatio apud plurimos hunc effectum haud exserat, eo minus mirabimur: quod mulier haec debilis et cachectica, ob praegressas luis venereae rationes, frequentem mercurii usum fecerit, atque majorem sic longe oris sensibilitatem contraxerit. De inflammationibus, a vulnere, laesione, corporibus peregrinis ad linguam productis, sermonem hic, ut qui nobis tantum de *glossitide primaria* est, non instituimus. Ac prima quidem ex illis, quas descripsimus, *cattarrhalis* ea manifeste progeniei dicenda fuit. Ad secundam vero quod respicit, num ea de *cynanchis*, quam *externam*, seu *parotidaeam* vocavimus (*Epitom.* L. II. §. 174.) familia sit, eo magis dubitari licebit: tum quod eo ipso tempore, in quod haec glossitis incidit (A. 1792.), illa ipsa *cynanché*, *Ticini*, inter juniores, latissime regnaverit; tum quod submaxillares glandulae, non modo a primo febris impetu, ad extremum usque, volu-

mine augeri, dolere observatae sint; sed mobili, ac verba modulante jam lingua, tumere continuaverint, ac demum in *abscessum* transiverint. In omnibus interim glossitidis conspectis a nobis exemplis, tum hae glandulae, tum sublinguales, ac in uno vel ipsae parotides, partem sibi symptomaticam sumpserunt. Quodsi quis parum in artis exercitio interesse dixerit, num *cynanchis externa* magis soboles, num idiopathicae naturae sit glossitis; replicabimus huic: in prima existis, quam, cum *Iosepho Pratolungo* (1), morbis nunc magis *exanthematicis*, quam *inflammationibus* subjugare vellemus, raro tantam venaesectionum necessitatem subintrare (Epitom. l. c. §. 180.), frequentius vero has, ob faciles metastases, esse noxias. Quod interim eam, quam secundo loco descripsimus, glossitidem, cynanchi parotidaeae haud fuisse adfinem, nos credere inducit, *suppuratio* est, quae raro in hac ipsa, nisi forsitan ex aure, contingit. In duobus autem ex adductis hic exemplis, *abscessus*, et ab aliis descriptus, secutus est: quorum ultimus, nisi prudens medicus illico cum sanguinis missione periculum evitasset, antequam ille rumperetur, aegram, jam stertorosam, suffocasset. Febrem vero nunc satis exiguam, nunc vere hypersthenicam, nunc autem typhoden, diversimode glossitidem circumdare, ac ideo venaesectionem nunc

(1) Vid. *Burserii Instit. med. pract.* Vol. III. pagina 275.

nullam, nunc saepius replicatam, hanc sibi exigere, ex adhibita felici, nunc blandiore, nunc deprimente, nunc vero incitante mendendi ratione jam satis elucet. Gangraenam, quae ultimo in aegro comparuit, cum *glossanthrace Sauvagesii* (1), ut morbo bestiis domesticis fere proprio, nil habuisse commune, supponimus.

TUMOR ET ULCUS LARYNGIS.

Rosa Gatta, ex *Siccomario*, rustica, annorum 46, antehac robusta, semper sanissima, firmique corporis habitus, per duos menses a tussi vexata fuit. A mense, gutturi superadditur dolor profundus, tussis fit asperior, sequuntur sputa admodum copiosa, puriformia, spirandi difficultas, aliquod in cibis ad ventriculum demittendis impedimentum, febricula. Remittunt haec; ast vero a quindecim diebus respiratio est difficillima, sonora, sibilosa, cum gutturis angustia pectorisque supremi oppressione peragenda. Febris interim vix ulla adest. Ructus foetidissimi ac vix tolerandi exploduntur. Alvus pertinaciter obstructa, magna cordis palpitatio, pervigilia continua. Aliquando cervice erecta lectoque insidens aegra, ob imminentem suffocationem, respirare cogitur. Post duos in nosocomio *Ticinensi* peractos dies, infelix mulier praefocata periit.

(1) Nosolog. meth. T. IV. p. 360.

SECTIO CADAVERIS.

Ad laryngis parietem posticum, qua arytenoideae cartilagine, inter ipsas membranas, abscessus detectus fuit, nucis avellanae magnitudinem aequans, cujus adhuc spectabilis est cavitas. Arytenoideae ipsae et earundem ligamenta, medio in abscessu haerentia; non nihil corrosa erant et consumpta. Pulmones erant sanissimi.

EPICRISIS.

Epitomes libro III. §. 173 p. 107. 108 de *cynanche laryngea* pauca quidem, sed quae potissime ad rem facerent, docuimus. Hanc doctrinam illustrat praesens morbi historia, quam viri egregii, *Joannis Defelici*, medici Ticinensis, ac nostri quondam auditoris, solertiae, sicut multa alia, debemus. Praeparatum, ut vocant, pathologicum hujus morborum laryngis in museo *Ticinensi* expositum est. Exemplum multa *pseudomembranarum*, superficiei laryngis internae post inflammationem adhaerentium, — aliqua *polyporum*, naturae suae his adfinium, *aphtarum*, *variolarum* hic residentium, pauciora, — carunculae, sarcomatis paucissima habentur. Ipsae, quibus cavum laryngis investitur, *membrae*, a sero flavescere, tenaci interdum *tumuerunt*. *Ulcerum* quoque non tam raro has ipsas membranas atque cartilagine laryngis corrose runt. Cartilagine cricoideam laryngis ex

ulcere poene destructam conspeximus anno 1793, in nosocomio *Ticinensi*, atque laryngem posterius suppuratam illinc in museo pathologico conservavimus. In clinico Instituto *Vindobonensi*, mense maji, anno 1804, arytenoideas cartilagineas corrosas observavimus. Ulcus cancerosum laryngem interius erodit (1). *Pus* ex albo cinereum et quasi pultaceum, in obturamenti modum formatum, laryngis cavum in virgine asthmatica, repentina morte ablata, obturaverat (2). Nec *tumorum* ad laryngem exempla desunt. Glandulas laryngis apud proles, quarum parentes ex phthisi pulmonali perierant, obstructas ac tumidas reperiit celeberrimus *Portal*. In quibusdam phthisicis glandulae laryngis, sicut illae pulmonum, aegrotant, et partim tabem producunt, partim ab ista intumescunt. Ad pisi magnitudinem tumentes vidit ille has glandulas, pluresque ex istis suppuratas cum ligamentis rimae glottidis, et ipsa epiglottide ac larynge erosio (3). Rariores vero tumores majores sunt, in cavo laryngis reperti. Morte tamen subitanea periit aeger ex *tumore scirrhuso* ad internam et posticam laryngis par-

(1) Haec laryngis vitia collegerunt, G. C. *Conradi*, Handbuch der pathol. anatomie, S. 457. S. F. G. *Voigtel*, Handb. der pathol. anatomie, II. B. S. 310. 311.

(2) *Morgagni* de sed. et caus. morb. Ep. XV. n. 13.

(3) Cours d'anatomie médicale, T. IV.

tem, ex praevia cynanche relicto (1). Aeger
 cujus historiam recenset *Flormann* (2), jam
 ab aliquo tempore difficulter respiravit, de-
 glutiit, tandem vero suffocatus periit. Ad
 laryngis partem posteriorem tumor detegeba-
 tur pure repletus, nucis juglandis magnitudi-
 nem referens. Fere totam posteriorem laryn-
 gis partem is occupabat, atque ad primam car-
 tilaginem circularem tracheae pertingebat. In-
 terius, tumor laryngem quasi obturabat, car-
 tilago cricoidea erat erosa, pusque ipsum
 hoc foramine penetrans, internam laryngis
 membranam in tumorem elevaverat. Nec mi-
 norem sibi medicorum attentionem meretur
 tumoris supra descripti, ad laryngem in *ab-*
scessum mutati historia. Hic etenim morbus,
 non ut cynanche laryngea, febrem acutis-
 simam accendit, ac etsi aequae lethalis, lon-
 giorem decursum agnovit. Dolor ille pro-
 fundus, quem mulier, post tussim duorum
 mensium, alterum per mensem accusaverat,
 inflammationis non tam erysipelaceae, quam
 phlegmonodis, tussi, nunc asperiori, junc-
 tae, principium sistit. Sputa, quae nunc
 rejiciebantur, non tam purulenta, quam
puriformia, et quidem *plurima*, fuerunt.
 » Tantum nempe pariformis humoris cogi
 in eum locum potuit, quod non modo glan-
 dulae sub ea tunica consitae; sed et ven-
 triculorum caveae, in quas ea tunica se

(1) *Smyth*, medical Communicat. Vol. I.
 n. XXXI.

(2) *Schwedische Abhandlungen*, XI. B.

producit, tum ejuscemodi glandulae, tum inferius crus operiens glandularum arytenoidearum eundem largirentur (1). » Sed jamjam a tumore, angustia ac dyspnoea majores exortae fuerunt, nec non ipse oesophagus vicinus in cibis inferiora versus propellendis quidquam impeditus fuit. Quo tempore febris aliorumque symptomatum insecuta est *re-rissio*: suppuratio tumoris jam absoluta erat; atque hoc sub statu, quindecim per dies respiratio laboriosa magis ac sonora, interdum sibilans, non rauca, ut simplici ac satis aperto in ulcere, successit. Tunc etiam aegra, magis ac antea, de laryngis angustia, pectorisque supremi oppressione, ab aeris scilicet, infra laryngis tumorem remoram patientis, columna inducta, con-questa est. Ructuum, quibus antehac mulierem hanc subjectam fuisse credimus, nunc *foetidorum*, causam, nisi ex ventriculo symptomatice adfecto ac cibos ingestos vix subigente, foetor ille venerit, in aere, sub transitu super abscessum ac erosas super cartilagine aritenoides, cum corruptis istarum exhalationibus recentius commisto, quaerendam esse putamus. Qui pulmones rodunt abscessus, ii longe non omnes foetorem sensibilem halitibus aegrorum communicant; alii vero odorem putridum, adstantibus intolerabilem, et vel ipsis aegris

(1) Hanc explicationem jam dedit *Morgagni* de casu virginis, cujus larynx a pure in totam obturata fuit. l. c. Ep. XV. n. 14.

molestissimum, imprimis horis matutinis, et post somnos quidquam protractos exhalant. Tubercula pulmonum ulcerosa; maxime antiqua, si, plurima, amplam satis istius visceris superficiem occupaverint, vel ubi, *sinuosa*, pus collectum diutius retinuerint, vel partem cartilagineam bronchiorum sibi vicinam simul in tabum infestum commutaverint; hos effectus maxime producant. Quae vero laryngem, aut tracheam, potissime superiorem, cum ardore ad fixum illorum locum constante, occupant, ulcera: ea, utpote rimae laryngis viciniora, mephitim, quasi minus ab aere dilatam, ac prorsus cadaverosam expirant. Alvura in aegra, quae parum cibi potusque assumpsit, fuisse constipatam, minime mirabimur. Cordis autem palpitationes, vel sola respirationis, vel circuli sanguinis per pulmones impedimenta, ut in ipsa pneumonia frequentissime observavimus, producant. Erecta cervice in acutis respirari certe malum; sed in laryngis ac tracheae morbis, imprimis ubi vox simul acutior et sonora, clangosa editur, nisi sputa copiosa, purulenta sequantur, promptissimo eventu lethale est. » Pessima eorum significatio, cum glutiant, vocem quasi strangulati (1). »

(1) *Plinius*, Hist. nat. n. X. Sect. 5.

CYNANCHE LARYNGEA, CUM BRONCHIORUM
HYDROPE ACUTO.

Mense decembris 1787 virum juvenem ictericum, et aureo plane colore instructum, in clinicum Institutum *Ticinense* suscepimus. Febris autem hunc icterum comitata est, et rebellis hic per tres fere hebdomadas restiterat, dum simul, praevio exanthemate, quod scarlatinam miliformem fuisse suspicamur, et quod jam disparuerat, de faucium dolore conqueri aeger inciperet. Faucibus inspectis, videbantur eae hinc inde quasi ulceribus obsessae. Deglutitio erat valde laboriosa; non tamen difficulter respirabat. Post tres dies aeger clinicum Institutum motu proprio deseruit, necdum a morbo liberatus. Post triginta horas, sub tempestate frigida et pluviosa, iterum ad nos defertur, sed cum summa difficultate respirans, cum voce rauca, nec tamen sonum metallicum edente. Deglutitio erat valde impedita; inquietudo, anxietas tanta, ut quaestionibus propositis vix satisfaceret. Liquida pro potu assumpta, per nares redibant. Pulsus erant pleniussculi, duri; facies ex flavo rubra, et a pristino habitu mutata. Venam tunc secuimus, et emplastrum vesicans laryngi adposuimus. Sanguis emissus tenax mox corium nobis obtulit cum lymphâ profunde flavâ, ut linteam eidem immersum tingente. Sequenti die, quae erat *quinta* cynanchis, extinctus est aeger.

SECTIO CADAVERIS.

Quid ratione *icteri* observaverimus , alio loco, quo de hoc morbo sermo nobis erit, referemus; sed in thorace , uterque pulmo, ut in strangulatus solet , infarctus erat et lividus, cum sero cruento in sinistro pectoris cavo , et amurca cruenta pulmonem hujus antri obtegente. Pleura , cum tamen de nullo unquam dolore conquestus esset aeger, vel maxime inflammata reperiebatur. Pulmone hoc e thorace excisso, simulque bronchiali ramo majore cum eo resecto, magno cum impetu, et magna in copia ex hoc ultimo effluxit liquidum serosum , turbidum , subflavum, cui pelliculae exiguae albescentes , hinc a bile non tinctae , supernatabant. Sex vero circiter unciae et ultra hujus liquidi in cavum thoracis ex discisso ramo bronchiali effluxerunt. Tracheam nunc per omnem longitudinem aperuimus, cum ipsa larynge per medium sui dissecta. Illa quidem ubique rubebat admodum; laryngis vero superficies interna , a lymphâ coacta , puriformi oblecta fuit : qua demum abstersa , nulla huic subfuit exulceratio; sed rubra et tumida erant singula. Epiglottis , crassior longe, ad linguam erat retracta. Eadem puriformis materia universum faucium cavum obducebat. Uvula crassa et longior. Palatum simili modo ipsaque linguae radix adfecta erant.

Est haec observatio ea, cujus breviter meminimus in *Epitomes* libro II. §. 173 p. 106 ubi, de *cynanche laryngea* disserentes, monuimus: « sub ista aliquando seri puriformis magnam copiam per tracheae ramos in pulmonem depluere, eosdem replere, — et magnam in vivente aegro dyspnoeae ac peripneumoniae symptomatum partem habere. « Manifestum est copiosam illam in bronchiis unius lobi pulmonalis effusam materiam seroso-puriformem, suffocationem aegri auxisse. Nec certe, cum tot cadavera mortuorum ex peripneumonia hominum, quorum tamen bronchia undique erant inflammata, dissecuerimus, nobis unquam tanta liquidi puriformis copia, cum tanto impetu, ex dissectis bronchiorum ramis cujuscunque diametri, obviam venit (1). Membrana nulla laryngis

(1) Obvenit vero paucis abhinc annis Auditori nostro D. *Loefler*, in venditore rerum ad ornatum vel cultum elegantiores spectantium, *Vindobonensi*, ex tracheae ac bronchiorum inflammatione promptissime defuncto. In utroque cavo thoracis continebantur aquae circiter librae octo. Ad pulmonem dextrum inflammationis superficialis vestigia comparebant, qua parte lobus ejus superior cum pleura cohaerebat. Pulmo sinister videbatur sanissimus. Ex trachea dissecta, sex vel octo unciae humoris rubelli, spumosi, qualem aeger ante mortem tussiendo rejecerat, effluebant. Tunica tracheae interna inflammata erat, non tamen vasculis depicta, sed ruborem inflammatae intus arteriae prae se ferebat. Inflammatio descripta, ex trachea, per omnes bronchiorum ramos, quotquot adperie-

faciem internam obducebat ; sed facile fuisset illam parari, si major morbi longitudo fuisset. Membranulae illae, et quasi carunculae, sese, probabili ratione, a larynge separaverant. Cynanches vero tunc *Ticini* nulae regnabant, et inexpectato hic morbus aegrum, triginta circiter annorum virum, jam antehac ictericum, invaserat. Vix dubium nobis haeret, scarlatinae sobolem fuisse hanc cynanchem, etsi aeger non nisi de papulis in cute rubris, non prurientibus ac citius dispersis, locutus fuerit. Jam celebri *Cremonae* medicus, *Martinus Ghisi*, (quem, nobis amicum, insignem certe virum, jam octogenarium, A. 1794 nobis ereptum fuisse dolumus) epidemiam cynanchis laryngeae, *Cremonae* A. 1747, et 1748 regnantem, describens (1), monuit; dissectis mortuorum ex hoc morbo bronchiis quamplurimum humoris turbidi et albescentis ex iisdem effluxisse. Simili ratione celeb. *Chambon*, ac *Fourcroy*, in cadaveribus hominum hoc a morbo enectorum, materiam puriformem in ultimis bronchiorum ramis, atque in vesiculis

bantur, proserpebat; et compressis utrisque pulmonibus, humor ille spumosis copiose ex illis asurgebat. Nulla aut cordis, aut vasorum majorum, aut viscerum abdominis vitia in conspectum veniebant.

(1) Lettere mediche. Cremona 1749. Longe prior hic Scriptor est *Homio*, qui suum de cynanche polyposa tractatum non ante annum 1764 edidit.

pulmonum (!) detexerunt (1). Eandem observationem *Mahonius*, in duobus infantibus, instituit (2). In casu nostro, inflammatio faucium manifeste cum illa laryngis et tracheae, quod rarius in cynanche laryngea contingit, incessit. Cum, antequam aeger ex clinico Instituto ad suos esset reversus, de nulla dyspnoea, de magno vero deglutitionis obstaculo, conquestus est; adparet hinc, illius statum a frigore humidaque tempestate sub morbo jam tam gravi susceptis, in ipsius demum laryngis et tracheae inflammationem lethalem degenerasse; nullis tamen cynanchis ulcerosae vel gangraenosae *Fothergillii* vestigiis ad fauces, tum a morbi principio, tum a morte comparentibus. In icterico homine venam non lubenter aperuimus; pulsum interim plenitudo aliqua cum duritie, aetas juvenilis, et constitutio antehac vegeta, nec non inflammationis ad asperam arteriam haerentis symptomata, ne hoc auxilium omitteremus, nos indaxit. Pleurae inflammationem absque ullo ad hanc partem dolore hoc in aegro latuisse, hoc mirum quidem, sed minime inauditum est (Epitom. lib. II. §. 187).

CYNANCHE LARYNGEA CUM ULCERE ET CARIE.

Conradus Krudalewicz famulus *Vilnensis*, 49 circiter annos numerans, robusta corpo-

(1) Mémoires de la Société R. de médecine, Vol. II. p. 206. sq.

(2) L. c. Vol. IV. p. 81.

ris compage donatus, devictis variolis et morbillis, praeter epistaxin non raram, quae jam ante duos annos cessavit, semper sanus, baccho vires sustentans, vixit. Ante quadriennium, dolore pungente pectoris cum tussicula febreque laborans, nosocomium fratrum misericordiae adiiit, ubi venaesectione aliisque remediis sursum deorsumque evacuantibus post sex hebdomadas sanitatem obtinuit.

Anno 1805, mense februario, die quadam ante bachanalia, dolor stringens laryngis, de die in diem auctus, cum voce rauca, dyspnoea, deglutitionis difficultate, tussi, et abundante muci, sub ista, rejectione, continuo aegrum, sine febre, ut refert, vexavit. Cum haec pertinacissime gargarismati domestico, ex infuso salviae et sale prunellae parato, resisterent; die 9^a martii mensis, idem iterum nosodochium aeger adiiit, unde mox ad clinicum Institutum *Vilnense* delatus, ac publico examini submissus, sequentem morbi statum exhibuit.

Caput sensusque omnes plena libertate gaudent, facies sani hominis; ad frontem tamen impetigo herpetica, late expansa, rubra, prominens, in crustas conversa, hinc inde cicatrices post se relinquens, a sex jam mensibus succrevit. Fauces, in quantum videre licuit, nullo modo adfectae. Larynx sub attactu magis dolet, nullus tamen exterius tumor conspicitur. Vox rauca, vel potius aphonia observatur, hinc loquela perdifficilis. Sub inspiratione et expiratione

admodum molestis, aer vibrantem in larynge sonum edit. Tussis frequens, a larynge cum dolore ortum ducens, sub qua ingens mucī spumosi, fluidissimi copia, ad duas cum dimidia libras nycthemeri spatio ascendens, rejicitur. Deglutitio impedita, appetitus ciborum imminutus. Nulla circa pectus, vel abdomen incommoda notantur; alvus aperta, cutis mollis, calor et pulsus sani hominis.

Cataplasma emolliens loco dolenti, prius cum linimento volatili inuncto, imponitur.

Ad vespervas, levis febris, cum pulsu et calore aucto observatur. Sitis accusatur, ac sudor vaporosus per omne corpus sub nocte insequitur. Vapores ex decocto althaeae, ope spongiae ori admotae, frequentius inspirari jubentur.

Die 10^a Febris imminuta, cutis minus humida, alvus a biduo non soluta est. Seposito linimento volatili, cum unguento mercuriali, ad magnitudinem nucis avellanae, laryngis regio quotidie semel inungi jubetur; mane vero ac vespere, calomelas grana duo, cum magnesiae muriae viginti granis porrigenda, praescribuntur.

Ad vespervas aeger cynanchis symptomata quidquam imminui asserit; in pulsu tamen irritatio, sputorum vero eadem quantitas est et conditio. Melior tamen somnus subintrat, ac alvus bis solvitur.

Die 11^a Dolor laryngis, tussis et copia sputorum minores sunt. Respiratio, deglutitio absolvuntur facilius, pulsus interim fre-

quentiores sunt. Vesicans emplastrum ad cutis ruborem, laryngi imponitur. Frictio mercurialis circa vesicatorii plagam instituitur. Nox sequitur, ob summum capitis et laryngis dolorem, inquietissima. Respiratio magis sonora et difficilior fuit. Tussis frequentior, anima vero foetens est. Quantitas sputorum eadem, sed ea, quae per noctem conservantur, materiam purulentam, copiosam manifestant. Urina, *die 12^a* rubra, et sedimento lateritio instructa est.

Die 13^a Noctem aeger insomnem transegit; dolor capitis et laryngis idem, sed respiratio difficilior est, et anima magis foetet. Tussis continua, aegrum fere suffocat. Sputa copiosa, cum abundante materia purulenta; pulsus contracti, febriles. De inferioris maxillae dolore aegrotus conqueritur. Gingivae tamen non rubent. Calomelas nunc suspenditur, continuantur vapores et unctio.

Nocte non dormivit. Dolor capitis et laryngis quidquam imminutus, tussis non tam frequens fuit.

Die 14^a Muci quantitas imminuta, purulentae vero materiae in sputis copia major fuit. Respiratio, deglutitio faciliores sunt. Continuantur pulveres ex calomela, vapores et unctio; vesicans emplastrum nuchae adponitur.

Die 15^a Nocte melius dormivit; sed foetor animae intolerabilis, debilitas major est.

Corticis peruviani decoctum cum infuso calami aromatici praescribitur.

Ad vespervas , symptomata mitiora sunt ,
facilius aeger respirat ac deglutit. Dolor ca-
pitis et laryngis, nisi sub tussi , nullus.

Die 16^a Elapsa nocte , sputa sub somno
in larynge collecta , condensata , aegrum ,
cum aucto laryngis et capitis dolore , evigi-
lant , ac tantum suffocationis metum aegro
incutiunt , ut per mediam fere horam spiri-
tum ducere vix potuerit. Anxius hinc et de-
bilis , copiose miser sudavit. Tandem adpli-
cito laryngi cataplasmate ac inspiratis iterum
vaporibus , sputa cum levamine symptoma-
tum cum tussi rejecta fuerunt. Pulsus de-
biles, frequentes sunt ; urina rubra , sedi-
mentum lateritium deponit.

Die 17^a Dolor capitis, maxillae inferio-
ris , laryngis , magis urget. Gravior quo-
que et respirationis et deglutitionis difficul-
tas est. Foetor aeris expirati major ; tussis
tamen rarior , et sputorum copia indies im-
minuitur. Pulsus frequens debilisque . Pau-
culum aceti, decocto, ex quo vapores aeger
inspirat , superadditur.

Die 18^a Singula , ut heri , continuant ;
facies tamen magis cachectica , oris labia li-
vescunt. Ob dolorem ad gingivas et maxil-
lam , calomelas , cujus grana viginti hucus-
que adhibita fuerant , suspenditur.

Die 19^a Omnia eodem modo procedunt.
Foniculus in regione laryngis , vesicatorii
ope , excitatur.

Die 20^a Idem rerum status est , deglu-
titio facilius absolvitur.

Die 21^a Meliorem aeger noctem transegit,

dolor laryngis imminutus, respiratio minus molesta, sed sonora est. Anima foetere continuat. Tussis rarior, et sputa minore copia, cum materia purulenta, frustulisque membranaceis supernatantibus, rejecta esse videmus. Deglutitio faciliior, capitis dolor idem, ille vero maxillae inferioris cessavit. Labia, cum facie magis cachectica, livescunt magis, corpus emaciatum, pulsus frequens est.

Die 22^a Nihil in aegro mutatum est. Decocto corticis, loco infusi calami aromatici, elixir acidum *Halleri* superadditur.

Die 23^a Nocte, dolor capitis et laryngis, cum tussi suffocativa, auctus, somnum omnem exclusit. Sputa purulenta cum frustulis membranaceis copiosis. Respiratio valde sonora, deglutitio difficilior. Pulsus minus frequens magisque elevatus.

Die 24^a Praeter dicta symptomata urgentia, sputorum copia mucosorum hodie aucta. Alvum aeger ter, sat liquidam, deposuit. Seposito cortice, lichenis Islandici decoctum cum lacte propinatur.

Die 25^a Ob summam respirationis difficultatem, ob tussim suffocantem, ob capitis laryngisque auctum dolorem, aeger somnum vix coepit. Alvum liquidam bis deposuit. Sputa iterum copiosa, in fundo purulenta.

Die 26^a Nox inquieta, cynanchis augentur symptomata, tussis longa et quasi suffocans. Sputa copiosa, purulenta, cum sanguine non paucio rejiciuntur, pulsus fre-

quens et debilis, alvus liquida. Ad vesperras, sanguinis per tussim rejecti, copia major est.

Die 27^a Noctem aeger insomnem transegit, summe debilis. Dolor capitis et laryngis continuo crescit. Respiratio sonora et difficillima, tussis longa, fere suffocans. Imminuitur iterum sputorum copia. Foetor animae cadaverosus, aphonia perfecta est. Pulsum augetur debilitas, alvus liquida, quater mota: aspectus aegri tristis, facies pallida, labia livida sunt. Decoctum althaeae cum syrupo diacodii, pro medicina, ac laryngis cum eodem decocto fomentatio praescribitur.

Die 28^a Hora septima matutina, sub longissimo ad tussim nixu, aeger expirat.

SECTIO CADAVERIS.

De unica morbi sede certiores, in laryngem modo ac tracheam sub sectione cadaveris inquisivimus. His igitur apertis, ulcus magnum ad cartilaginem thyreoidaeam circa rimam glottidis, pure condensato, albedo, foetidissimo repletum, comparuit. Superficies hujus cartilaginis interna, corrosa, externa vero integra, sed nigerrima fuit. Cartilago cricoidea, anterieus, a carie in integrum consumata, cartilagines arytenoideae cum epiglottide, intactae repertae fuerunt. Pars haec morbosa, museo patho-

logico, tunc saltem *Vilnae* erecto, commissa fuit (1).

EPICRISIS.

Post ea, quae praecedentis observationis occasione adduximus, pauca nobis de casu praesente dicenda supersunt. Hoc interim primo hic adnotabimus: quod interea ac morbus vix descriptus aegro nostro fatalis fuit, cynanche laryngea, quam *polyposam membranaceam* vocant, *Vilnae* inter infantes (quamplurimis, ob neglecta primis diebus auxilia, exitialis) regnaverit. Adultos inter homines hunc morbum hic occurrisse, ad nostram saltem notitiam non venit. Ex primo quidem aegri, de quo agimus, aspectu, voce rauca, vix non deleta, et gravi frontis impetigine, ne causa syphilitica in vocis organa egisset, dubitavimus. Sed praeter id, quod nulla hujus indolis infectio apud illum praecessisset, ac fauces ipsae, quae certe in venereis ante laryngem mulcari solent, ulcerosae non essent; de praegressa; quam singula symptomata docebant, laryngis inflammatione haesitare non potuimus. Quam promptum vero aegris interitum, angustioris tubi laryngei incendium, nisi manu celerrima deletum, praeparet, edocti; mirabamur utique, hoc idem, quod pau-

(1) Historiam hujus morbi diligentius conscripsit Auditor noster *Franciscus Puczkowski*, medicinae Magister *Vilnensis*.

carum dierum spatio prolem teneram consumere consuevit, per tres jam hebdomadas hoc in viro, prius ac ad nos accederet, tam lente deflagrasse; et novum sic opinioni nostrae argumentum accessit: cynanchem trachealem, laryngeam, infantibus saepe minus ob vias has, acri, per pseudomembranas, occlusas, quam ob convulsionem, vi morbi pusionibus inductas, et ob hydropem bronchiorum acutum, quo sese tam expedite, quam adulti, liberare vix queunt, tam cito esse lethalem. Ac revera, tanta fuit nostro in aegro sputorum tenuium, aquosorum quantitas, ut illa ex bronchiis, in quae per descensum distillaverant, venisse magis, quam in angusta laryngis fistula collecta fuisse, certum sit. His ipsis vero in sputis, *pseudomembranarum*, ante vigesimam et primam martii diem, qua per quatuor jam hebdomadas morbus duraverat, nulla fuerunt vestigia; vel quod sedes incendii prima in laryngis glandulis *mucosis* haeserit; vel quod non omnem laryngis, aut tracheae inflammationem necessario hae membranae polyposae comitentur; aut, si forsitan eae adfuerint, per tussim separari, expelli queant. Cum vero tarde nimis membranarum hoc in aegro rejectio comparuerit, earum frusta magis internae tunicae laryugis partem, quam pseudomembranas noviter formatas, exhibuisse, ex interna cartilaginis thyreoideae erosionem, et ex sputorum tunc insigni corruptione, foetore, concludimus.

Quodsi generatim nulla nos, sub ingressu aegroti ad clinicum, in diagnosi dubia tenuerint; num tamen, post tres septimanas, quibus morbus jam duraverat, resolutioni adhuc locus foret, num vero suppuratio jam successisset, etsi, quod in votis est, id facilius speremus; de hoc tamen, ut ad venaesectionem generalem, vel saltem ad localem vasorum per hirudines depletionem veniremus, non satis certi esse potuimus. Ne vero simul mercurii usum intentatum relinqueremus, sat frequens illius in hepatitide adynamica, suppurationem adeo jamjam experta, virtus nos induxit; quamvis et hoc auxilii genus, ob morbi jam nimis proVectationes, manu minus liberali, quam sub ejus initio fecissemus, adhibuerimus. Nec certe, dum a secunda mox die, qua aeger ad nos accesserat, post pauculam remissionem, jam anima foeteret, ac pus verum in sputis sat copiose subsideret, omissarum nos poenituit hirudinum. Moderatum mercurii usum, quo ulceris maligni progressibus obveniremus, donec mandibulae dolor, tertia jam die, cautos nos redderet, continuavimus; iterumque ad eundem, cum hic dolor minus a remedio venisse videretur, per dies aliquot reversi sumus. Aucta interim cariei, ac devastationis ad laryngem symptomata, mercurio seposito, nos, spe certe nulla instructos, ad corticem nihilominus confugere coegerunt. Respirationis tamen aucta indies difficultas, labiorum livor, sputorum diminutio, sanguinis e larynge profluvium, diar-

rhoea , et hujus usum remedii excluserunt , et victas tandem morbo manus tendere jusserunt.

CYNANCHE FAUCIUM ULCEROSA , IN TRACHEITIDEM CONVERSA.

Periit *Vindobonae* filia quadriennis viri conspicui, quae die 5 augusti mensis 1797 febricitare inceperat ; die 6^a sine febre fuisse dicitur ; die 7^a de tumore externo utraque in parte colli dolente conquesta est , libere tamen deglutiit ; conspexit tunc medicus quasi ulcus in faucibus , quod cancerosum (chancre) appellavit. Die 8^a nulla periculi idea subintravit, atque puella haec neque faucibus inflammata dicebatur , nec ullo cum labore cibos potumque deglutiit. Die 9^a , peaceter omnem opinionem , animam efflavit missella.

Ut mortis hujus improvisae occasio per cadaveris sectionem illustrari voluisset, prae omnibus sane optandum ; eoque magis necessarium fuisset , quod reliquis illustris hujus familiae prolibus simile forsitan fatum imminebat. Posthabito interim tam tristi melioris diagnosis apud alios subsidio , reliquis sibi prolibus mater anxia, mox a morte filiae, pulverem rhabarbari, sine prophylactico sumendam , exhibuit.

Die 12^a mensis ejusdem , ad sexennem puellam, defunctae prolis sororem, accersiti, eandem heri ad noctem absque praegresso horrore incaluisse , omnemque per noctem

febricitasse, experimur. Aliquem ea hodie, in colli parte sinistra, tumorem, non quidem rubrum, sed tamen sub deglutitione dolentem, nobis offert. Cum interim ut biberet aegra jussissemus, potum ea per fauces transmisit, quin doloris signum vel minimum prodidisset. Fauces nihilominus a nobis perlustratae, rubent quidquam ac satis intumescunt. Pulsuum frequentia, sana quidquam major est, calor vero naturalem haud superat. Linimentum volatile tumori inungendum, aquam vero sambuci cum aceto ammoniacali pro usu interno praescribimus.

Versus noctem aegra placide se habuit, de fame conquesta, ac somno gavisa est.

Die 13^a mane. Tumor ad jugulum auctus, tres circiter glandulas lymphaticas, circa angulum maxillae sinistrum magis tumentes, ab attactu dolentes, non tamen rubras, manifestat. Apertis faucibus ac lingua depressa, utramque tonsillam tumentem, in sinistra maculam subalbam, quasi pure obtectam, fauces levi phlogosi correptas, conspicimus. Absque dolore interim bibit, hilaris est aegra, et de fame conqueritur. Pulsus tamen hesterno frequentior est, ac debilis. Respiratio libera, nec tussis ulla se prodit. Praeter hesternae remedia, aquam sambuci cum syrupo mororum, et pauxillo acidi muriatici, quibus fauces blande ac frequentius obliniatur, praescribimus.

Versus tertiam pomeridianam augetur, absque praegresso horrore, febris. Modo genua et crura dolere asseruntur. Calor

autem sensim ita augetur, et versus noctem et magnus esset ac urens digitos, cum pulsu celere ac satis inaequali. Somnolenta nunc est aegra, respiratio non est difficilis. Etsi vero fauces magis nunc tumere, ac adeo livescere videantur, macula etiam ad tonsillam albescens oculis se offerat; de nullo tamen sub deglutitione dolore aegra conqueritur, tumorque ad jugulum minor est. Cataplasma huic anodynum imponitur; cum vero faucibus quidquam retinere easque fovere recuset aegra, syrupum mororum, cum acido sulphurico ad gratam aciditatem remistum, frequentius lambendum ei offerimus. Infusum quoque radicis serpentariae virginianae, cum corticis peruviani extracto, et syrupo corticis ejusdem, praescribitur. Plantis pedum sinapisini admoventur.

Die 14^a Soporosa jacuit aegra per noctem, et sudavit. Calor hodie longe minor, pulsus minus febriles sunt. Fauces ac utraque amygdala tument, profunde rubent, ac sinistram ad tonsillam quasi ulcus albescens haerere observatus. Tumor externus in sinistra parte maxillae minor; sed similis hodie tumor ad angulum dextrum maxillae, infra aurem, ad glandulas lymphaticas succrevit, quin tamen ullus rubor externus compareret. A compressionem tumorum dolor excitatur. Quater aegra hoc mane, quoties medicinam assumpsit, ex nausea, ut videtur, vomitum est passa. Alvum deposuit; ac satis placide tempus ludendo terit.

Continuatur syrupus cum acido sulphuri-

co. Praescribitur decoctum chinae cum aquae cinnamomi vinosae et syrupi corticis peruviani portione. Sic et clyster ex eodem cortice paratus, cui camphorae grana decem miscerantur, bis in die injiciendus, insimul vero duo sinapismi replicandi suadentur.

Ad noctem, pauca exacerbatio. Nec deliria hucusque, nec tendinum subsultus, nec ad cutem exanthema comparuerunt.

Die 15^a Quietam omnino noctem transigit aegra, alvumque ter deposuit pultaceam. Ludentem illam ac hilarem reperimus. Pulsus minus frequentes satisque elevati sunt. Calor sano similis. Faucium tumor minor, utraque tamen in tonsilla macula haeret ex albo flavidiuscula, suppurationem mentiens. Fames hesternae minor.

Die 16^a Dormivit hac nocte, non vero sudavit; tussitat subinde. Pulsus a naturali parum abludit. Respiratio, deglutitio sunt liberae. Fauces minus tument. Tonsillarum maculae in conspectum non veniunt. Tumor externus adhuc aliquis, ab attactu parum dolens. Sub die tussit hinc inde aegra, et sub tussi, de dolore, non ad fauces, sed ad sternum conqueritur. Ad noctem aliquod febris augmentum observatur.

Die 17^a Febris remittit. Tussis rara, sed cum pectoris dolore incedit, respiratione tamen libera. Fauces minus turgidae, minusque rubrae, maculae ad tonsillas nullae. Continuantur praescripta.

Notari meretur, hac ipsa die et coquam

hujus familiae a cynanche, cum typho incedente, fuisse correptam.

Ad noctem, minor in aegra nostra, quam heri, exacerbatio.

Die 18^a Febris pauca, tussis aliqua cum dolore thoracis. Ludit et hilaris est puella.

Die 19^a Tota nocte dormivit aegra, hodie mane, praeter tussim, dolorem ad pectus et aliquem a pressione ad angulos maxillae, de nihilo conqueritur.

Die 20^a Eodem tramite res continuat. Lectulum aegra per horas aliquot deserit.

Die 21^a Eadem, ad horas matutinas, rerum est positio. Ad vesperras autem febrem reperimus violentam, tussim stridulam, sub qua in ipsa trachea et faucibus aegra dolorem caloremque accusat. Potum tepidum, vesicans ad nucham, interne vero radicis Polygalae Senekae decoctum, cum paucis granis camphorae solutae, consilimus.

Die 22^a Nox inquieta, tussis frequens fuit. Sudor nunc aliquis. Tussis frequens cum strepitu ad fauces, et stridula. Sputa interim rejiciuntur sat multa, subrubra, respiratione non laesa. Pulsus sunt exigui. Laeti interim animi est parvula, lusibus suis intenta, cibosque adpetens.

Ad vesperras, pulsus sunt exiles filiformes, moderate tamen frequentes. Facies pallescit. Alvum aegra, primum pultaceam, postea liquidam excrevit.

Nox sequitur valde inquieta: tussis fere

continua, cum dolore ad asperam arteriam, cum suffocationis sensu, et cum vomitu bis repetito. Calor corporis major.

Die 23^a Febris calorque moderate satis incedunt; sed tam atrox, nobis praesentibus, tussis est, ut anima in faucibus haerere videretur. Sputa pauca sunt. Linimentum volatile cum camphora tracheae illiniri, ac vesicans nuchae adponi jubemus. Serpentariae radice infusum et clysteres ex camphora repetimus.

Ad vespertas minor est febris exacerbatio.

Die 24^a Mitius incedunt symptomata: febris minor, respiratio libera. Vox interim penitus suppressa est, tussis adhuc frequens, ac dolor sub ea circa tracheam accusatur.

Diebus 25^a et 26^a Nulla in pejus mutatio, febris pauca, calor fere naturalis fuit. Raucitas cum tussi continuat.

Diebus 27^a et 28^a Febris fere nulla, vox clarior; redit somnus, ciborum viget desiderium. Ultima hac die fili sanguinis aliquot cum muco per tussim rejiciuntur. Mox ab hinc tracheae dolor major accusatur, brevi tamen tempore sopiendus.

Sic sensim sensimque, non sine phthiseos timore, morbus disparuit. Redibat enim hinc inde thoracis dolor; tussis aderat cum sputis admodum copiosis, mucosis, flavescentibus; vox necdum sonora fuit, sudores hinc inde nocturni fluebant; pulsus semper quidquam, imprimis circa vespertas, frequentiores erant, facie interea pallida atque tu-

midula. Corticis peruviani et lichenis islandici decoctum cum lacte praescribimus. Sub finem septembris, morbo jam in melius vergente, levis quidem, sed pruriens admodum *urticaria* in cutis superficie comparuit, et sanitas pristina restituta fuit.

EPICRISIS.

Nisi funus sororis, eodem malo correptae, praeter medici parentumque opinionem praecessisset; tanti quidem ponderis puellae nostrae morbus, cujus hic descriptionem extensam traderemus, non esset. Habuit tamen et iste, quae medicorum attentionem sibi asciscant, non communia phaenomena. Sororem aegrae, quinta morbi die alterius medici sub cura defunctam, ex *cynanche ulcerosa*, vel *gangraenosa*, quam in *Epitomes* L. III. §. 296 descripsimus, periisse, dubium nobis superesse non potuit. Cum vero *scarlatina* nec defunctam infantem, nec aegram nostram tenuerit: patet, nos in eo quondam, quod dictam cynanchen malignam *soli scarlatinae* adscripserimus, I. c. §§. 175. 296, etsi haec quidem causa inter omnes communissima sit, a vero aberrasse. Atque sors iniqua defunctae jam sororis, quam insidiosum cum hoste nobis luctandum foret, vel sola nos jam satis advertit; nec aegrae, dum febris vel quidquam remitteret, hilaritas, nec prona ejus in lusus infantiles dispositio, istius scilicet apud parvulos, vel gravissimis ac lethali-
bus adeo aliquando in morbis bene me-

mores, ad arma, cum fiducia majore quam par est, deponenda nos induxit. Ac primo quidem, morbus sub cynanchis, quam *externam* seu *parotidaeam* vocavimus (Epitomes L. II. §. 174.) larva comparuit; sed macula albescens, ulcerosa, quae, praeter tumores parotidum, cynanchi etiam malignae interdum communes (Epit. L. III. §. 296 p. 81.), modo tertia morbi die in defunctae sororis faucibus comparuerat; ea, nostra in aegra, secundo jam nycthemero tonsillam infecit, et facilem morbi, sub dolorosa symptomatum blandiorum imagine, prout solent malignae incedentis, lethalitatem praedixit. Nec tamen, secundo, dum infidae morbum indolis tractandum suscepimus, eundem semper et ubique eadem cum ferocia incedere, *Swietenii* observatione suffulti, credidimus: qui scilicet speciem cynanchis *ulcerosae* descripsit, quae licet acriter satis partes dolerent, sat facilem nihilominus sanationem admisit (1). Ac revera, in morbo hic descripto, nec deliria, nec tendinum subsultus, nec petechiae, aut alia altioris indaginis symptomata, medentis animum, sola tantum mortis, in altera puella absque signis terrificis insecutae idea commotum, feriebant. Ne tamen unquam cum tanto proditore se quis tutum satis esse credat, aegra nostra exemplo erit: ut quae, cum *decima* morbi die convalescere est visa, ad noctem ejusdem, secundam in febrem, aperte nunc furientem,

(1) Commentar. T. II. §. 311. p. 683.

et *tracheitidis* symptomatibus junctam, relapsa est. Cum ratione hinc alibi jam diximus: » non solam *faucium chynanchen*, sed et *trachealem* non raro cum gangraenosa exulceratione incedere « (*Epitomes* lib. II. §. 175.) Talem nimirum *cynanchen* epidemicam fuisse censendum est, quam *Cortesius* in Sicilia, et *Severinus* Neapoli viderunt (1); ac licet nostra in aegra eousque res non venerit; dolor tamen acutus et ardens in aspera arteria, cum febre violenta, tussi frequente, stridula, cum sputis, altera die, copiosis, subrubris, et cum suffocationis, non tam a pulmonibus, quam a trachea oriundae, sensu, morbi sedem tunc mutatam, ac phlogosin malignam a faucibus hanc aeream ad fistulam principalem, aut gangraenae, aut strangulationis sub discrimine, conversam fuisse, testatur. *Urticariae* levioris exanthema, quod sub fine mensis septembris et morbo principali jam superato accessit, nullam cum isto connexionem habuisse, et ex facili hac in aetate refrigerio venisse videtur.

SCIRRHUS GLANDULAE THYREOIDEAE LETHALIS.

Andraeanna Savini, loci *S. Giorgio-Lumellina*, annorum 58, gracilis quidem corpore, sed sana semper fuit. Circa dimidium septembris a. 1790, sentit haec mulier colli partem anteriorem sibi intumescere, ita ut

(1) *M. A. Secerini*, tractatus de pestilente et praefocante pueros abscessu; Neapoli 1620.

paucos post dies tumor sat notabilis hanc partem occuparet, et faemina de hoc novo sui gutturis, strumoso, ut putabat, ornamento rideret. Vix autem emensum erat trium mensium intervallum, cum examini commissus, tumor adparuit *scirrhosus* glandulae thyreoideae, sinistrorsum ovi gallinaei volumen offerens, complanatus in medio, iterumque dextrorsum, licet minus, assurgens. Durus nempe hic tumor erat, indolens, inaequalis, atque tracheae non minus, quam laryngi firmiter omnino adhaerebat. Dextra imprimis portio compressa, tussim excitabat, qua faemina vexabatur nonnunquam. Cataplasma nunc ex foliis cicutae virosae et malva tepidum admovetur; sed nullum ex eo levamen aegra retulit. Post aliquot hebdomadas, ob suffocationis instantis metum, paucae sanguinis unciae detrahuntur, unde fuit insigniter sublevata. Tumor hic jam summopere increverat, cum die 10 januarii 1791 admodum anxia redditur mulier. Decubitus supinus impossibilis, aegram, ut in lecto, capite retroflexo, sederet, coegit. Respiratio, tum inspirando, tum expirando, sibilosa est. Sudores nunc frigidi viscidique, nunc calidi fluunt. Pulsus lenti sunt, ac debiles. Post sex horas, aegra sibi quasi iterum restituitur, atque erecta, diem mensis undecimum transigit. Vespere a simili orthopnoea invaditur, quae ad mediam noctem denuo lenitur, oborta aliqua cephalalgia cum tussi ac sputis sanguinolentis. Per tres tunc dies quieta man-

sit mulier ; verum die decima quinta , novo ea corripitur insultu. Ab hac die usque ad vigesimam , variae quietis et anxietatis vicissitudines locum habent, sputo tamen non amplius cruento. Diebus 21^a et 22^a , lipothymiae sese manifestant , et sudores frigidi cum suffocationis metu . Die 23^a liberior est respiratio ; ast sequente die , ad meridiem , simili aegra correpta insultu, post paucas horas ea , quasi strangulata , obivit.

SECTIO CADAVERIS.

Integumentis cervicis , musculisque sternomastoideis , sternothyreoideis et sternohyoideis , qui molem sibi subjectam strictius compresserant , incisis , tumor sese elevavit scirrhusus , laryngi , tracheae , ipsique , cum multis propaginibus membranosis , oesophago , circumcirca strictissime adhaerens. Vasa hujus diametrum sibi ordinariam quadruplo superabant. In ipso tracheae tubo , immediate infra primos illius annulos ac sinistrorsum , tumor durus in conspectum venit , magnitudinem fabae mediocris referens , per quem tracheae diameter summopere artabatur . Coeterae partes corporis morborum nihil offerebant.

EPICRISIS.

Has partes vitiosas , insimul cum morbi lethalis historia , nobis , pro museo pathologico *Ticinensi*, in quo eadem expositae fue-

runt, transmisit egregius auditor quondam noster, *Dominicus Majocchi*, M. D. Omnis quidem *struma* successu temporis, aut ab externis injuriis, scirrhosam induere indolem potest; sed *schirri* ad glandulam thyreoideam aliquando nascuntur, qui de struma ne hilum quidem participant. Talis ille, de quo hic agitur, scirrhus fuit, in eo tamen, sua in genesi, a plerisque scirrhis diversus, quod quatuor mensium spatio, ad dictam magnitudinem ac duritiem iucreverit, ac mortem tam cito, sine alio, quam compressionis externae, obturationis vero internae ad tracheam, symptomate, induxerit. Scirrhorum exigua saepe ac tarda sunt principia, illorum vero incrementum in partibus imprimis laxis, praecipue ad ubera, accedente animi apud aegras depressione ac diuturna moestitia celerrimum esse consuevit. Nulla tamen hujus causae apud aegram nostram fit mentio. Quodsi vero *internus*, qui ad tracheam haerebat, tumor non simul subfuisset; tardiores certe hoc malum progressum habuisset, ut quod majoris longe voluminis scirrhus thyreoideam ad glandulam per annos saepe tam lugubres effectus non agnoscat. Asperam arteriam *Soemmeringius* a struma praegrandi penitus compressam, et circellos illius cartilagineos vix non fractos, seu inflexos reperiit (1); quo in casu, haud prorsus raro, major sane ab externis tra-

(1) Baillie Anatomie des krankhaften Baues; S. 49.

cheae angustatio, quam in relato mulieris exemplo, fuit. Cum etiam, sub ampliore ejusmodi tumore, oesophagus plerumque simul compressus sit; mirabimur sane, quod, etsi tumor ille cum isto concreverit, ac sinistrorsum magis luxuriaverit; nulla tamen in deglutiendis esculentis difficultas hic occurrerit. Nec minus mirabimur vasorum diametrum, quae sub lentis partium intumescentiis, plerumque simul augetur, paucorum etiam intervallo mensium non minus quadruplo fuisse adauctam. Ex hac vasorum dilatatione, ad interna forsitan non minus extensa, sub tantis respirationis nixibus, sanguis utique vas unum alterumve deserere, ac in cavum tracheae deflectere potuit; nec aliter, dum a majore strumarum extensione, venae jugulares compressae, quo minus cruorem a capite revehant, arcentur, sanguis ad cerebrum collectus, effusus, morbum apoplecticum inducit. Coeterum, frequenter in glandulis bronchialibus, trachealibus, obstructions, et conspicuae magnitudinis tumores nascuntur, quos venae varicosae superscandunt, et abinde compressae, sanguinem, aut, iniquo minus eventu, in bronchia tracheam, aut cum phthiseos periculo, in ipsam pulmonum substantiam eructant. Saepe nimis hi tumores glandulosi inflammantur, tussim siccam, febrem lentam, maciem, ac tabis pulmonalis ulcerosae lethalia symptomata inducunt (1). Internam tracheae,

(1) *Portal* mém. de l'acad. R. des Sciences. Paris 1780. und *Cours d'Anatomie médicale*.

per duos pollices et ultra coarctatae, substantiam, sana crassiorem, a parvis nodulis occupatam, *Baillieus* (1), — similesque nodulos per tracheam dispersos, *Lieutaudius* (2) recensuerunt.

FEBRIS CONTINUA NERVOSA, PHRICODES
VETERUM.

Victorius Gandini, vir quadragenarius male nutritus, nimisq[ue] laboribus assidue obrutus, plures jam peripneumonias, in clinico Instituto *Ticinensi* feliciter pertractatas, passus, vix ineunte martio 1794, sensum levis horroris percepit, vagis intermisti caloribus. Accedit tussis, coryza, et ponderis, maxime ad sinus frontales, sensatio. Posthinc vero lassitudine corripitur spontanea, tristitia, morositate animi, et artuum gravitate praecipue. Subsequuntur oscitatio continua, suspiria hinc inde, somnolentia, stupiditas, ut, quid sibi velit, vel optet, aeger ignoret; vix ullum ciborum superest desiderium. Nec tamen ideo lectulum petit miser, sed cum morbo luctatur per vias; donec *die* 8^a mensis ejusdem, horror in verum *frigus* commutetur, nec tunc temporis, nec unquam ab ullo calore excipiendum. *Alter* die, nulla prorsus conceditur remissio; continuo crescit virium jactura. Aurium quo-

(1) Anatomie des krankhaften Baues, S. 48.

(2) Hist. anat. med. Lib. I. Obs. 3. Lib. II. Sect. I. Obs. 7.

que superadditur susurrus; lumborum dolores, respiratio difficilis accedunt; alvus pluries per diem, fluida, et inscio aëgro, laxatur. Tandem hic, morbo magis magisque ingravescente, *die 11^a* mensis, ad idem, quod vitam jam pluries servaverat, institutam clinicum deferitur. En, quot hic nobis portendat pericula!

Debilitas universalis, extrema, conspicitur. Facies morbi gravitatem denunciat, ad latera nasi pallescens, subflava; aurium susurrus, oculi mœsti, levis hinc inde obducti, somnolentia notantur. Labia quidquam livescunt; respiratio difficilis, nullus tamen ad thoracem dolor, tussis nulla est. Lingua humida, albescens, exigua oris amarities, alvus duodecies, aëgro inscio, soluta, fluida, viridescens, cum tenesmo ventrisque aliquot terminibus sociata, calor cutis sano certe minor, nec tamen interna valdopere urens, observantur; perpetuae interim ab aëgro, a morbi principio hanc usque in diem, de frigore querelae moventur. Pulsus ad carpum dextrum, nulli, ad sinistrum vero filiformes, exilissimi tanguntur.

Praescribuntur sequentia:

Vini Malacensis unciae novem, capiat tertiam partem omni bihorio.

R. Camphorae mucilagine gummi arab. solutae drachm. i.

Decoct. Cort. peruv. unc. ix.

Extracti Cort. ejusd. unc. semis.

Laud. liquid. Syd. guttas xx.

Syrup. Cort. peruv. unc. i.

Capiat alternatim cum vino vasculum dimidium.

Extremities involvuntur paunis laneis, infuso herbarum aromaticarum vinoso imbutis.

Vespere, stupiditas, somnolentia continuant, subdelirat aeger interdum; frigus eum divexat continuum. Medicinam cum vomitu rejicit; diarrhoea pergit. Sibi ipsi quidem aeger, se melius habere persuadet; virium interim jactura de hora in horam augetur; animam ore hiantē ducit; subsiliunt tendines hinc inde; pulsus pariter nullo modo persentiri queunt.

Ponuntur vesicantia; vinum Malacense, fomentationes aromaticae continuantur; aether sulphuricus cum aqua cinnamomi, laudano liquido saepius porrigitur.

Nocte interim sequente, fluxu alvi adaucto, medicina per vomitum rejecta, deliria crescunt, ac finis vitae miserae imponitur (1).

EPICRISIS.

Acutissimus hic morbus, *continuis* quidem febribus, quas *nervosas* appellavimus (*Epit. L. I. § 87.*), adnumerandus, cum ea tamen *intermittentium perniciosarum*, quas *algidas* dicimus, aut quas Veteres *phricodes* vocabant, symptomatum ratione, affinis est. In *algida*

(1) Adstitit aegro, ac historiam conscripsit *Angelus Ballardus*.

nempe febre, » omnis adfectio in *rigore* consistit: ita ut nec pulsus elevetur, nec calor invadat, atque ubi post aliquot etiam horas aeger adhucdum in paroxysmi principio haerere videtur; ubi sitis summa, anxietas, suspiria, et facies cadaverosa advertuntur. « Sic etiam in Veterum *phricode*, « vel primo paroxysmo aeger mortem subibat; vel post sat longum tempus paululum iterum incallescibat, pulsus parum elevabatur, quin tamen multo frequentior evaderet; quam in sanitate esse consueverat. Oppressus adhuc aliquomodo, et calor moderatus videbatur, lingua quidquam aspera erat, urina copiosa, tenuis, aquosa, vel parca et obscura. Credebatur aeger jam in apyrexia constitutus; moriebatur tamen, ubi symptomata fuerant vehementia, jam saepe sub secundo paroxysmo. « Sic anno 1770 ad civem *Rastadiensem* accersiti fuimus, qui, aetate quinquaginta circiter annorum, corpore firmus ac satis crassus, vel optima semper valetudine gavisus erat. Hunc, praeter causas sibi cognitae, de nocte frigus summum invadit, quod nec fons calidi, nec juscule fervida per horas moderari queunt. Hora decima matutina, aegrum conspiciamus, marmoreo prorsus frigore prehensum, summe anxium, inquietum. Oculi fuerunt moesti, facies mutata et sibi dissimilis, pulsus filiformes, vix tactu percipiendi, lingua interim madida, pura, amaror oris nullus, nullus aut vomitus aut vomendi conatus, addomen molle ac indolens. Vitalis potissimum indicationis ra-

tionem habentes, volatilia, liquorem cornu cervi, tincturam castorei cum infusis diapnoicis, frictiones cum pannis laneis calefactis, fomenta aromatica praescribimus. Seniorum consilium medicorum expetimus. Conspirant istorum cum nostris conamina; ast aeger, quin ullus unquam calor accessisset, eo ipso sub frigore, quatuor circiter post horas, ac primo igitur nycthemero, extinctus fuit.

Morbus vero, cujus occasione haec referimus; catharrhalia primum symptomata, coryzam, tussim, horrores caloribus intermistos, artuum lassitudinem, per sex circiter dies, antequam frigus illud magnum, per quatuor dies et ad mortem usque, sine quavis intermissione, extensum, accederet, offerebat; nec alvi illud profluvium aquosum, tenue ac viridescens, alienam a catharrho intestinorum indolem agnovisse videbatur. Atque haec nobis *febris catarrhalis malignae* ideam revocant, cujus imaginem varii, sub aevi elapsi principio, Scriptores, diversis interim coloribus, depingunt. Quodsi suspicio multorum de latente hic contagio, cadaveris sectionem admisisset; colluviei forsitan seroso-lymphaticae (ut ex prima ponderis ad sinus frontales sensatione, ex tardioribus sphincteris ani resolutione, somnolentia, stupore, delirio, vomitu, conjicimus) super ipso cerebro, cerebello, collectio, tam lethalium symptomatum nobis rationem reddidisset.

Presbyter septuagenarius *Genuensis*, gulae vitiis perdeditus, succiplenus, alvi constipationibus frequenter subjectus, anno 1788 de ventriculi incommodis conquestus, singultu imprimis hinc inde, quin id eundem vel auram liberiores petere, vel sua munia per urbem obire impediret, vexatur. Praeter ista, tumor circumscriptus cum tensione regionem hypogastricam, sub anni 1786 principio occupavit. A febre aeger, etsi venam illi secuerint, alvumque pluries purgaverint, quadraginta per dies extensa corripitur. Post istam, pristina redeunt circa ventriculum symptomata, et in usu evacuantium persistitur. Mense octobris ejusdem anni, febris nova, tertianae quasi typum observans, accedit. Explorato abdomine, praeter dictum in hypogastrio tumorem, duobus digitis supra umbilicum hernia ventralis detegitur. Pulsus non febriles quidem, sed debiles sunt. Singultus interdum augetur. Urinam aeger frequentius deponit; sub ejusdem vero excretionem, ardor ac difficultas se produnt. Lottum sat multum bonique coloris est. Cum interim vesica ipsa tumoris in hypogastrio causa esse videretur catheter huic nihilominus immixtas, et hujus ope sex circiter urinae turbidissimae ac foetentis librae extractae fuerunt. Hoc praestito, aeger sese sublevatum esse refert. Enema nunc praescriptum fuit, quod cum post horas aliquot

per alvum evacualet, convulsus aeger animam simul reddidit.

SECTIO CADAVERIS.

Aperto cadavere, ventriculus cum duodeno intestino inflammatus comparuit. Tam in illo, quam ad istud, tunica villosa deficere videbatur. Hernia ventralis ab omento ac intestino jejunum, cujus ultimi portio simul inflammata est, formabatur. Cum vero in cadavere, ante sectionem, duae herniae inguinales, de quibus mentionem aeger nunquam injecerat, in conspectum venissent; pars quoque ilei intestini inflammationis vestigia exhibuit. Ast vero maxima degeneratio in *vesica* reperta fuit. Duritiem nempe haec magnam subiverat; glandula vero prostatica fuit praetumida. Externa vesicae facies valde inflammata, interna vero, tunicis sic dictis tum villosa, tum nervosa destituta videbantur. Tunica hujus visceris musculosa, crassitie multum aucta fuit; ad partem internam fibrarum muscularium fasciculi valde distincti, sed suam ob albedinem, quasi tendinosi comparebant. Diver-sae fibrarum harum intersectiones, secundum varias earundem directiones ab anatomicis descriptas, aperte hic intuentium in oculos cadebant, et loca intermedia seu lemnisci (*maglia*, *Masche*), qui in statu valetudinis a textu celluloso occupantur atque replentur, erant vacui. Interna vero superficies vesicae, internae ventriculorum cordis

superficie perfectè fuit similis, ac talis, qualis jam a *Valsalva* descripta fuit (1).

EPICRISIS.

Historiam hujus morbi ac sectionis pathologicae, amicus *Burserii* et noster, cujus memoriam pie semper venerabimur, *Josephus Pratolongo*, Anatomiae tunc publicus professor, et expertissimus *Genuensium* medicus, die 5 decembris 1789 nobiscum communicavit. « Singulare non minus ac verissimum, est, scribebat, quod non obstante tanta partium degeneratione, quae omnino paucorum dierum opus esse haud potuit, aeger nihilominus, et plateis publicis interesse, ac cibis, more sibi solito, quamplurimum indulgere continuans, lectulo tamen, nisi ab ultima febre, septimo jam die funesta, adfixus non fuerit. « — Sed plura, quae adnotari merentur, hic nobis se offerunt. Nec enim febris ultima, typum quasi tertianae observans, tam vehemens fuit, quin pulsus, etsi debiles, frequentiam febrilem proderent; nec, si ad inflammationem tum ventriculi, tum intestinorum duodeni ac jejuni praesentem respicias, ullum istius signum, ut vomitus, dolor, pulsus contracti, duri, frequentes, praegressum est. Ad singultum quod pertinet, illum diu ac ab anno jam fere continuum, intestinorum huic incendio utique

(1) Apud *Morgagni*, de Sed. et caus. morbor. Ep. XL. n. 4. Ep. XL. n. 33.

vix attribuas; vel, si attribuere contenderis, fac ut originis diversae symptoma aliquod, dum aeger hunc solum accusaret, nobis manifestas! Nec in alvi obstructione quid est, quod huic presbytero voraci a multis retro annis proprium non fuerit. Dein, a *tribus* illis *herniis*, uni homini, quod rarum est, molestis, tum singultus ille, tum alvus tardior, explicari non minus possent! Cum autem tam ventriculus, quam intestina, saepius a morte (maxime dum sanguinis ex illis, sacco hernioso susceptis, reitus difficilior quidquam, vasorum repletioni diu tantam porrexerit) hic illicve *rubeant*, quin, ante obitum, vera inflammatio hic locum habuerit; — praecipue cum de livore et aucta crassitie horum viscerum, mentio, quae mortem ex *gangraena* illorum descendisse docebit, non facta sit; dubitari adeo licebit, num hocce incendium tam tacitum, num alia longe causa, vitae finem imposuerit? Concedamus vero, — eorum non immemores, quae de *gastritide* (§ 230), ac de *enteritide* (§§. 238. 239. 241.), inculcavimus, quos morbos nempe hinc inde absque ullo, nobis noto, symptomate, lethales fieri, observationes, quas in praelectionibus adduximus, docuerunt, — mortem nostro in presbytero ex dictarum partium incendio eo magis venisse, quod jam simplex inflammatio, absque gangraenae tardioris imperio, vita hominem spoliare queat; non minus igitur mirabimur, tumorem in hypogastrica regione, sine alio vesicae laesae symptomate, quam

singultu, jam antehac consueto, tam diu comparuisse, ut si febrem primam, per 40 dies extensam, excipias, nec dolor ad vesicam, nec lotii suppressio successerint; sed in ultima tantum, unius hebdomadis, febre, mictus frequentior, ardor aliquis ac difficultas sese prodiderint. Quamvis autem, cum his, urina sat multa bonaeque indolis successerit, laudamus tamen magnam experti ac senis medici perspicaciam, ut qui, praesente hypogastrii incognitae naturae tumore, in consilium accersitus, nec ab urinae quantitate, nec ab ejus debito colore, se, quin catheterem vesicae adplicari jusserit, seduci sinivit, atque sex libras *urinae turbidissimae ac foetentis* eduxit. Saepe scilicet cum ejusmodi tumoribus hypogastrii, quamvis urinae sat multae secedant, earum tamen *retentio* simul adest, ac dum, quod ex iisdem clarum abscedit, liquidum effluxit, ad partem vesicae posteriorem ac inferiorem, quae saccum recto intestino incumbentem, saepe sat magnum, et alvi excretioni contrarium, constituit, *faex lotii* turbidissima et foetida stagnat. Sola per intestinum rectum investigatio molliores hos vesicae tumores distinguit. Si tamen ante catheteris introductionem aeger vel paulipser deambulet, vel hinc inde per lectum revolvatur, vel prius, capite ac thorace profundius quidquam positus, in genua et cubitus aliquamdiu procumbat, faex dicta, cum urina clariore intime commista, simul cum ista, turbidior secedet. Coeterum, non tam rarum est, fibras vesicae musculo-

sas , per calculos , aut per morbos alios du-
 dum vexatas, miram quantum mole augeri ;
 ac ut plures in *sexti* voluminis *Epitomes* par-
 te prima, §. 769. ac hoc ipso in opere conser-
 vatae observationes testantur, in trabeculas
 elevari , et in vesicae cavum , sic imminu-
 tum , prominere non modo, sed colorem al-
 bescentem , tendinum illi similem, induere .
 Fateamur interim , mortem aegri jam ultra
 septuaginta annos nati, per morbos non pa-
 rum fracti, ac nullo certe modo diu conservan-
 di, *repentinam*, *inanitioni* potius promptio-
 ri, tum ex sex libris urinae per vesicam, tam
 ex enemate cum faecibus per anum rejectis ,
 inductae adscribendam esse, nobis saltem vide-
 ri. Cum vero *tunicam villosam* hac in vesica
defuisse referatur ; etsi hujus tunicae variis a
 corporis partibus per morbos, ut per cynan-
 chen ex trachea, per dysenteriam ex intesti-
 nis , secessus , tum a veteribus frequenter
 accusetur, tum a *Littrio*, et ipso ab immor-
 tali *Morgagnio* defendatur (1) ; fatemur ite-
 rum , nos, nisi vera superficiei visceralis sup-
 puratio praecesserit, plerisque his in casibus
 non tam *villosam*, quam *pseudo-membranam*,
 seu concretionem polyposam in secedentibus
 his, a parte prius inflammata, pelliculis, cum
Portatio (2) videre. Posse interim inter fibras
 musculares , mole auctas magisque torosas,
 ac in fasciculos insolitos sibi adpressas , te-

(1) De sed. et caus. morb. Ep. XLI. n. 16.

(2) Mém. de l'Acad. R. des Sciences de
 Paris 1780.

lain cellulosam , per quam nervorum vasorumque ramuli decurrunt, compressam, vix non disparere, aut colore rubro, vel stramineo, ut pro musculari, aut tendinosa substantia habeatur, tingi, hoc quidem in dubium vel minime revocabimus.

RETENTIO URINAE URETERICA.

Vir nonagenarius, a multis retro annis calculis renalibus subjectus, viribus collapsis ac pene consumptus, nosodochium *Ticinense* adivit die 7^a mensis septembris 1793. Continuos ille circa lumbos dolores usu lactis ac emulsionum moderare solebat; cum tandem sub nixu ad alvum deponendam diuturno ac vano *delabentis* sibi *ex rene sinistro ponderis*, deinceps vero *acsi quidquam sibi hunc ad locum rumperetur*, sensationem habuit. Ab eo tempore, pene ac testiculo retractis, urinas non aliter, quam cruribus ad ventrem reductis, cum insigni ad mingendum conatu, et cum extremo dolore guttatim exprimere potuit. Dolor, a renis sinistri regione incipiens, antrosum versus insertionem ureteris furiebat, a motu, concussione, inflexione corporis, atrocior. Post septem dies tam misere transactos, tumor circumscriptus attactum praedolore recusans, natus est. Hic tumor, postquam decem per dies continuasset, sub aegri adventu fluctuabat; et a lienis regione umbilicum versus, octo pollices longus, sex vero pollices latus, tendebat. Praeterea cruris sinistri stupor, paresis, vomituritio, moe-

stitia , fletus fere continui, ciborum interim non deleto desiderio , adfuerunt. A biduo , cum nixu licet summo et continuo, urina tamen nulla secesserat . Pulsus erant frequentes exigui , contracti. Nullus circa vesicae regionem tumor erat, nec urinam catheter illi cum labore immissus , detegebat. Ad locum dolentem , cum oleo prius inunctum fomentatio emolliens instituta, et hordei decoctum ordinatum fuit.

Altera die 8^a septembris, quae erat morbi decima nona , dolor inquietudo continuant. Aeger hinc semicupio commissus , post istud vero fomentatio , emulsione pro potu praescripta , continuata ; cum vero ad vespas dolor ad locum tumoris , inquietudo , jactatio aegri urgerent , cataplasma emolliens impositum , et opii solutio aquosa porrecta fuit.

Die 9^a septembris , dolor imminutus, facies collapsa , hypocratica , summa per omne corpus , quod attactum fugiebat , sensibilitas , alvus inscie deposita , singultus, tremus virium languor , tremor manuum , extremitatum frigus adsunt. Post meridiem, praevio dolore ad locum tumoris, ad quem aeger manus continuo ferebat , novo , mox sensus fatiscebant, ac sub levi jactatione , singultu , sensu frigoris , mors optata insecuta est.

Reserato abdomine, in parte sinistra, versus ureteris initium, tumor, nullibi adhaerens, leviter ad superficiem inflammatus, ex ipsius pelvis renalis sinistrae dilatatione inductus, comparuit. Cum vero simul ren sinister, colore magis rubro instructus, et calculum in sua substantia, quasi nucleum, recondens molem quadruplo naturali majorem agnosceret; tumor pelvis anteriora versus ab eodem propulsus fuit. Hic tumor, parva sectione apertus, tres circiter urinae turbidae et acris saporis libras effudit. In fundo hujus sacci depleti, duo calculi non magni, sed duri latebant. Per omnem ureteris sinistri longitudinem plures calculi friabiles, inter quos hic canalis arctius se contraxerat, haerebant. Ren dexter, si pelvim ejus, ad quatuor digitorum latitudinem extensam, rubentem, ac urina repletam, excipias, a statu sano non abfuit; ureter vero ab eo descendens, a sex calculis, non magnis, oppletus fuit. Vesica, in qua lotii nec quidquam repertum est, admodum contracta, parietibus crassioribus, hinc inde prominentibus, instructa, calculis, diversae magnitudinis, partim friabilibus, partim vero duris, repleta fuit.

EPICRISIS.

Praeter communia calculis renalibus eorumque in ureteres descensui (clariora quam

multis in aliis) phaenomena , historia haec , ab auditore nostro *Alexandro Buzzi* , *Ticinensi* , in civitatis hujus nosodochio conscripta , speciem tumoris circumscripti , attractum recusantis , fluctuantis , a lienis regione umbilicum versus protensi , offert , cujus indoles non facile nisi anatomicae disquisitionis beneficio intelligi potuit ; hac vero face praelucente , futuris in casibus intelligetur facilius. Quamvis nempe pelvis renalis non parum dilatatae exempla non sint tam rara ; quamvis hujus dilatationis specimen ipsi huic operi inseruerimus ; et licet renem ipsum , tantum in utrem , ut omne cavum abdominis impleverit , ac proscite imposuerit , viderimus ; raro tamen symptomata nostro in sene obvia , diagnosis tam arduam reddunt. Facile nempe illis , qui ad rationes calculi , vesicae urinis vacuae , ac absentium causarum , symptomatum , quae suppurationes internas , hydroperem saccatum producunt , comitantur , minus attenti fuissent , vel peritonaei , vel lienis abscessus , vel hydrops omenti subesse , videri potuisset ; et ad similem in diagnosi errorem , rara pelvis ac ureteris superni , etsi levis , ad externam superficiem inflammatio non parum contribuere valuisset. Cum vero ad constantem urinae in vesica absentiam , nisi ex universi systematis , vel ipsius organi secernentis vitio ordiatur *utrumque ureterem* impervium esse oporteat (§. 8. Epit. L. VI. P. I. §. 765) ; pauca sane *ischuriae* ut male vocarunt , *renalis* exem-

pla horum ductuum ex culpa, in libris medicorum descripta sunt. In casu praesente, etsi catheter urinam nullam in vesica detexerit, nec ullus circa hanc tumor exstiterit, summus tamen ac perpetuus, scilicet ex calculis in vesica sicca latentibus, ad mingendum nisus fuit; ex quo, non in omni *ischuria*, quam etiam *spuriam* dixerunt, mingendi nisum violentum deesse concludimus. Tantum sensibilitatis per omne corpus augmentum, ut attactum recusaret, paucis ante mortem horis in sene jam descripto successisse, rariora inter agoniae phaenomena ponendum est. Nec minus, observata, sub hoc externae sensibilitatis incremento, doloris ad tumorem interni diminutio; istius vero, priusquam aeger animam efflaret, tam crudelis renovatio, admirationem nostram percellit.

RETENTIO URINAE URETERICA.

Antonius *Aspergalli*, vir 67 annorum, mercatorum *Ticinensium* scriba, biennio frequentius urinae difficultatibus ex calculis, quos miliformes excernere solebat, obnoxius, die 2^a septembris 1793 *sub nixu* ad alyum deponendam fortiori, a violento ad renem sinistrum dolore, ac *sensu partis internae sub illo disruptae*, prehensus fuerat. Mox urinae, si paucas modo guttulas excipimus, quas maximis ac repetitis *sub nixibus* cum insigni ardore expresserat, supprimitur excretio.

Die morbi sexta, 7^a nempe mensis septembris, aeger ad Ticinense nosocomium defertur. Noctem elapsam ille expertus erat insomnem, turbulentissimam. Regio hypogastrica nunc tamen ac dolet. Ructus adsunt frequentes, singultuosi, sitis inexplebilis, facies pallidissima. Alvus interim aperta est. Circa vespertas abdomen, etsi cathetere jam prius vesicae immisso, nihil ille urinae hoc in viscere detexerit, insigniter tensum, ad attactum dolet. Ventris haec tensio aequalis et circumscripta est, ac, supra umbilicum ascendens, diaphragma fere attingit. Semicupio aeger immergitur, et fomenta posthinc emollientia adponuntur abdomini.

Die morbi septima abdominis moles aucta est. Vix aliquot urinae guttulas aeger hac nocte excrevit. Languor, pallor pulsum exilitas sunt maximi; singultus continuat. Post meridiem mors prompta his aerumnis finem imponit.

SECTIO CADAVERIS.

Integumentis abdominis dissectis, intestina insigniter inflata, tumoris antehac in illo reperti rationem reddebant. Renis sinistri, ex atro lividi, moles, illam capitis infantilis vix non adaequabat. Pelvis renalis mirum in modum extensa: ureter hujus lateris ad suam cum vesica connexionem calculis minoribus oppletus erat. Vesica ipsa, parva, contracta, exceptis calculis exiguis,

vacua reperta est. In dextro uretere, cum pelvi renali quidquam dilatato, prope vesicam, calculus pariter haerebat.

EPICRISIS.

Observationem, quam hic tradimus, conscripsit D. *de Antoni*, qui chirurgi adsistentis in clinico Instituto *Ticinensi* vices indefesse implebat. Pelvis renalis morbosa, museo pathologico *Papiensi* commissa fuit.

In praesente retentionis urinae uretericae exemplo, non tanta quidem, ac in eo, quod vix exposuimus, pelvis renalis sinistrae et contigui ureteris dilatatio, — nullus tamen in istis, nisi dum calculus in ureterem descenderet, dolor, sicut nulla inflammatio fuit. Praecessit tamen summum renis ipsius extensio, et gangraenae vestigia relinquens incendium. Utraque vero in historia attendi meretur: descensus calculorum ex pelvi renali in ureteres *sub nixu ad alvum fortiore* occasio, ac *doloris quasi quid ruptum sub eo fuisset*, sensatio. Quamvis autem, hoc in aegro, ren uterque calculos generasset suoque ureteri committeret; calculi tamen renalis, si brevem, sed fortiozem, sub ejus in ureterem descensu, ad renem sinistrum dolorem, et ructus copiosos, singultuosos, excipias, defuerunt consueta aliis symptomata: lumborum diuturni cruciatus, vomitatio, vomitus, colica ut vocant nephritica,

crurum stupor , penis testiculorumque re-
tractio . Cum vero , morbi die sexto , regio
hypogastrica cum dolore intumesceret , ven-
terque omnis praeter modum assurgeret :
licebat utique , sub urinae a quatuor jam
diebus suppressione , vesicae ab illa reple-
tionem conspicuam , utriusque tumoris ut
causam , suspicari . Atqui tamen , nec in-
troducitur , sub primo aegri ad nosocomium
adventu , in vesicam catheter urinam in ista
detexit ; nec post mortem lotium hoc in
viscere , potius parvo et contracto , reper-
tum fuit , ac omnis abdominis hunc fucum
faciens tumor , suos meteorismo ex calculis
symptomatico natales debebat . Quemadmo-
dum vero in priore huic exemplo , sub per-
fecta urinae fluxus in vesicam suspensione ,
nixus tamen ad illam excernendam cum
atroci dolore perrexit : ita et praesente in
casu , iterum ex calculis , et quidem exi-
guis , hoc morbi phenomenon , quod in
renali seu spuria , ut vocitant , ischuria dees-
se dixerunt , ultro continuavit ; et quae ,
Epitomes libro VI. Parte I. §. 765 , do-
cuimus , « nec pectinis scilicet tumorem ,
nec atroces mingendi nixus in *spuria* sic
dicta *ischuria* semper et ubique deesse , »
comprobavit . Coeterum , nullibi ureterum
positionem calculorum , etiam parvorum ,
hujus magis funestam esse , quam quo loco
hi longi canales inter vesicae urinariae mem-
branas oblique decurrunt et ab ipsa stimu-
lati hujus visceris contractione retinentur ,

et hoc exemplo , ultro quam opus esset , evincitur .

RETENTIO URINAE CUM VESICAE GANGRAENA .

Ischuria venerea jam pluries corripuerat Josephum N. annorum quinquaginta virum dum *Laudensi* nosocomio die 24 februarii 1788 receptus fuit . Diri tunc cruciatus in regione hypogastrica , ad pubem praesertim , praecesserant . Tumebat venter , tumida ex lotio retento vesica . Febris aderat cum pulsu parvo , et viribus dejectis . Plures domi venaesectiones institutae fuerant . Nycthemeri intervallum duntaxat ab invasione morbi , quantum scilicet ex aegro colligi potuit , elapsum erat ; et tamen praesentis jam ultro gangraenae instabant symptomata . Dum ope catheteris urinam educere tentaret chirurgus ; resistantiam opponebant magnam collum vesicae , tumensque prostata , quam volumine auctam indurataque sentiebat digitus per anum explorans . Lotium , parca in copia eductum , nigricans est et admodum foetidum . Aeger interea post triduum a morbi principio , viribus prostratis , inter inaequales frigidisque sudores moritur .

SECTIO CADAVERIS.

Penis integumenta , a radice ejus , ad extremam usque glandem , livida , atque a gangraena , ad scrotum usque propagata ,

corrupta erant. Abdomine reserato, dum vesicam a vicinis partibus sejungendi esset animus, ureteres, diametro non parum aucti, utrimque in conspectum veniebant. His, ut vesica una cum urethra ex pelvi extracta, melius pateret, filo injecto rescissis, inter secundum ex vesica nigricans, ex commisto ichore gangraenoso, lotium effluebat. Externum et posteriorem vesicae parietem defoedabant maculae late gangraenosae, dum interim membrana hujus visceris interna eo loci in validos lacertos, quasi plicata, assurgebat. Sphacelus quoque collum vesicae ita devastaverat, ut in tabum quasi membranae diffluerint. Glandula prostata et ipsa infecta, volumine tandem aucta, fistulam urinariam arctabat ita, ut ischuriae inde ratio elucesceret. Urethra quoque per totam ferme ejus longitudinem, praeter modum constricta erat, quin tamen vel ulla prominentia, vel cicatricula in conspectum venirent. Vesica et partibus contiguis per anatomen exploratis, ad ureteres, qui diametro aucti comparuerant, sectio conversa fuit. Utriusque renis pelvis praeter modum dilatata urinaque distenta erat. Ren dexter, evacuato lotio, per ureterem in longum dissectus fuit, ut inde melius, quae dilatationis causa et effectus essent, pateret. Ren sinister, cujus pelvis priore duplo fere amplior erat, integer servatus, et quo auctae capacitatis mensura haberetur, aere inflatus fuit. Ambo renes, urina coloris aquei replebantur.

Ureterum oscula in vesicam hiantia, a la-
certis, in quos, reticulatim plicatos et infle-
xos, intima, posterior tunica adsurgebat,
ita ut lumen eorum valde esset imminutum,
coarctabantur.

EPICRISIS.

Laudensis nosodochii medicus expertus,
Gemellus Villa, M. D. historiam morbi, in
quam hic inquirimus, amice nobis transmisit.
Agitur in ea, de viro, a morbis venereis fre-
quentius mulctato. Quam crebro vero ab istis
tum: prostatae, tum vesicae laesiones multi-
plices, atque tam acutae, quam chronicae,
vel mox a concubitu impuro, vel diutius
ab illo, propullulent, et quam funesti sae-
pe in istis vel ipsius methodi medendi
perversae effectus sint, in diversis *Epito-
mes* locis dilucide satis exposuimus. Interi-
tum aegris promtiores minantur vitia hujus
indolis, quae vias urinae in totum interci-
piunt. Fateamur interim, nobis, sub longo
artis exercitio, nullum unquam aegrum, qui
unius spatio nycthemeri a gangraena vesi-
cae, tertia vero jam die, genitalium exter-
norum etiam gangraena correptus perierit,
obvenisse. Exempla non desunt, ubi a con-
cubitu impuro, post paucas dies, gangrae-
na et sphacelus, sat cito aliquando lethales,
genitalia devastaverint; haec interim minus
ipso hoc a veneno, quam ab incognita cer-
torum hominum constitutione pendere, do-
cet aliorum, qui eodem fere tempore, ex uno

eodemque fonte malum istud hauserunt, sors longe mitior; qua in re contagia diversa, ipsumque virus variolosum, satis, conveniunt. Ex tribus adolescentibus, qui, *Mediolani*, una cum muliere infecta, unius horae intervallo concubuerant, simplici unus medorrhoea urethrali, duo alii vero ulceribus venereis, quae in uno ex istis mox gangraenam cum glandis jactura conceperant, adfecti fuerunt. Sed lippis et tonsoribus nota hic referimus. Diros vero cruciatus ad regionem hypogastricam in aegro nostro praecessisse, vesicam ex lotio retento, ventrem ipsum, sub ejus in nosocomium introitu intumuisse, ac verae sic *cystitidis* symptomata, repetitis a venae sectionibus nec quidquam mitigata, adfuisse percipimus. Hucusque igitur, si celeritatem morbi, ac penis ipsius scrotique gangraenam, sub simplici cystitide nunquam vel a nobis, vel, quod sciamus, ab aliis conspectam, exceperis, res a tramite consueto nihil aberravit. Ad primam quod spectat, dubitari saltem licebit, num aeger, dum nosocomium intraret, a vesicae gangraena jam correptus, ut verum morbi sui principium indicaret, satis sibi conscius dici potuerit? et cum plures sibi domi jam factas venae sectiones ille referret, videntur hae, aut non sub primis morbi horis institutae, aut non tam pauca inter se distantia repetitae fuisse. Quodsi vero hoc factum sit; num liberior cruoris in homine, a morbo contagioso jam diutius detento, detractio gangraenam non promoverit, quaeri posset.

Quidquid vero fuerit interna vesicae hoc in aegro constitutio nostram sibi attentionem, — non tam ob sphacelum, quam ob *validos* ad posteriorem faciem *lacertos*, meretur: quos scilicet lacertos, minus intimae membranae, in plicas assurgenti, quam *fibris* vesica *muscularibus* sub illa, a longa irritatione, mole auctis, attribui vellemus. His nempe a laceratis, reticulatim plicatis et inflexis, ureterum oscula in vesicam hiantia, impedita, et ita ut lumen eorum valde esset imminutum, coarctata fuisse referuntur. Non solis nempe a calculis, sed a repetita saepius, sub gravi medorrhoea et prostatae glandulae incendio, phlogosi, ad vesicam crebro extensa et chronica, hae fibrae musculares stimulantur, molem morbosam assumunt, et vesicam non minus, quam, pro varia sua positione, ipsorum adeo ureterum, in illam hiantium ostia coarctant. Longioris igitur morbi, non paucarum modo dierum, effectus hic dicendus est; a quo scilicet ureterum, lotio in vesicam distillare impedito, et pelvium urinalium, et renum ipsorum dilatatio, non difficulter derivabitur. Cum urethram aegri, per omnem sui longitudinem praeter modum quidem constrictam, sed aliter haud mutatam, hinc neque a gangraena correptam, fuisse legimus; integumentorum penis scrotyque livorem et ut vocatur, grangraenam, strangulationis et largioris ecchymosis quasi specimen magis, quam sphaceli cum interna vesicae gangraena communicantis, effectum fuisse suspicamur.

VESICA URINARIA CORDIS FIGURAM HABITUMQUE
AEMULANS.

Notarius *Papiensis*, anno aetatis suae trigesimo secundo, dysuria laborare, mucum inde una cum urinis excernere, et sensim sensimque calculorum symptomata ad renes, ureteres, et vesicam experiri coepit. Indies mucī quantitas in urinis augebatur adeo, ut urinae foetentis illam duplo superaret. Post septem annos, aeger binos calculos laevigatissimos, pisi magnitudine, sub propriis huic morbo symptomatibus, dimisit; persistentibus tamen aliis, quae de calculi in vesica urinaria praesentia testarentur phoenomenis. Aquam calcis absquo ullo effectu adhibuit.

Cum ad quinquagesimum et nonum annum hic vir pervenisset, sensum languoris, debilitatis, plenitudinis accusavit. Explorato abdomine, tumor circumscriptus, duriusculus, pressioni tamen cedens, pyriformis, sex digitos transversos aequans, ad epigastricam regionem persentitur. Altera die, hic tumor in regione umbilicali, tertia in epicolica dextra, mox vero in sinistra, imo eadem in die, pro diversa aegri positione, et pro cibi diversa ratione, vel a tempore pastus, nunc in hac, nunc in alia abdominis parte locabatur; modo evidentissime comparebat; modo vix, ac ne vix quidem tactu percipi poterat; imo quandoque omni etiam adhibita diligentia detegi nequebat. Pedunculati tumoris suspicio nata est. Ex solis martialibus remediis, praecipue cum sapone, vel cum extracto cicutae junc-

tis, levamen aeger percipere solebat. Tandem post annum et ultra, dum autumnali tempore violentius per colles moveretur, post aliquot ad lumbos, ad abdomen, praecipue vero ad pubis regionem et ad perinaeum dolores, sanguinis sinceri minctum expertus est. Absoluto unico cruoris e vesica profluvio, consuetis symptomatibus vexatus, pulsus aeger offert debiles, intermittentes; naus accedit, et assumptorum vomitus; singultus, tendinum subsultus, febris sequuntur, ac tandem, octavo ab haematuria die, aeger convulsus exstinguitur.

SECTIO CADAVERIS.

Intestina maculis lividis ubique notata sunt. Epiploon, sicut annulo abdominali, ita vesicae fundo adhaeret. Mirò modo hoc urinis dicatum viscus a statu sano aberrat. Color ei ex rubro lividus, figura vero conoidaea, et magnitudine non minus, quam parietum densitate *cordi humano* inverso, cujus apex scilicet inferior, basis vero superior foret, similis est. Longitudinem vesica, sic constituta, sex, — latitudinem vero quatuor pollicum habet. Fibrarum muscularium ordo et numerus ita multiplicati, crassitie tanta sunt, ut densitas parietum ad pollicem cum dimidio aucta compareat, cordisque compaginem omnino referat. Nec in cavo hujus visceris productiones lacertosae, numerosae, quae cordis interna exornant, deficiebant; ita ut, si ventriculorum divisio-

nem excipias, nihil omnino quod non hanc partem nobilissimam simularet, deesset. Cavitas vesicae adeo imminuta erat, ut quatuor modo liquidi uncias contineret. Superficies ejus a muco male olente obducta fuit. Inter colli vesicae lacertulos, calculus subrotundus, niger, laevigatus, exiguus tamen, et modo grana viginti ponderans, haerebat. Alter, ejusdem voluminis et naturae calculus libere per vesicam movebatur. Tertius tandem, castaneae magnitudinis, ad superficiem posterioris vesicae parietis, inter duos carneos et magnos lacertos haerebat, lineis fere quatuor in cavum vesicae prominens, trochleae in modum excavatus, et albus, quo vero loco obtectus degebat, niger atque laevigatus.

Ren uterque, minus tamen dexter, mole auctus et durior. Pelves renales earumque ureteres mucus male olens, quemadmodum vesicam, obducebat.

Lien parvus, in superficie rugosus, coetera vero tam abdominis, quam thoracis viscera sine labe detecta fuerunt.

EPICRISIS.

Acuti ingenii viro Doctori *Dell' u.* medico *Ticinensi*, *Tissoti* et nostro quondam auditori, memorabilis hujus casus descriptionem sollicitam debemus, ac promissam in *Epitomes* L. VI. P. I. §. 769, hic tradimus.

Quam longa interdum mora temporis in-

ter prima calculorum urinalium symptomata, et eorundem vel seccessum, vel praesentiae certitudinem, intercedat; ex *septem annorum* intervallo comparet, quo hic aeger, postquam sensim sensimque calculorum, ad renes, ureteres, et vesicam phoenomena persensisset, ac postquam, praeter urinas foetentes, majorem indies, ac duplam mucii copiam cum illis excrevisset, binos modo calculos, et quidem piso haud majores, ex urethra rejecit. Quamvis autem hi calculi tantum aetatis anno trigesimo fere ac nono, cum aliorum adhuc concretionum in vesica latitantium signis, secesserint; viginti tamen unumque annos aeger utcumque transegit, quin vel maximus ex tribus calculis, post mortem in vesica detectis, magnitudinem castaneae superasset. Ne aquae calcis, ab aegro quondam haustae, et ultra viginti jam annos sepositae, hoc attribuas, tum ipsae vesicae sensus nec quidquam ab ista mitigatus, tum cognita satis hujus remedii interioris abhibiti calculis inutilitas, tum denique calculorum singulorum non modo durities, sed et levitas vetant. Non tam felicem interim apud omnes in calculi augmento lentorem esse, matura puerorum ab illis vexatorum sectio, quae toties vel maximos eorum e vesica calculos eduxit, nimis jam docuit. Quantum interim auctoritatis in calculorum diagnosi foetor ille urinarum specificus, ac mucii tenacis ac plurimi cum istis excretio agnoscat, ex hujus etiam aegri historia elucet. Quid vero tumor ille protei-

formis in abdomine, pressioni cedens, duriusculus tamen, in regionibus nunc epigastrica, nunc umbilicali, nunc in alia, nunc nullibi comparens, significaret, hoc arduum fuit dicere. *Omentum* scilicet, abdominali tum anulo, tum vesicae fundo adhaerens, hos lusus induxit, ac prout intestina, flatibus aut faece turgentia removit, compressit, divisit, atque nunc hoc, nunc alio in loco detinuit, ita quoque tumorem multivagum exploranti digito opposuit. Talem quondam pars haec difficultatem diagnosis in ultimo Marchionum *Bado-Badensium*, cujus nos historiam alibi inseruimus, creavit: ut qui Princeps, dum jejunos esset, erecto quidem corpore incedere valebat; post assumptum vero prandium, aut anteriora versus oblique incurvus incedere, aut de ventriculi molesta tensione conqueri debuit; quod phoenomenon, ut sectio cadaveris nos docuit, epiploon cum testiculo in hernia, per lapsum, ut credebant, inducta, verosimilius tamen congenita, concretum, stomachum a cibis repletum, ne suam curvaturam majorem elevarret, impedivit.

Quae causa haematuriam hoc in aegro excitaverit, nisi a calculo, inter duos carneos et magnos vesicae densioris, contractae, ac sanguinis per sua vasa distributioni contrariae, lacertos haerente laesio quaedam contigerit, ex sectionis historia saltem non liquet. Non pauca quidem vesicae humanae praecipue post calculos, lacertosae, ac fibris muscularibus mole multum auctis instructae

exempla habentur (1); sed hujus visceris, in musculum torosum, cordis instar concavum, conoideum, ac tam crassis lacertis divisum permutati specimen descriptum esse nescimus.

CARCINOMA VESICAE URINARIAE.

Vir religiosus quinquagesimum aetatis annum emensus est, quin ullo fere morbo premeretur; cum primum vero ad quinquagesimum secundum pervenisset, pustulae totum corpus occupantes comparuerunt nigricantes et prurigi em inferentes, quae tamen absque artis auxilio, squamatim deciduae, disparuerunt. Quatuor post menses, augusto nempe 1787, novam scenam lusit morbus, crebriores magisque nigras pustulas in medium proferens, quae nonnullorum dierum circuitibus humore rubro et purulento impraegnatae fuerunt, qui humor, sponte evacuatus, caustici adinstar agebat: partes enim istiusmodi humore madefactae, cito exoriabantur. Per mensem et ultra, magno cum aegri incommodo obduravit hic morbus; forti dein frigoris impressione disparuit. Sub finem mensis octobris, dolor ad regionem

(1) *Morgagni* de sed. et caus. morb. per anatonem indagatis in *Epist. Anat. med.* XLI. Lib. 3. *Baillie*, *Anatomie des krankhaften Baues*, S. 278. *De Bingen* de carnositate vesicae urinae morbose. *Altdorf* 1759. *Offer* in *Act. Helvet. Voigtel.*, *Handbuch der pathol. Anatomie* 3. B. S. 207. sq.

sinistri renis exsurrexit obtusus et continuus, qui ad anteriora interdum et ad pubem usque sese extendebat, ita ut aeger lateri dolenti incumbere non potuerit. Huic postea se adjunxit difficultas mingendi, et exigua febris; quae tamen, superstite semper dolore, opportunis medicaminibus fugata sunt. Aliquod post tempus urinae copiose profluebant, et in illis, absque aegri sensu, cernebantur flocculi albicantes, partim iisdem supernatantes, partim fundum petentes; oblongi, sanguinisque striis commisti, qui attente examinati, maceratae cujusdam membranae imaginem prae se ferebant.

Hocce in misero stata plura fuerunt remedia praescripta; sed incassum: nam dolor in mingendo, qui primum aberat, accessit postea. Urina guttatim et continuo plorabat; corpus gradatim emaciabatur; alvi constipatio, adpetitus abolitio, et anxia respiratio torquebant aegrum. Sinistri renis dolor magis magisque saevit. Crescunt indies inanes mingendi conatus; fortis tenemus insurgit, quin imo hisce sub conatibus summam ad vesicae orificium resistantiam experiebatur infelix, quae urinae viam claudebant. Per tres menses res ita se habuerunt; tandem vero mingendi conatu iterato, quadam cum explosione, corpus sanguineum et grumosum expulsi, ita ut oppositum parietem quatuor circiter passus ab aegro distantem, ille conspurcaverit. Hac ablata resistantia, magna sanguinis copia effluxit, quae da libras tres ascendebat. Vires vitales frac-

tae sunt, et in lipothymiam incidit aeger, a qua sublevatus, per quindecim dies nullam haemorrhagiam expertus est; praedictis tamen perdurantibus symptomatibus. Hisce elapsis diebus, in pauca urinae quantitate, quam laboriose emittebat, observabantur arenulae quaedam una cum grumis sanguineis. Pulsus inordinati ac debiles fiebant. Febris accessit demum, quae, constante ordine, sub vespera exacerbabatur. Catarrhalis quasi cyananche superveniebat; quae fluidorum omnium deglutitionem impediēbat. Priori fortior nunc haematuria rediit, quae copiose per tres dies continuavit. Proinde subsecuta est omnimoda urinae suppressio, et purulentae materiae profluvii cessatio; dolor in renis regione sensim sensimque deletur, et continuus horror ossa invadit. Sub tanto rerum miserrimarum cumulo, alterius medici consilio expetito, de prostatae tumore suspicio nata est, proindeque cicuta externe ac interne praescripta fuit. Vix autem grana quindecim illius assumpserat aeger, cum vomitus comparuerit, ac materiae ejusdem indolis ac illae, quae prius per urethram stillaverant, cum illo rejectae sint. Singultus paulo post, tendinumque subsultus excitabantur. Anhelosa respiratio, frigidi sudores, et lethalis postremo diarrhoea tam cito aggressa sunt aegrum, ut brevi horarum spatium vitam cum morte commutaverit.

SECTIO CADAVERIS.

Abdomen intropressum, nihil quidem livoris offerens, adpertum fuit. Nulla hic pinguedinis vestigia, et muscoli quasi igne torrefacti videbantur. Peritoneum in parte anteriore et inferiore tam arcte concretum erat cum tota vesicae urinariae superficie, ut illud ab ista rectius separari non potuerit. Omentum disparuerat; intestina vero, absque inflammatione, vacua erant. Hepar a statu naturali non recedebat. Lien nucis magnitudinem prae se ferebat. Ren dexter nihil notatu dignum exhibuit, sinister vero, cujus regionem fixus et obtusus dolor semper occupaverat, consumptus omnisque obliterated erat, nilque aliud, quam pelvis illius fluctuans de eo supererat. Ureteres dilatati non erant; sed levi tantum inflammatione correptus fuit ex illis sinister. Vesica urinalis tuberosa undique adparebat, et naturali volumine duplo major. Partibus adjacentibus illa ita adhaerebat, ut culter anatomicus, dum eandem avelleret, strideret, quasi secarentur cartilagines duriores. Separatae vesicae pondus ad duas libras ascendebat. Per medium secta, unde quaque quasi lacera et ulceribus plena inventa est. Reperti sunt quoque sacculi purulenta materia turgidi nonnulli, disrupti alii. *Substantia fungosa* internum vesicae cavum adimplebat. Hujus cavum non ultra tres uncias fluidi continere poterat, ita erant ejus parietes crassitie aucti.

Circa observationem hanc, ab Auditore nostro D. *Paulo Dagna, Ticinensi*, anno 1788 conscriptam, varia, notatu digna occurrunt. *Vesicae urinalis scirrhi*, qui aliunde (ut ab utero, intestino recto) eidem non accesserint, sed propria hujus visceris in substantia natales agnoverint, rariores sunt; ac saepe parietum vesicae auctam crassitiem, et fibrarum muscularium torositatem scriptoribus pro scirrho imposuisse, ab aliis jam animadversum fuit (1). Non tamen prorsus igitur negari posse scirrhos vesicae *primarios*, exemplo manifesto jam evicimus in *Epitomes* L. V. P. II. §. 630 p. 262. sqq.; et aliud vesicae carcinomaticae exemplum, in musices moderatore *Bruchsaliensi*, viro scrophuloso, a nobis quondam repertum, alibi descripsimus (2). Non indignus idcirco attentione nostra vesicae hic descriptus scirrhus est, ut sub quo nec intestini recti, nec alterius partis scirrhosae, vesicae propioris, mentio injicitur. Impetigo, *anthracis*, ut videtur, species, hunc vesicae morbum praecessit. Disperso, per frigus, hoc vitio cutaneo, ad renem sinistrum dolor primum oritur, obtusus,

(1) *Baillie* Anat. des krankhaften Baues. S. 176. 177. *Voigtel* Handb. der pathol. Anat. III. B. S. 276. *Soemmering*, Abhandl. über die schnell und langsam tödtlichen Krankheiten der Harnblase und der Harnröhre. Einleitung, p. XIII. XIV.

(2) In oratione academica, de vesica urinaria ex vicinia morbesa aegrotante.

quidem, sed continuus, ad anteriora interdum, et ad pubem usque extensus. Huic sese mingendi difficultas ac febris exigua adsociant, mox iterum, superstita semper renis dolore, dispulsae. Augentur nunc urinae, quae flocculos, partim graves, et fundum petentes, sanguine simul stratos, offerunt. Hucusque certe *nephralgiae* magis, quam *nephritidis* urgebant phenomena; nec enim aut febris violenta, per multos satis dies extensa, nec vomitus, nec dolores colici, nec stupor, cruris, aut testiculi retractio, urgebant. Flocculi etiam illi albescentes, partim fundum in multis urinis petentes, puriformem materiam sistebant, sub quorum exitu, renum morbi inflammatorii solutionem praedicere sueverunt. Monuimus interim in *Epitomes* L. II. §. 258. p. 289. vel in ipsa *nephritide* « dolores, sub morbi principio, magis esse *obtusos*, tendentes ac prementes. « Adhortati etiam tirones nostros sumus ibidem, §. 256. « quod, licet renum inflammationes, si calculorum in eosdem effectus excipientur, rarissimae quidem videntur; interim saepius ac putatur, *occultae* his in visceribus *suppurationes* occurrant. « Ac revera, non vomitus quidem, aut ructus, sed macies corporis gradatim aucta, dolores sub mingendo, qui antehac defuerant, mox aegrum nostrum, atroces, cum immani ad renem sinistrum cruciatu, cum alvi constipatione, tenesmo, sensu resistentis ad ostium vesicae obstaculi, et respiratione anxiosa corripiant. Tardius tandem febris lenta, sub vespere

aucta, accessit. Atqui sub cadaveris sectione ren sinister adeo consumptus fuit, ut nihil de eo, quam pelvis ejus fluctuans, supermanserit.

Evidens igitur renis inflammatio in supurationem conversa, et quidem *non ex calculis orta*, hic subfuit. Nec etenim paucas illas arenulas, quas aeger una cum grumis sanguinis minxit, et quas in sanorum adeo hominum urinis haud raro conspiciamus, hoc malum excitasse cum ratione quis asseret. Miramur interim, nullam *puris* cum urina simul excreti mentionem in morbi hujus historia injici; sed alia sunt, sub quibus, utpote majoris momenti phaenomenis, puris excretio, forsitan simul facta, praetervideri omnino potuit. Cum scilicet aeger tres integros per menses descriptis a doloribus, et a sensu illo haerentis ad vesicae ostium obstaculi vexatus fuisset, mingendi tandem iterato conatu, ille, corpus quoddam sanguineum et grumosum magno cum impetu in oppositum parietem e vesica expulsi, mox vero sanguinis ex ea jacturam tres integras ad libras passus est. Ubi de *haematuria vesicali* egimus in *Epitomes* L. V. §. 650. p. 280. simul his de grumis sanguineis ac *polypis*, post mictum sanguinis saepe magno sub nixu e vesica expulsis, locuti sumus, ac neminem sane medicorum latet *Trallesii* de polypis vesicae copiosis et praelongis, ab amico sibi *Hahnio*, parturientis quasi mulieris sub nixibus, expulsis, observatio. Hac demum sanguinis jactura per vesicam subsecuta, vi-

res aegri, mox a lipothymia correpti, concidunt, ac vitae finem proximum adnunciant. Nova tamen, ac priore intensior haematuria, per tres dies extensa, suboritur: a qua demum omnimoda urinae, ac *purulentae materiae*, (de qua primum hic mentio facta est) suppressio, lethali mox, nec tamen cicutae usui adscribendo, cum exitu, insequitur. Quo ex fonte sanguis ille, tum in grumos polyposos conversus, tum sincerus, defluerit, dubium illi subnasci vix potest, qui descriptum vesicae statum scirrhum et carcinomaticum attente consideraverit, et quam commune symptoma haemorrhagiae sub scirrhis esse soleant, secum reputaverit. Molem scilicet sana duplo majorem, pondus vero duarum librarum habuit vesica, inaequalis, tuberosa, ulceribus quasi lacerata, abscessibus adhuc clausis hinc inde obsessa; *fungosa* vero substantia ejus cavum, prae parietum crassitie vix trium unciarum lotii continendarum capax, implebat. Haec fungosa vesicae internae sustantia sine dubio cruoris sub morbi fine tanta copia effusi unica scaturigo fuit, et carcinomaticam hujus visceris indolem ultro confirmat. Admodum verisimile nobis videtur, illam ipsam causam, quae prius, anthracum sub forma, cutem exederat, qualiscunque ea fuerit, tum in renis sinistri, tum in vesicae urinalis substantiam effectum lethali saevuisse. In quo, certa nimis apud varios, ad *cancrum* dispositio haereat, hoc omnino nec hariolatu quidem pernoscimus; quod vero cancer per sec-

tionem exstirpatus saepe alias in partes non minore cum atrocita furiat, hoc flebili convincimur experientia.

VESICA URINALIS IN CRUMENAM LATERALEM
EXTENSA.

Joannes Dominicus *Caranti*, presbyter 73 annorum, ex loco *S. Leonardi*, venationi maximopere deditus, die 27^a septembris 1786, dum carnem suillam aromatibus conditam comedisset, tres circiter post horas incidit in vomitum. Hoc cessante vomitu, aeger, nec quidquam sublevatus, dolorem punctorium ad regionem lumbarem, paulo supra ossis ilei cristam, versus posteriora sinistrorsum, eumque fixum persentit; qui dolor per quatuor dies continuavit cum sititate, amarore oris vel maximis, ac siti. Oscitatio simul ac pandiculatio, et levis horror, sine ordine hominem invadunt. Accersitus chirurgus venam tundit, et olei olivarum uncias circiter quinque propinat. Evacuatur abhinc alvus, ac dolor sopitur. Post quinque dies, hic, vehementior, dexteram ejusdem regionis partem occupat. Ignotas nunc pilulas, a medico praescriptas, absque omni effectu aeger hausit.

Die 7^a Novembris, viribus insigniter fractus, ac dyspnoea correptus, primum quidem ad nosodochium, dein vero propter aliorum aegrorum in eo numerum, in clinicum *Ticinense* Institutum, quasi moribundus suscipi-

tur (1). Abdomen, tactu quidem indolens, sed durum atque tumidum, manuum pressionem resistens, tribus veluti promontoriis seu tumoribus divisum est; qui tumores, non eadem, quidem, sed ordinata quadam altitudine, gradatim, ab inguine dextro, circa intestini coeci regionem, oblique sursum, ita ut medius, super pectinem, tertius vero ejusdem a latere haereret, ad sinistri confines hypochondrii, attollunt. Febris aegro vix ulla, sed pulsus exilis ac debilissimus est. Ille cum fomentis calidis, et vini paulillo refocillato, num a multo jam tempore descriptos abdominis tumores animadvertisset? quaestionem proponimus. Respondet: ante primum illum in sinistra regione dolorem, nec tumorem, nec alvi obstructionem, qua nunc laboraret, sibi fuisse cognita.

Ob summam viri jam antehac ad aspectu cachectici, debilitatem, atque ob dyspnoeam, vesicantia suris imposuimus. Ab enemate simul injecto, alvus ter, satis copiose, excreta fuit. Nocte subsequente dormivit aeger, et vires a somno restauratas, pulsus magis elevatos, respirationem vero faciliorem exhibuit. Postquam sic diem sat bene transegisset: ad noctem inquietus, de oris magno amarore ac de alvi obstructione senex conqueritur. Salis igitur amari uncia porri-

(1) Tales nos aegros haud rare, sine difficultate, suscepimus; quos, ubi eos per artem conservari haud licuit, in usus tironum a morte secumimus, et si quid notatum dignum cadavera eorum obtulissent, museo id pathologico commisimus.

gitur, clysterque adplicatur. Sequuntur sedes aliquot; sed pristina symptomata continuant. Hinc pulvis rhei cum calomela praescribitur; inquietudo nocturna per sex fere dies nihilominus continuat.

Decima septima hinc die decoctum corticis ordinatur. Adpetitus abhinc redire quidquam, et somnus augeri videntur; sed post duos dies, versus noctem, obtusus circa tumores abdominis (quos pro cysticis habebamus, ab aegro modo tardius per tactum observatis) dolor accusatur, urina vero nulla excernitur. Ventri linimentum inungitur volatile, ac praeter potum ex radicibus graminis, tartari solubilis dragma dimidia ter in die exhibetur. Nec tamen exinde aut faeces, aut urinae motae, aut dolores sopiti fuerunt, nec somno aeger gavisus est.

Die 21^a Venter quidquam ad contactum dolet magis; tres vero illi tumores in unum quasi coivisse videntur, intumescente quidquam abdomine. Enema nunc injicitur, ac nisi urina simul secedat, catheter ad vesicam duci jubetur.

Die 22^a Urinis, ut referebat, cum paucis faecibus excretis, catheteris usum suspenderat chirurgus. Alterum enema injicitur. Nec hac tamen die, nec altera, aut urinae, aut faeces redduntur. Catheterem adplicari repetito jubemus; hujus vero loco clysterem injiciunt, et cum faecibus, urinae simul excretionem expectant. Post mediam noctem, aegrum anxietas invadit; e lecto surgit, pedibusque erectus insistit;

ad lectulum vero repositus, jactatur hinc inde, custodem in auxilium invocat; mox vero, corpore sinistrorsum contorto, illius inter brachia expirat.

SECTIO CADAVERIS.

Cadaveris, quacunque ratione tractati, etsi horis triginta sex a morte jam elapsis, nulla rigiditas, sed undique molle illud atque flaccidum observatur. Abdomen interim livescit. Tumores nunc quasi *bipartiti* tactu percipiuntur in illo. Sectis primum ac separatis thoracis integumentis, cartilagines, quae costas cum sterno revinciunt, osseam in substantiam conversae reperiuntur. Cavo pectoris aperto, pulmones sani, filis hinc inde pleurae adnexi, comparebant. Pericardio inciso, aquae rubellae unciae fere duae effluebant. Musculi abdominales quamplurimum extenuati erant. Aquae subrubrae, paucae tamen, abdominis in cavo haerebant. Intestina tenuia, sub hypochondrio sinistro compressa. Hepar magnum, et livido colore instructum, altius versus pectus assurgebat. Ad utrumque nunc umbilici latus, tumores duo, sat molles, quasi cystici, ad posteriorem faciem iu unum confluentes, anteriore vero cum peritoneo, vasculis intermediis, quidquam concreti, se offerunt: quos tumores ex ipsa vesica conflari, mox intelleximus. Separatis a peritoneo vesicae his tumoribus, hos inter et faciem peritonei internam, adeps, supra pubem collectus,

haerebat. Tumor dexter cum intestino coeco cohaerebat. Omnis vero tela cellulosa, quae tumores cum partibus vicinis, utrimque et posterius cum pelvi, anterieus autem cum osse pubis, revinciebat, aqua rubelli coloris madebat. Tota facies tumorum anterior a peritoneo obtegebatur. Viscera abdominis, his a tumoribus compressa, inter se coaluerant. Immisso vesicae cathetere, urinae octoginta circiter unciae effluxerunt. Aere vero tunc in vesicam compulso ordinarium quidem haec volumen offerebat, oblonga tamen; sed adhaerens ei ad latus dextrum sacculus alter, cum vesicae cavo communicans, comparebat. Haec moles, fere pellucida et tenuis, a spatio duorum fere pollicum diametri, inter fibras vesicae musculares prominebat, atque ex vesicae interna membrana, inter fibrillas vesicae carneas, minime justo crassiores, prominente, conflabatur. Pluribus in locis vesicae parvi tumores semipellucidi prominent inter fibras illius musculares, qui, sub vita aegri protracta, probabili argumento, easdem in crumenas extensi fuissent. Prostata glandula volumine suo multum adaucta et scirrhusa fuit. Experimur tantum a morte aegri, quod tribus abhinc annis haematuria ille laboraverit.

EPICRISIS.

Plura quidem *diverticorum*, *appendicum*, *herniarum*, *cellularum*, ad vesicas hominum urinales exempla in fastis medi-

cis consignata legimus (1) ; non inutilem interim operam in publicanda conspectae a nobis quoque tam mirae aberrationis historia nos posituros esse speramus. Conscripsit hanc, qui aegri curam sibi assumpserat, vir egregius, ac indefessus per septem fere annos auditor et amicus noster, *Vincentius Solenghi*. Vesicam abnormem, de qua agimus, museum pathologicum *Ticinense* conservat.

Nec *herniae* nomen huic vesicae. urinalis morbo satis convenire credimus ; eo quod nullum viscus in saccum morbosum abscesserit, nec *diverticulorum*, *appendicum* illud quadrare, quod in his, omnes visceris alicujus tunicae simul, praeter sanitatis le-

(1) Magni quondam viri *Isaaci Casauboni* obitu jam nimis celebris hic morbus fuit. Vid. apud *Bonetum* in sepulchret. etc. cujus multum cum nostra commune habet observatio. De eodem loquuntur *Coiter*, exercit. et obs. anat. c. fig. Norimb. 1573. *Berger*, hist. de l'acad. des sciences, année 1704. obs. anat. 22. *Bohnius*, de officio med. duplici, p. 516. *Heister*, Instit. chirurg. P. II. C. CXLV. Tab. XXXII. fig. 2. *de Broke*, de vesicae urinariae appendicibus. Argentorat. 1754. *Morgagni*, adversar. anat. III. animadvers. XXXVI. p. 92. Id. de sed. et caus. morb. Epist. VII. n. II. Ep. XLII. n. 30. *Houstet*, obs. sur les pierres enkistées. Vid. mém. de L'acad. R. de chirurgie. T. I. p. 395. *Bordenave*, mém. de l'acad. des Sc. de Paris 1775. Plures auctores collegerunt. *Voigtel*, Handb. der pathol. Anat. 3. B. S. 236-241. et *Conradi*, Handb. der path. Anat. S. 269.

ges dilatatae, ac in longum ductae sint, putamus. *Crumenarum* hinc nobis praeplacuit denominatio. Sunt vero hae, tunicarum vesicae internarum, seu villosae, ac nervosae, exteriora versus, inter secedentes hujus visceris fibras musculares, insinuatio, ac in saccum, plus minus extensum, vesicae ipsius parietibus integris tenuiorem, ac semipellucidum, nunc ipso cum peritoneo vesicali, nunc sine isto, dilatatio. Ipsae cordis fibrae carneae, observante jam *Hallero*, uterino adhuc in foetu aliquando ita dehiscunt: ut membrana hujus visceris nobilissimi interna, inter illas fibras, externae tunicae contactu mutuo sese adplicet, ac futuri, sub vita quidquam protracta, *aneurysmatis* rudimenta, congenito sic vitio, ponat. Nec morbo nostro, ad speciem hanc aneurysmatis formandam, nisi loci in arteria, et cruoris, in vicem urinae, per rythmos in suos parietes adpellentis, conditio deest. Cum vero nullum in vesicae urinalis superficie punctum sit, ex quo sacci hujus indolis aliquando non exsurrexerint; atque illi ad ipsum urachi locum, vel quo ureteres vesicam perforant, spatio (1), observati fuerint; etsi hoc ad latera cystidis forsitan frequentius contingat (2); expectabimus sane, quasdam ex his crumenis, peri-

(1) *Walter*, Krankheiten der Nieren und Harnblase, S. 45. Tab. XIII. *Heister* l. c.

(2) *Lobstein*, Diss. de calculis vesicae urinae cysticis. Argentorat. 1775. p. 5.

tonaeum vesicam superscandens externo pro vestitu, densiores tunc, mutuari. Prout vero fibrae musculares vesicae, quidquam magis conspicuae ac fortiores, tumores ejusmodi amplectuntur, pseudosphincteris quasi officium in hos sibi, imperfectum interim, assumunt. Vix non semper tamen hae crumenae, non latam adeo, et ad basin compressam, qualem fibrae dehiscentes largiri videntur, sed sphaericam figuram agnoscunt; prima interim rudimenta, ovalem fere, aut verrucosam quasi formam produnt. Numerus saccorum dictorum, diversis in vesicis varius est. Sex eorum meminit *Nourse* (1); plurimos *Houstetus* adnotavit [2]. Nostro in exemplo, praeter maximum saccum, novemdecim crumenulae vesicam obsident. Calculos saepe hi sacci, etiam singuli [3], — alii, plures simul [4], — alii vero nullos in se fovent. In vesica pueri, calculus quidem in vesica libere fluctans, sed nullus in crumenis, forsitan adhuc nimis angustis, haesit; manifesto satis argumento, has ultimas ab illo nequaquam genitas fuisse. In presbyteri autem vesica, tot protuberantiis notata, nullus omnino calculus repertus fuit.

(1) Medical Essays and observations, Vol. VII.

(2) L. c. p. 396.

(3) *Houstet* l. c.

(4) *Nourse*, l. c. novem calculi in sex crumenis.

Ad originem hujus morbi in genere quod spectat, varias illas esse, supponimus [1]. Dispositionem in variis hominibus vesicae congenitam, in paucis fibrarum muscularium aut numero, aut nexu laterali, aut in earundem infirmitate consistentem, subesse vix dubitamus. Si fibrarum laxitas muscularium huc sola faceret; in faeminis, in quibus uterus gravidus vesicam toties utrimque in latera complanat, et quibus fibrae in genere laxiores sunt, frequentius quam in viris, cum tamen contrarium obtineat [2], crumenae hoc viscus infestarent. Prostatae apud mulieres defectui, urethrae brevioris, simulque latioris majori ad calculos demittendos facilitati, ac rariori lotii retinendi, quam in viris, occasione, hanc exceptionem tribuere, vetant innumeri tumores prostatae cum paucis vesicae hujus indolis affectionibus, frequens crumenarum vesicalium absque calculis observatio, ac uberior in

(1) Circa generationem crumenarum vesicalium dubius haesit celeb. *Baillie*, atque sedem illarum vel in tela cellulosa ad externam vesicae faciem esse ponit; vel illarum principium in dilatatione membranarum vesicae internarum, consistere credit. Primum illi minus verisimile videtur, quod tunicae vesicae internae, ut crumena cum vesicae cavo communicaret, suppuratio, ac tandem perforatio forent necessariae. Vid. *Samml. userl. Abhandl. f. pr. Aerzte. XX. B. S. 427.*

(2) *Baillie*, l. c. S. 179.

gravidis mulieribus, quam in viris, urinae retentio. Nec de *cystide fellea*, fibris scilicet muscularibus carente, valere haec ratio potest; in qua tamen non minus, quam in vesica urinaria, *sepimenta*, illam cystidem tam in longum, quam in latum dividentia, reperta fuerunt. A vi fibrarum muscularium vesicae densioris aucta, et majore illarum in urinas pressione has crumenas produci (1), opinio est, quae nostro saltem in aegro, cui crassior, carnosior vesica haud fuit, argumento destituitur. Si tanta calculorum in producendis his crumenis esset potentia; prae pondere illorum hi sacci aut ad cervicem, aut ad partem posteriorem, non vero sat saepe supremum, vel anteriorem vesicae ad parietem, quo calculi aut non assurgunt, aut certe non premunt, haerent crumena. Neque argumentum ex calculis his in crumenis repertis, ut in quos fortuito incidere, aut in quibus, jam praeviis, nasci potuerunt, majus erit.

Praeter *congenitam* certarum vesicarum hunc in morbum *dispositionem*, credimus igitur, vel in fibris illarum quibusdam, *partiali paralyisi* adfectis, vel in *textus cellulosi* his fibris intermedii *destructione*, vel saltem in istius *repletione*, *extensione laterali* per materiam lymphaticam, puriformem, sub phlogosi vesicae in tremulam ac facile extensilem gelatinam hic deposi-

(1) Id. ibid.

tam, causam morbi de quo agimus, sicut quondam de generatione multorum *aneurysmatum* insinuavimus (*Epitomes* lib. V. P. II. §. 571. p. 35.) esse quaerendam. Quodsi occasionalibus hisce sub conditionibus diuturna majorque urinarum retentio accedat; facilis sane erit divergens fibrarum aut resolutarum, aut nullo cum vicinis nexu instructarum, aut molliore, facile cedente materia ultra quam par est divisarum, discessio. Constat nempe, fibras vesicae musculares, sub morbo earum incremento, non ut cœteras musculorum strenue exercitorum fibras, rubere magis; sed potius *albescere*, ac tendinum colorem simulare. Auditor quoque noster, quem supra laudavimus (1), dum experimentum cum vesica urinari, crassioribus, a calculi irritatione, fibris muscularibus instructa, ope *macerationis* instituisset, vidit illas colorem in aqua partim deposuisse, et materiam quae fibras novas quasi creasse visa erat, in tomentosam, ac *cellulosae* similem telam abivisse.

Quodsi igitur supponamus, presbyterum nostrum, a tumore prostatae glandulae scirrhosae multum adaucto, et, quod modo a morte ejus percepimus, ab haematuria correptum, quin de his unquam mentionem facere voluisset, urinae retentionibus aliquoties in vita fuisse subjectum; nisi congenita forsitan ad illius vesicam dispositio rem so-

(1) D. Dell'û, vid. observ. de vesica urinaria cordis figuram habitumque aemulante.

la jam explicet, superaddita vel huic, vel resolutioni fibrarum quarundam vesicalium, vel praegressae in viis urinalibus phlogosi, et interpositae fibris vesicae muscularibus materiae puriformi necdum solidiori, et extensione vesicae facilius cedenti, *ischuria*, nodum hunc difficilem solveret. *Tres* in viventis aegri abdomine *tumores*, — in ejus vero cadavere modo *duos* comparuisse, id nos ita nobis explicuimus: quod compressum in dextris a tumore vesicae intestinum colon ascendens, flatus et stercora in *coeco*, inferiore sibi intestino, per hos ipsos extenso, coercuerit.

ALTERA VESICA URINALIS IN CRUMENAS EXTENSA.

Duodecim circiter annorum puer rusticus, brevi tempore post suum in nosodochium *Ticinense* adventum, ex morbo nobis ignoto defunctus, et ad amphitheatrum anatomicum delatus, sub sectione cadaveris, vesicam exhibuit. Prima hoc in viscere morbi, quem praecedenti in exemplo descripsimus, rudimenta, crumenae scilicet minores, inter fibras vesicae musculares prominentes; sed post urinae effluxum in medio collapsae, se offerunt. Ex minoribus protuberantiis plures, et, ut putamus, ortu posteriores, verrucarum fere formam agnoscunt, nec ad apicem collapsae comparent. Calculus in vesicae cavo libere fluctuans simul repertus

fuit, qui, etsi vix nucem juglandem adaequans, grandior sane, quam ut a majore etiam illius crumena contineri, atque illam sic produxisse potuisset. Prostata glandula hic aequo major non fuit; nec abinde certe obstaculum excernendae urinae poni potuit. Nec tanta fuit vesicae in cadavere expansio, ut ex urinarum retentione mortem pueri venisse credi queat. Calculus hac in vesica contentus, cervici ejusdem interdum admo-
veri, ac urinae sic effluxum praepedire, hinc fibras vesicae musculares ad fortio-
rem in urinas contractionem stimulare potuit; sed ex hac actione tot crumenas, in supre-
ma adeo cystidis parte, venisse, ex eo non videtur probabile, quod fibrae musculares irritatae et contractae, minus a se ipsis dehiscant, ac firmiorem tunicae vesicae in-
ternae quam ut haec inter illas susci-
pi, ac extrorsum protrudi queat, obicem ponant. Concludimus igitur, quod (cum nec prostata glandula, nec ipse calculus incul-
pari hic potuerint, et cum hae crumena-
e jam saepius absque calculis ad vesicas ob-
servatae fuerint) seccorum vesicae exter-
norum, ex solis tunicis hujus visceris vil-
losa et nervosa constantium origo, pleri-
sque saltem in casibus, a congenita vesicae
in certis locis inertia, fibrarumque ejus mu-
scularium hinc illinc aut defectu aut laxita-
te, paresi, magis, quam ex causa quacun-
que alia, si retentionis lotii diuturnae oc-
casionem excipiamus, derivanda sit.

VESICA URINARIA, IN CAVA DUO DIVISA.

Provectae vir aetatis nosocomium civitatis *Cremensis*, paucis ante mortem diebus, emaciatus, et a febre lenta consumptus, accessit. Sub abdominis exploratione, tumor, super osse pubis ad umbilicum usque extensus percipiebatur. Duplex hic tumor erat, utrimque fluctuans et a linea alba quasi in medio divisus. Postquam aeger urinas excrevisset, subsidebant quidem hi tumores; ast aliquis ad anteriorem eorum faciem tumor mollis tactui se obtulit. Post ea, quae celebris *Troja* de morbis vesicae tradiderat, hoc viscus scilicet vel per sepimentum in longum decurrens, vel per vallum, ex adplicitis sibi mutuo duarum vesicarum parietibus constructum, duas interdum in caveas, ad exemplum cystidis in actis R. Academiae chirurgorum T. IV. p. 62 descriptae, dividi; non obscura morbi diagnosis esse potuit. Interrogato aegro: » num in sua juventute hunc ad locum dolores acutos persenserit? an difficulter, an vero cum ardore urinam reddiderit? an sibi quandoque lotium perfecte fuerit suppressum? an sub statu praesente, antequam mingeret, compressione quadam indigeret? » — » facilem sibi semper urinae excretionem fuisse, ac adhucdum superesse, » respondit. Quo tamen hujus assertionis veritatem ipsemet cognoscerem, urinae excretioni praesens esse volui, ac urinas ab aegro, pleno

flumine, ad ultimam usque guttulam, absque omni labore expelli, conspexi.

SECTIO CADAVERIS.

Postquam fatis aeger cessisset, cadaveris sectionem fieri imperavi. Etsi vero rem tanti momenti chirurgo nosocomii enixe commendassem; ille tamen, vesicam hanc, ubi recte de illa judicassem, a me velle conservari inscius, non debitam in eadem excindenda curam adhibuit.

Carolus Pinaroli, M. D. Medicus Civitatis *Cremensis* expertissimus, hanc nobis observationem, pro sua in nos amicitia, communicavit die 28 mensis martii 1792, ut cujus objectum ad museum *Ticinense* pathologicum deposuimus.

Pleura vesicarum, per proprium sepimentum a fundo ad cervicem, — aliqua transversim, divisarum, — quidquod tripartitae adeo vesicae, exempla habentur, atque huic fabricae abnormi, non minus, quam illi, quae *crumenas* laterales offert, numerum vesicarum uni homini concessarum, ut volunt, majorem, plerumque saltem attribues (1). In dicta vesica, parietem ambobus saccis, profunde divisis, intermedium sat brevem, per

(1) Plurimum vesicarum, uno in homine observatarum, collectionem dedit, *Voigtel*, Handbuch der pathol. Anatomie 3. B. p. 234--236.

digitos exterius, et per specillum interius distinguimus. Cuivis sacco, ureter unus inseritur, qui unam modo, non duplicem vesicam esse ostendunt. Ad aetatem pro-
 vectum venisse aegrum hac abnormi vesica instructum, nec ullum eundem ab ista salutis incommodum persensisse, legimus. Quantum interim, intersit, hanc abnormem hominis cystidem non praetervideri, ex casu, quo *calculus* ex illa, per sectionem extrahendus foret, sat clare elucet. Quodsi vero urinae retentio cum tumore hypogastricae regionis, in tali homine, vesicae punctionem sibi requireret; haec autem perforatio, propter magnum prostatae tumorem, per anum fieri nequiret; in medio saltem tumorum sibi aequalium, quo loco sepimentum nostro in casu haesit, peracta operatio, vesicam nisi dimidiam depleret; sed in parte laterali, non sine laesionis arteriae hypogastricae discrimine, instituta, mox aequalem sibi in parte altera exigeret. In casu a *Fothergillio* descripto, vesica viri sexagenarii urinalis, per membranam transversim tensam, duas in partes divisa fuit; haec vero membrana per foramen, quod minorem digitum admittit, cum utraque vesicae camera communio-
 nem aluit (1). Non eadem interim in aliis

(1) Memoirs of the medical Society of London Vol. I. No. XII. p. 201. Similem fere casum jam descripserat *Gerardus Blasius*, in observationibus medicis rarioribus; Part. IV. Ob. XVIII. p. 59. Recentiore hujus indolis observationem,

vesicae sepimentis constitutio detecta fuit; et quae urinas ex uno cystidis cavo eduxisset, alterum intactum reliquisset, operatio. Catheter vesicae, sub duplici hypogastrii tumore, mature satis immissus, num utrumque illius cavum a lotio educto subsideat, num vero unum ab isto turgere continuet, docebit; in casu vero quo fistula in vesicam ferri non possat, hoc etiam diagnosis deficiente subsidio, solius ope tactus, num compresso uno tumore, alter magis tensus eleve-
tur et vivissim, de communicatione cavorum vesicae vel praesente, vel absente, foret judicandum. In casu vesicae transversim divisae, ex *Ashii* observatione, a *Baillieo* relato, superior vesicae cavitas globosum super pube tumorem efformaverat, ex quo, per catheterem modo paucae urinae unciae, tumore sic parum subsidente, educi potuerant. Sub erecta vero aegri positione, lotium interdum absque voluntatis imperio, magna copia, tumore pro tempore imminuto, secedebat. Sectio cadaveris, officium sepi-
menti pridem cum utroque vesicae cavo communicans, vix non in integrum oblitteratum exhibuit. Transversae igitur divisionis vesicae diagnosin Vir hic celebris in tumore super pube conspicuo, atque circumscripto ponit: sub quo tumore parcior urinae quantitas, quam sanis, cum pauca illius subsidentia, secedat, vel ab ipso siphone subduci

a Doctore *Ash* sibi communicatam, refert *Baillie*. Vid. Sammlung auserles. Abhandl. f. pr. Aerzte. XX. B. S. 427.

queat ; dum interim, sub mutata aegri positione , urina sponte , vel plurima sequatur , ac vesicae moles morbosa, donec ea de novo repleatur, dispareat. Divisionem vesicae urinæ in duo cava, *Baillieus* vel ex internæ tunicae cystidis excrescentia in sepimentum continuata , vel ex contractione fibrarum transversarum *permanente* derivat. Haecce contractio , cum spasmodica ac temporaria uteri , in medio sui , ad figuram *horologii arenarii* , constrictione conspirat (1).

SCIRRHUS VESICULARUM SEMINALIUM.

Scientiae medicae lacunas , quas explere pro voto impedimur, saltem, donec facilius ad eas aditus pateat , exsiccare , jam satis est. Impenetrabile ingenio humano generationis negotium, ob limites quos illi Natura posuit, maneat nobis incognitum ! modo morbos organorum, quibus suum ad opus haec utitur, eorum modo phenomena, origines, medendique rationem intelligi nobis liceat, et minus aspera nos premit necessitas ignorantiae. Sed , si modo utriusque sexûs organa genitalia , quorum usus nec brutis animalibus incognitus est , excipias , de quibusdam aliis sat parum , de penitioribus vero nihil, quod insulas hypotheses non oleat, perspicimus. Non mirum igitur , quod tanta phy-

(1) De tali uteri constrictione jam egimus in oratione academica, *de utero placentam incarcerante*.

siologiae paupertas, in pathologia pauperiore se filiam agnoscat; et quod, ut non nisi de morbis virilium loquamur, nec receptaculi quidem humano semini dicati vitia a longe nobis perspecta sint. Dimidiam illius partem, sub vasis deferentis, tunc largioris, supplemento, defuisse, — ostia ejusdem caecutiisse, — utriusque vesiculae, aut saltem unius ex istis, capacitatem praescriptam defuisse, — parietes illarum osseas hinc inde particulas concepisse, — infarctu easdem scrophuloso laborasse, — ex partium vicinarum incendio deflagrasse, aut in tabum purulentum abivisse, — haec quidem vel uno modo, vel altero exemplo edocti fuimus; sed quibus sub signis, huic modo organo propriis, hi morbi incesserint, id sane vel exercitatissimos in arte viros latet. A *scirrho* quoque vesiculas seminales posse corripì, unico modo, quod sciamus, apud *Morgagnum* exemplo constat: ut qui unius modo lateris vesiculam, ac vasis deferentis, huic contigui, partem, duriores ac vix non cartilagineas fuisse commemorat (1); quin hujus generis, summa vel *Bailliei*, vel *Soemmeringii* experientia quidquam his addiderit. Totius quidem receptaculi seminiferi scirrhum praegrandem, sed nulla cura e cadavere exsectum, et (quod magis dolemus) absque morbi historia nobis aliunde oblatum, museo pathologico *Ticinensi*, — unicum sci-

(1) De sed, et caus. morb. Epist. XLVI. Art. 5.

licet ut longae catenae amulum, etsi mancum ac rubigine obductum, talem tamen, cui aliorum solertia saniolem quondam utiliter adnectat, commisimus.

Ex his apparet, scirrhum vesicularum seminalium, cum scirrho prostatae simulac parietum vesicae cum aucta crassitie incessisse; atque hinc, probabili ratione, dictas vesiculas ex vicina morbosa magis, quam ex adfectione propria primum induruisse, ac sortem cum prostata, cum qua intimius intricatae sunt, communem subivisse. Vesicae urinariae, etsi vacuae, non tamen collapsae, satisque extensae figura, de parietum hujus visceris non modo crassitie aucta, sed quoque de indole eorum vix non cartilaginea, testantur: Etsi vero prostatae tumores omnis generis, et qui pelvis cavum vix non omne impleverint, viderimus; nunquam tamen illos in vesiculas seminales aliter, quam easdem comprimendo ac obliterando, egisse conspeximus. Coeterum, sub tanta horum receptaculorum cum prostatae scirrho implicatione, specifica tamen eorundem, ac intestinulorum gyris similis quasi inflexio, sicut separatio a glandula prostata, adhuc satis conspicuae sunt. Vesicularum simul positio, sicut in casu a *Baillieo* descritto (1), altior est.

(1) A series of Engravings etc. fascic. 7 Plate I. fig. 2.

Carolus *Cassani*, ex *Zeccone*, rusticus, annorum 78, vir bibax, jam ab anno dysuria cum dolore ad glandem adficitur. Ab octodecim diebus ischuria perfecta, cum frequentibus ac dolore plenis mingendi conatibus, laborat. Vesica, cum aeger die 24^a mensis martii 1793 nosocomium *Ticinense* petisset, pyriformis, extensa super pube tactu percipitur, nec tamen ab isto dolorem significat. Febris nulla observatur. Extrahitur ope catheteris urina, decoctum althaeae pro potu, fots regioni hypogastricae emollientes, primo vero balneum tepidum, praescribuntur. Ob aliquem oris amarorem, alvique lentorem, pulpa tamarindorum in sero lactis soluta propinatur. Continuatur aliquamdiu in istis. Urina bis terve in die extrahitur. Tandem superaccedunt singula *cystidis* symptomata; ob summos supra pubem dolores in ejulatus rapitur aeger; maxima adest anxietas, jactatio; pulsus contracti sunt, lingua arida, alvus arida, facies collapsa. Venaesectione aliquot instituuntur, adplicantur hirudines. Sanguis per illas detractus, denso semper corio obducitur. Continuuntur demulcentia, balnea, fots, clysteres parva dosi frequenter injiciuntur. Die interim 31^a martii miser fato cessit senex.

SECTIO CADAVERIS.

Vesica cum urethra et pene simul e cadavere extractis, ut penitiora vesicae paterent, sectio longitudinalis, primum satis parva, in parte ejus antica instituta fuit. Tumor illico ovalis, nucis avellanae magnitudinem aequans, levissimus, scirrhoideus, tantillum mobilis, in vesicam prominens, retro istius ostium, prope ejusdem in urethram ingressum, in conspectum prodiit. Hunc tumorem quaquaversum examinando, illum prostatae glandulae simul insignitertumentis, retro vesicam alte ascendentis, ac scirrhosae partem esse comparuit. Catheter introductus, viam in vesicam facile inveniebat, tumore illo retroposito id minime praepediente, sed pauxillum cedente; ast vero cathetere retracto, urethrae ostium hermetice occludebatur. Incisione per omnem vesicae faciem anteriorem in longum aucta, hujus visceris parietes crassiores repertae fuerunt. In postica vesicae parte, quoad imum ejus fundum, colore haec atro-rubente, ac vere gangraenoso erat depicta.

EPICRISIS.

Ad virum doctissimum, ac in cadaverum perlustrationibus pathologicis maxime sedulum, *Jounnem De Felici*, M. D. et musei pathologici *Ticinensis*, cui haec vesica morbosa commissa fuit, custodem, haec morbi et sectionis historia pertinet.

Non quidem rara sunt tumorum prostatae maximorum, in ipsum etiam vesicae cavum prominentium exempla; neque ob id, rei sat communis descriptionem, hic tradi conveniret, nisi pars hujus glandulae scirrhusa tumorem ad ipsum vesicae ostium, qui *valvulae* quasi officio fungebatur, constituisset. Sub tanto prostatae tumore scirrhuso, difficillima vix non semper, aut et prorsus impossibilis, catheteris introductio est; adducto vero in casu, facilis haec erat et quavis die aliquoties instituta fuit operatio. Operculum nempe illud rotundum, impulsui siphonis cessit; hoc vero retracto, exitum urinae spontaneum, quem vesicae, tot a tumoribus oppletae angustia frequentius sibi exegit, continuo impedivit. Cystidem in gangraenam conversam, impedita vasorum vesicae actio, ac stimulus continuus satis explicant.

SCIRRHUS UTERI VIRGINEI.

Annorum triginta quatuor virgò, Cremonensis, *Elisabetha Antoniazzi*, a fluxu menstruo tardius salutata, catameniis vero posthinc modo paucis instructa, cachecticum semper habitum offerens, anno circiter vigesimo aetatis suae menorrhagiae subjici incepit. Fluxus isti sanguinei non quidem cum impetu et copia majore contingebant, sed longius per tempus et per dies adeo viginti haud raro continuabant. Successit languor; appetitus ciborum non quidem in integrum

sublatus, sed in picam, ut vocant, et malaciam degenerabat. Praeterea mœror cum lenta febricula virginem tenebat. Sexies fere in anno fluxus ille uterinus recrudit; duobus vero annis elapsis, majoris momenti symptomata, parentes, ut medicos consulerent, induxerunt. Institutum ab his examen, uteri tumorem, doloris expertem, duobus digitis supra pubem extensum adesse, docuit. Ab adhibitis remediis meliorem aegra conditionem nacta, medicis valedixit. Brevi tempore in pristinum statum relapsa, saluti propriae prospicere neglexit, donec post annos morbus summum fastigium attigerit. Exploratio tunc instituta fuit circa uterum. Copiosus ex isto sanguis coccineus, nec foetidus proruperat. Facies aegrae summo opere pallescit. Sub abdominis attactu, tumor se manifestat, ad umbilicum usque pertingens et ad ilia extensus, sinistrorsum praecipue, ubi tumor separatus, ovum galinaceum adaequans, sub fluxu per vaginam majore, ac sub attactu dolens. Os uteri, ut quarto graviditatis mense tumentis, sursum ductum, tangi non potuit. Pulsus minimi erant et celeres. Cutis calor parum a naturali distabat. Magna corporis macies, oris maxima amarities, ardor ventriculi aderant. Evacuatis cum pulpa tamarindorum et cassiae, sine impetu primarum viarum, sordibus, amaror oris ventriculique ardor cessarunt. Lenia tunc adstringentia et elixir vitrioli cum victu ex carniam jusculis, cum ovi vitello remistis praescripta fuerunt. Hac

sub methodo profluvium ex utero quidquam videbatur imminui; sed febris magna aegram continuo vexabat. Ultimis decem fere diebus non sanguis sincerus, sed loturae carnis quidquam simile, pauca tamen quantitate, ex utero fluebat. Vires interim continuo magis fatiscebant. Corticis extractum cum aqua cinnamomi, aliaque remedia incassum porrecta fuerunt. Accesserunt demum stertorosa respiratio, jactatio continua, vaniloquia, pulsus minimi sed aequales; ac viginti post dies creatori animam reddidit virgo.

SECTIO CADAVERIS.

Vix adperto abdomine, magna moles, quatuor digitis et ultra super pubem prominens, ab omento tenuissimo, pinguedinis experte, oblecta, conspectui se obtulit. Abducto omento, comparuit, hanc molem ex utero, albidissimo colore instructo, venire. Parietes hujus visceris, circa fundum, vix non membranacei, corpus uteri durum, cervix autem quasi cartilaginea et prorsus scirrhusa, os uteri dehiscens et crassius, fuerunt. Exsectus pelvi uterus, tres libras medicas cum dimidia ponderavit, digitisque compressus, quidquam fluidi continere videbatur. In cavo hujus visceris, tumor ruberrimus valde mollis, arcte uteri duriori substantiae infixus, haerebat. Vagina multo longior, quam ut per illam uterus in vivente aegra attingi potuisset, comparuit.

EPICRISIS.

Non infrequens quondam sacrarum virginum morbus, tam *uberum*, quam *uteri scirrhus* fuit. Cœnobiorum extra mœnia, longe rarior in pura *virgine*, quam nupta, aut vidua in foemina; frequentior tamen *ovariorum* scirrhusa adfectio est. Quodsi autem ob hanc solam jam rationem praesens conservari merebatur observatio; alia utique notatu digna haec in se foveant, quae breviter hic tangimus. Sicut vitae sors longioris, brevioris; ita quoque morborum pars major *organicorum*, ut vocant, quos injuriae externae ac metastases non generant; prima sui rudimenta materno in sinu, ac primo hominis in germine nobis ponere videtur. Evolvuntur haec mala potius, quam tardius producuntur; et sua morbi similes, quos hodie ortos supponimus, sicut ipsa longaevitas, remota longe incunabula habent. Sunt forsitan haec, quae *dispositiones haereditarias*, *congenitas*, vel majorem partis corporis unius prae altera *debilitatem*, non doctiore nominum selectu, vocamus.

Tardiora primum virgini nostrae, adspectu chloroticae, menstrua, et quidem sub initio pauca, vigesimo vero jam anno non tam menstrua, quam fere continua, etsi non copiosa sanguinis ex utero profluvia fuerunt. Hucusque chloroseos magis, quam localis morbi, pro summo uteri in omne mulieris systema imperio, symptomata si-

stebantur. Post duos ab his incommodis annos, scirrhi, duos digitos super pectinem prominentis gigantea vix non primordia deteguntur. Crescunt haec passu celeri, et aliquot iterum post annos jam pelyim, *vagina in longum ducta*, quod alio illustri exemplo quondam ulterius confirmabimus, exsurgunt. Quod vero carcinomati magis, quam scirrho, proprium est, febris continua et lenta virginem depascitur. Ac revera, in uteri antro intimiore jam est, qui hanc aluerit, sanguinemque impurum evomuerit, mollis, vel potius spongiosus, duriori substantiae uterinae firmiter infixus, tumor; ac jam diu fuit suspecta, versus ilia sinistrorsum pertingens, sub fluxu per vaginam majore, ac sub attactu magis colens, durities.

Sed maxime, quod nobis prima hujus commentarioli verba expressit, *parietum uteri* circa fundum *tenuitas*, ac vix non *membranacea* constitutio est. Sic omnem uteri substantiam prae tenuitate vix chartaceam, in alia muliere fuisse legimus (1). Huic forsitan structurae uteri in parte hac vel illa abnormi, frequens hujus visceris *obliquitas*, — huic non pauci *abortus*, in quavis graviditate eandem ad periodum subintrantes, — huic demum uteri hinc inde, sub moderato etiam violentiae illatae gradu contingens *ruptura*, et multa, quae

(1) Hopfengärtner, in Hufeland's Journal der praktischen Heilk. 1, B. S. 524. sq.

culter quondam anatomicus explicabit , uteri mala adscribenda sunt.

CEPHALAEA LETHALIS EX CRANII VITIO.

Virgo nobilissima *Vindobonensis* , tinea capitis per plures annos infantiae laborans, per externa remedia , quorum indoles ignota mansit , hoc a morbo rebeli liberata fuit. Quibus tamen e locis , tinea quondam correptis , pili defluxerant , vel morbi , vel medicamenti effecta hoc contigerit , perpetua illa calvitie , per *areas* distincta , laborarunt. Postquam menstrua comparuissent , ob vitam sedentariam , ob varios in victu errores , et ob animi pathemata ingrata , in chlorosin haec virgo incidit ; morosa tamen , ac sibimet relictas , auxilium medicum non petiit , aut unquam adhibuit. Hemicrania , ut videbatur , hysterica , frequentius tamen ex primis viis , seu stomachi vitio excitata , nec certam periodum observans , huic malo accessit. Haec igitur puella , anno 1796 , crudeli cardialgia et vomitu detenta , nec tunc quidem medicam imploravit opem ; post plures interim dies vel sponte denuo restituta fuit.

Die 15^a mensis augusti 1797 , quin diaetae vitium praecessisset , et cum lingua humida , ac pura , vomitum aegra ter passa est amarum , biliosum. Abdominis dolores magnos accusat. Alvus ab hesterna die clausa ; febris nullum in pulsu signum est . Infusum chamomillae , clysteres , emulsio ara-

bica et fomentatio ventris praescribuntur. Ad vespertas usque vomitus sexies et ultra recrudit, nec alvus hucusque soluta fuit. Tormina majora sunt. Praeter enemata, aqua florum chamomillae, liquor cornu cervi, et castorei tinctura propinata fuerunt. Versus noctem, continuante adhuc vomitu, quo ipsa medicamina, vix assumpta, illico rejecta fuerunt, quin pulsum mutaretur ratio, flatus involuntarii, et magna corporis jactatio accedunt. Post horam, dolor, quasi urens, ventriculum per vices detinet. Conatus vomendi continuo premunt; ab attactu, regio epigastrica dolet. Venter interim mollis ac indolens, alvus adhuc clausa est. Vini quidquam hispanici porrigitur, et hoc solum sat diu a ventriculo non rejicitur. Mox interim vomitus recrudescebat. Laudani liquidi nunc portio ingeritur cum pristinis. Balneo tepido aegra immergitur. Clysteribus, omni bihorio repetendis, electuarius, ut vocant, lenitivum superadditur. Haec interim singula, quin unico nycthemero vomitum aegra trigesies pateretur, non impediunt.

Die 14^a Ab hora quarta matutina, vomitus cessavit, dolorque ventriculi imminutus fuit. Venter mollis, pulsus sano similis, alvus tamen necdum soluta est. Sic diem sat bene, cum nausea quidem, sed absque vomitu, transegit. Alvus ad noctem parce satis deponitur.

Die 15^a Somno aegra gavisa est, et alvum tandem, a sana non alienam, depo-

suit. Nausea disparuit. Sequentibus diebus res bene incedunt. Elixir stomachicum praescribitur, et pauco satis tempore sanitas, quali nempe antea, satis fragili, fruebatur, restituta fuit.

Atqui hoc toto in morbi decursu, nihil quod ab insultu faeminis hystericis sat communi abluserit, hucusque observatum fuit. Ast vero, trium fere mensium spatio, haec eadem adfectio, *octies*, — nunquam tamen absque commisso in diaeta errore, recruduit.

Tandem die *quinta novembris* ejusdem-anni, post commestas dauci hortensis radices, ad noctem, in vomitum enormem incidit virgo. Atrocissima simul cephalaea eandem divexat. Jactatio, anxietas insignis, facies mutata, adfines et medicum consternunt. Sub tantis a morbo angustiis, aegra caput suum cum vertice super stragula, cœtero corpore profundius, ponit, atque hoc a situ doloris quoddam levamen per sentit; mox tamen, non sine convulsionibus, hanc positionem, alte exclamans, deserit, eandem mox interum desperabunda arripit.

Die 6^a cum et vomitus, et crudelis illa cephalaea nil remitterent, aliorum consilium medicorum nobis ipsis suadentibus, imploratum fuit. Eo ipso momento horrenda aegram convulsio invasit. Vitium in calvaria organicum subesse subolfecimus; in volatilibus tamen, et, ut vocant, antispasmodicis remediis continuandum esse conclusum.

fuit. Rediit quidem aegra ex tantis, quae mortis tunc jam pericula indicabant, convulsionibus; sed ad noctem, hae denuo virginem conquassant; et sic alternis vicibus cum dolore ad caput tremendo eandem dilaniant. Vertici nunc longius in tempus, corpore quasi inverso, incumbit frequentius aegra; vomitus crebrior cum viridissimae materiae rejectione, his aerumnis, per mortem demum, quasi apoplecticam, *die decima* novembris terminandis accedit.

SECTIO CADAVERIS.

Cadaver maculis lividi coloris, hinc illinc dispersis, notatum est. Adperto cranio, vasa cerebri quidquam turgida, nulla tamen inflammationis vestigia vel ipso in cerebro, vel in ejus membranis comparent. In posteriore processus falciformis magni regione, ubi inter lamellas durae matris sinus longitudinalis decurrit, in ipsa hujus membranae substantia, particula ossea, duas circiter lineas longa, et acuta, reperitur. Sublevatis cerebri anterioris lobis, *sellae turcicae lamina* posterior, perpendicularis dicta, dura matre, quae huic ossi periostium est, penitus privata, ad attactum aspera, et *corrosa*, pars vero encephali huic regioni respondens, suggillata observantur. Cerebrum sano longe mollius et flaccidius est. In ipsa demum calvariae superficie interna, versus suturam frontalem, adhuc conspicuam, praecipue ad partem sinistram, emi-

nentiae seu *excrementiae osseae peraculae*, durissimae, lineas aliquot longae, quae spinarum adinstar cerebrum pungendo sugillaverant, in conspectum cadebant.

EPICRISIS.

Quam atroci capitis, aut universi, aut in parte una vel altera, dolori faeminae imprimis chloroticae, hystericae, nunc fere perpetuo, nunc periodico, nunc vago, subjectae sint, fugit neminem. Causarum, quae cephalaeas innumerae producant, etsi non immemores, eam tamen; quae nostrae caput virginis affligebat, vel nervorum turbis, vel primis viis, toties ab aegra omnium ciborum genere obrutis, eo magis adscriptissimus, quod, nulla encephali functione perturbata, post unum alterumve diem dolor omnis dispareretur; ac novae accessionis ratio, semper, aut in animi pathemate, aut in diaetae vitiis ponenda videretur. Nec menstrua, quae rite semper fluebant, uteri forsitan culpam huic malo subesse indicabant. Accessionum tum frequentia, tum major indies saevitia, suspicionem quidem nobis, ne *tinea*, multis retro ab annis praepostere sanata, tantorum partem malorum haberet, — non sufficientem tamen, quo methodum medendi huic superstrueremus dubio, suggestit. Hoc interim dubium, sub ultima dolorum invasione ac indole, ad majores certe probabilitatis gradum apud nos evectum est; nec alia tum celebris *Stoerkii*, tum

expertissimi, ac amici nobis Viri, *Closseti*, ad consilium accersitorum, opinio fuit. Capitis praecipue in verticem, praedilecta aegra, positio, doloris aliquod, sub hac, levamen, vomitus continui, et convulsiones quasi epilepticae, esse aliquid profundo in cranio, quod encephalum stimulare, ac sub inverso capite minus in hoc ageret, indicare videbantur; sed breve satis a tali suspitione, ad mortem, intervallum fuit; nec, si anterior quoque fuisset cognitio, quid huic vitio organico prudenter opponi posset, ea nos docuisset. Nimis interim, ut sectionis historia docet, hoc ipsum confirmatum fuit. Non desunt certe, prout in *Epitome*, suo loco, exponimus, cephalaeae dirissimae, ex diversis impetiginibus, imprimis ad caput, praepostere sanatis, ex ossiculis in dura meninge, in processu ejus falci-formi, vel ipso adeo in cerebro repertis, vel cranii ex carie, vel spinosis excrescentiis, inductae, ac lethalis exempla (1); sed tantas his a causis inducias, tantam sub istis, functionum cerebri libertatem aegris concessas fuisse, si tamen ea vitia organica excipias, quae, nullum unquam aut dolorem, aut aliud quodcunque symptoma excitantia, ad mortem usque in calvaria latuerunt, rarissimum est. Qua ratione, capitis in verticem positio dolores aegrae quidquam saltem mitigaverit, sub constante

(1) Plura collegit G. G. *Ploucquet*, *Literatura medica digesta*, T. I. p. 214. 215. 217. 218.

calvariae, suo a viscere repletionem, perarduum est dicere; est tamen aliqua massae cerebrinae, in basin cranii ponderantis, sub eo situ corporis, sublevatio, et quam breve illa solatium virgini concesserit, jam diximus.

DE DIABETE ADNOTATIO.

Diabetis historiam atque indolem, ubicunque locorum artem medicam per quadraginta quinque fere annos, exercuimus, pro viribus prosecuti sumus; et prout in *Epitomes* L. V. P. I. §. 477 monuimus, » eundem scilicet frequentius, quam cum » aliis non ita pridem nos ipsi credebamus, » ubique locorum occurrere, et a medicis » in urinae *quantitatem*, aut *saporem* haud » satis attentis, non semel non adverti; » ita eundem, praeter rhenanas Germaniae provincias atque Italiam, et in Austria, et in Russia vegetare reperimus. Viennam scilicet anno 1795 ex Italia a Cesare accersiti, a medico practico tunc ibi praecipuo, etsi per novem lustra et ultra, millenos inter aegros versato, sibi nunquam diabete oblatum esse, admirantes percipimus; decem tamen annorum spatio in illa metropoli, quater, in Russiae vero Imperio bis observavimus. Cum igitur et *Galenus* testetur, modo duo sibi diabetis exempla occurrisse; cum *Aretaeus*, diabete « miraculum nominet haud ita saepius hominibus usitatum; » cum arabus medicus *Rabbi Moyses*, se, in

occidentalibus, diabetem nunquam, — in calidis vero regionibus, saepius, ac in Aegypto, decem intervállo annorum, vigesies conspexisse referat; cum, inter Recentiores, *Astruccius* in praegrandi Parisiorum Metropoli hunc morbum nunquam observare potuerit; quando *Cullenius*, in Scotia, viginti diabetis specimina vidit; et quando *Cohausenius* monuit, se diabetem in senescentibus hominibus non infrequenter vidisse, atque saepe contingere, ut viri et mulieres obesiores, sub insolita excretionem urinae, vel lente, vel subito, alia sine causa evidente contabescant; fateri sane oportet, medicorum observationes et hac in re non parum inter se repugnare.

Recte igitur *Pissinius*, qui octo veri diabetis exempla in Italia habuit, « jure, inquit, « dubitare licet, vel non raram esse diabetis adfectionem, vel quam diabeticam esse nonnulli sunt arbitrati, non esse diabeticam. An vero adfectionum similitudo scribentium aliquos deceperit, an potius nova quaequam coeli constitutio, vel victus ratio id nostris temporibus frequentius excitaverit, incertum est (1). » Sic et *van der Haar*, de suo aevo non tam rarum fore diabetem, si medici diligentius in urinae quantitatem inquirerent, admonuit (2).

(1) In libro inter nos raro: *Sebastiani Pissini*, medici Lucensis et patritii, Dissert. de diabete. Milano 1654 p. 27. 8. 9.

(2) V. Samml. auserl, Abh. f. pr. Aerzte, B. VIII. S. 41.

Facile interim concedimus, ante tempora *Willisii*, qui primus melleam urinarum in illo indolem observavit, nec non ante *Homii*, *Dobsonii*, ac demum ante chemicorum recentium labores, vel quascunque fere lotii secretiones solitis multo uberiores, haud paucis pro diabete imposuisse; vel antè *Cawleyi* de diabete decipiente experimenta, eundem hunc morbum non alibi, quam ubi urinarum multitudo exorbitans, tabes, ac sitis asperior, medicorum attentionem fortius succusserint, in suspicionem venisse. Etsi vero nostris temporibus lux diabeti non exigua accesserit; paucas tamen, quas hic inserimus, observationes non inutiles fore censemus.

DIABETES MELLITUS, PERIODUM ANNUAM
OBSERVANS, GRAVISSIMUS.

Dominicus Gemelli, 36^{um} annum agens, textor, jam a primis aetatis suae annis coeperat glandularum colli tumoribus affici, nec non frequentibus admodum narium haemorrhagiis laborare; quod quidem primum constitutionis vitium, ad annum aetatis decimum octavum prorsus disparuit, ita ut aeger, corpus sensim sensimque robustissimum nactus, optimo frueretur habitu; alterum vero, epistaxis nempe, ad hanc usque fere diem continuat. Largissimas siquidem narium haemorrhagias et adeo frequentes patitur, ut modo ter quaterve in hebdomada, modo bis, ter quotidie eadem compa-

reant, ac modo ad aliquot uncias, modo ad plures etiam libras ascendant. Haec a prima pueritia, ad annum aetatis trigesimum aequali fere tenore repetunt; nec ulla haec vel praecedunt, vel sequuntur morbosa phaenomena; caput enim hac in rerum positione semper est liberum, debilitas nulla est; quidquod viribus sat notabilibus polleat, et facie continuo gaudeat florida optimoque colore instructa. A viginti autem circiter annis, et tertium huic viro superaccedit phaenomenon: quavis scilicet die, mox a pastu, carbonis veluti accensi ac urentis sensus, a scrobiculo cordis incipiens, gradatim per thoracem ascendens, qui sensus flammae instar ubique expanditur, summe molestus hominem angit, excruciat. Salivatio nunc plurima exoritur; cogitur exinde textoris a munere abstinere; et vel aliquot mox gressus aeger instituit, vel frigidam affatim haurit, ut ustionis in pectore sensum exstinguat. Nullum vero certius auxilium experitur, quam ex *decubitu*; vix enim lecto sternitur, ibique per horulam quietus degit, cum, prorsus restitutus, mox proprium ad munus accedat. Per viginti sic annos quotidie redit haec adfectio; eandem constanter horam observat, post duas scilicet meridiano a pastu horas, et post totidem a coena, plus minus fortis, pro ingestis cibi natura, prout facilius hic, vel difficilior erat subigendus; et post horam, penitus hae turbae disparent. Hisce accedit et altera adfectio: nimirum jam a quin-

quennio faeces millenis vermiculis (ascari-
dibus) pollicaribus remistas aeger observat,
et insuper pruritus, tenesmus vel inanes
desidendi conatus ad anum experitur; unde
bis terque factum est, ut haemorrhoides ae-
gro mucosae moverentur. Coeterum quam-
vis ille his omnibus premeretur incommo-
dis; robustus tamen, pinguis, hilarisque,
propriis textoris muneribus intererat, noc-
tes transigebat placidissimas, et, uno ver-
bo, bene valebat.

Ast a duobus annis quatuorve mensibus,
insuetum, ac poene prodigiosum vermicu-
lorum, aliis quidquam magis extensorum,
et pollicis longitudinem referentium, glo-
merem, aquae simplici commistum, per
annum rejicit. Obstupuit aeger, dumque
haec miratur, *sitire* se praeter morem, at-
que os sibi humoribus privari percipit; sa-
livam mox albidam, viscidam, spumosa-
que fieri, perinde ac in siti, animadvertit;
quare semel et iterum plures frigidae cya-
thos haurit. Dies hic festivus erat, et ut
mos est apud ruricolae, omnes in unum
conveniunt, ut lusus inter et pocula, diei
solemnitatem celebrent. Sic et ipse amici
domum petierat, ut reliquam diei partem
cum isto transigeret. Hic vero acrior insur-
git magisque molesta sitis; quare amico
hanc rem insolitam exponit, et potulenta
enixe efflagitat. Amicus ille, vetusti dolium
adhuc integrum sibi superesse Falerni re-
fert; hoc, ad illius sitim extinguendam
aptissimum, encomiis extollit, et amicum

ad cellam invitat. Cum pluribus pateris, ac haustu multoties repetito aeger sitim ita fallere tentat. Ad suos redux, iterum iterumque sitim redire observat. Noctu haec ardentior insurgit. Omni fere momento aeger sitibundus a somno excitatur, et ut surgat aquasque hauriat, cogitur; quod equidem phoenomenon, cum post tres vel quatuor dies augeri vidisset: sitellam aqua repletam lectulo adposuit, atque hanc, spatio nycthemeri, potando deplevit.

Mox vero a primo sitis morbosae sensu comparente, *urina*, quae antehac modice fluxerat; summopere *adaucta* fuit; ita, ut omni momento ejusdem excernendae urgeret necessitas. Hisce se comites addunt *fames*, ac *debilitas*. Senserat scilicet aeger, jam a mali principio, appetitum ciborum sibi adeo increvisse, ut dupla vix sufficeret ferculorum quantitas. Senserat idem adeo sibi vires sufflaminari, ut laboribus textoriis longe minus esset idoneus. Post duos jam menses ad acumen morbus pervenerat. Sitis enim tunc erat ardentissima, nullo amplius potu fallenda. Si quid aeger a potu abstineret; vel ne biberet, ab amicis cogeretur; tanta mox et linguae et oris exorta est siccitas, ut vox ipsa fere faucibus harreretur, et intolerabilis aegro sensatio, potum ipsi extorqueret. Nulla hactenus et potulentorum ingurgitatorum, et urinae excretarum, mensura instituta fuit. Sin autem vel paucotemporis intervallo aeger a menjendo abstineret; vesica mox illi e pelvi assurgit, hy-

pogastrium intumescit; extenditur. Inter haec symptomata, *cutis* semper aegro fuit aridissima; nec ille, se vel levem sub hoc temporis tractu sudatiunculam expertum esse, reminiscitur. Hisce insuper accedunt pigritia insolita, inertia fere continua. Vix aeri aeger exponitur, mox leviter ille intorrescit. Tristis adeo et morosus, ex hilari, ut adstantium colloquia vix perferret, evadit. Corpus quoque *emaciatur* et contabescit; extenuantur artus et arescunt. Numerari jam costae queunt, et claviculae, et dorsi spinae protuberant. Exstant ubique venae, et cutis, corii instar, quamvis squamis nullibi oblecta, condensatur. Collabuntur tempora, omnisque corporis habitus adeo gracilescit, ut nihil ex eo, praeter cutem et ossa, supersit, ac *vera carniū adsit et membrorum in urinam colliquatio*.

Jam a primo sitis ingressu, ardoris molesta illa ad pectus sensatio disparuit, atque, illius loco, mox a pastu, insigne *pondus ad ventriculi regionem*, corpus summa vi inferius trahens, persentitur. Nec potest aeger diutius erectus consistere; sed lecto commissus, hoc sensu morbozo liberatur ille in totum. Narium consuetum cruoris profluvium, mox a prima siti morbosa, parcius simul ac rarius fuit redditum, tandem vero prorsus obmutuit. Quidquod cum fervidissimus antehac fuisset et in castris venereis non imbellis miles, nullam nunc penis erectionem, nullam liquoris seminalis excretionem, vel ab ipsa veneris praesentia,

obtinet, unde matrimonio prorsus ineptus evadit.

Rebus ita constitutis, chirurgum loci aeger consulit. Venam hic tundendam esse credidit. Aucto vero mox morbo, ad lactis cum aqua remisti usum, mentem miser convertit, atque pro potu ordinario eidem indulget. Per tres fere menses in istis continuat; cum vero sitis eodem tenore incederet, medicum loci aeger in auxilium accersit, qui cassiae pulpam isti praescribit. Nullum haec effectum exhibuit. Per longam igitur temporis moram, omni aeger medicorum consilio renunciat. Tandem, aucta indies macies pultem ex farina tritici paratam, dein panem lacte maceratum, nasturtium aquaticum, postremo iterum lac aquae commistum, consulunt, quibus singulis per menses aliquot, lacte vero integram per hiemem, adhibitis, nullum morbi levamen obtinetur.

Duos sic annos aeger transigit, siti, fame, urina, cutis ariditate ac debilitate iisdem semper persistentibus; quamvis pro varia tempestate coelique mutatione, varios quoque hic gradus agnoverit. Aestivo siquidem tempore observat aeger, sitim sibi adeo imminui, ut dimidia potus quantitas sufficiat; famem, e contra, atque debilitatem summopere augeri; accedente autumno, sitim denuo increscere, fame debilitateque tantillum imminutis. Observat idem, quod, ubi coeli mutatio instat, ac nubes pluvias collectae minantur, aucta tunc siti, dupla-

fere aquae quantitate indigeat. Nec una eademque die, omnibus aequè horis, sitis eadem urget; haec enim matutinas ad horas, minor, post prandium, major, ad noctem vero, maxima constanter esse solet.

Ante binos menses, dum coetera eodem in gradu persisterent, vel sponte *duae pustulae*, una utrimque ad coxas, ortae sunt, gradatim auctae, ardentes, dolentes, tandemque in ulcus apertae. Plura ulcera similia per coxas serpunt, ac pus quotidie copiosum fundunt. Tunc nosodochium *Ticinense* petit aeger, ac praeter dicta symptomata, somnolentiam quidem manifestat; sed oculos vix claudit, cum crudelis hanc potus necessitas mox omnem interrumpit; ut raro per horulam, rarissime per bihorium, aeger obdormiat. Alvus interea quotidie excernitur; vel saltem alternis diebus cum vermibus descriptis deponitur.

Pulsus mane tardi, et fere naturales sunt; vespere, constanter, cum calore cutis quidquam aucto, frequentiores ac pleniusculi reperiuntur. Epistaxis ab anno cum dimidio non amplius comparuit. Debilitas tanta est, ut pedibus aeger insistere nequeat, nec sellam perforatam adire, nisi sustentatus, possit. *Sapor urinarum* evidenter *subdulcis* reperitur; color vero limpidus, ex pallido serosus, vel stramineus detegitur. Matutinis horis, lotium parcum, vespere copiosius, ad noctem abundantius fluit; quo in puncto et sitis et urinae inter se correspondent. In ma-

tula per diem relictæ, hæc nec ullum *sedimentum* deponunt, nec *foetorem* quemcunque spargunt, sed incorruptæ eodem in statu permanent. Omnis in nosocomio cura, ab egregio chirurgo, in eo, ut ulcera sanaret, posita fuit. Cum vero aegri vires tam urinae quam puris evacuationibus frangerentur magis indies, cautior eidem victus concessus fuit. Tali pacto tractato aegro, ulcera, promississime in melius mutata, pus bonæ notæ ac parcius dederunt; illa vero lateris sinistri clausa fuerunt. *Die* mensis aprilis 17^a A. 1791 ad Institutum clinicum aeger admissus fuit.

Die 18^a mane, vix *quatuor*, ad *vesperas novem*, ad noctem vero *tredecim* aquae libras aeger potavit. Urinarum fere eadem quantitas excreta fuit. Nec autem istarum tam frequens, quam credi potuisset, evacuatio contigit: relaxato enim vesicae sphinctere, absque omni ardore, ad integram fere matulam lotium excerni solebat. Hodie insolitam aeger vertiginem accusat. Ad anum, pruritu insigni, tumore ac dolore simul tentatur; flatulentiae quoque, ut quibus aeger continuo fuit obnoxius, adsunt. Observat vero ille, quod sitis, ab ardentissima illa, qua tertio invadentis morbi mense vexatus fuit, summopere distet, multumque immutata sit. Fames quoque, primum fere canina, nunc ita, ut pars tertia ciborum, ultra illam, quam ante morbum consumere solebat, nunc sibi sufficiat, decrevit. In situ horizontali, molestum a pastu ventriculi sen-

sum non amplius aeger percipit. Vola manuum plantaeque pedum ardent, et calor in genere versus noctem, cum aliquo faciei rubore, pulsuque frequentiore, quidquam pleno, augetur. Noctes inquietae, ac somnus vix ultra horam dimidiam nunc extenditur. Parva opii dosi ante noctem conceditur. Haec, somnum tres quatuorve per horas induxit. Ab hoc, sitis minor fuit, ac tertia pars liquidi pro potu suffecit. Calor interim ac febris quidquam aucta fuerunt. Diebus insequentibus, ulcera denuo repullulant, majoremque puris copiam plorant.

Cum vero tunc *Josephus Frank*, cum urinis, ab aegro tantam ad copiam quotidie excretis, examen, ad *Homii*, *Dobsonii* et *eximii Marabellii* imitationem, instituisset; primo quidem *gas carbonicum* ex illis, per quasdam dies sibi relictis, quamplurimum elicit. Fermentationis alicujus igitur capacitatem huic lotio attribuens, fermenti pauculum ille huic commiscuit, ac, destillationis ope, *alkoholis* uncias aliquot ex libris viginti urinarum hujus diabetici, — *extracti* vero *saccharini*, pro quavis earum libra, unciam dimidiam obtinuit (1).

(1) His experimentis, quae exposita fuerunt, in *Josephi Frank Ratione Instituti Clinici Ticinensis* p. 261. 253, magni viri, *Jacquini*, filius egregius, per Galliam et Italiam Viennam rediturus, superaccessit, atque eadem cum celebri *Fourcroy*, qui mentionem illorum honorificam *annalibus suis chemicis* iniecit, communicavit.

Quod ad causas tam diri morbi spectat, si terrorem insignem, quem tribus ante morbum mensibus aeger passus est, excipias, nullius ille reminiscitur. Nullum certe in hepate, quod pridem hujus morbi sedem esse dixerunt (1), tumoris vestigium tactu reperimus; nec spasmis aeger, nec lumbagini unquam subjectus fuit.

Remedium *Griffithii*, in tabe pulmonali quidem plus aequo laudatum, sed tamen, ut videbatur, hoc in casu non spernendum, ex myrrhae extracto, sale absynthii, martis, in aqua cinnamomi vinosa solutis, praescribitur.

Mox ab hoc medicamine diarrhoea insecuta est, et major abhinc successit debilitas. Quare, per aliquod saltem tempus, illud illico suspendimus. Praeterea vero summi ad nates dolores successerunt. Pars ita adfecta gradatim tenditur, tumet, et brevi temporis intervallo, fluctuans sub illa materies detegitur; unde sectione mox instituta, prodigiosa puris foetidissimi copia prorupit. Cruris ulcera, colore foedo instructa, pus parcum, non bonae notae, fundebant. Proserpunt ea huc illuc, ac, sordida, sinus amplos relinquunt. Ut in latam superficiem hi omnes verterentur, sinuum singulorum incisio imperata fuit.

Insignis vero, sub novo ad nates abscessu, rerum mutatio insecuta est. Sitis nem-

(1) *Rich. Mead*, Opp. tract. de vipera, p. 39. *Israel Marx*, diss. de diabete. Goettingae 1775.

pe, bibendi necessitas, ~~fames~~, non modo imminui, sed fere aboleri observantur. Unius nycthemeri spatio tunc aeger vix quatuor libras aquae hausit, duasque modo matulas mingendo implevit. Calor vespertinus jam fere nullus: vix aliqua in pulsibus frequentia est. Integras nunc noctes placido sub somno aeger transigit; aliquis per duas jam noctes sudor comparuit. Urinae, quae antehac vel minime foetuerant, odorem nunc alcali quasi volatilis teterrimum naribusque infensum spargebant; alvus liquida bis terve in die movetur. Pristinum igitur medicamentum, salis tamen absynthii dosi immixta, praescribitur.

Die 28^a sitis, potus, et urina, eundem habitum ostendunt. Fames quidquam aucta, facies hilarior, pulsus fere naturales, calores vespertini vix ulli sunt. Somnus satis quietus et longus, alvus bis soluta et liquida, sudor nullus est. Cum vero mox alvi fluxus augeretur; post duas dies sal absynthii suspensum fuit.

A 1^a Maji ad 8^{am} perbelle res incessit, tunc vero circa nates et crura dolebant magis ulcera, aliqua sitis aderat, et vespertina pulsum frequentia. Remittunt interim post quatuor dies haec symptomata, et in omnibus aeger sublevatum se sentit.

Die 20^a Sitis minor, ac dimidia potulentorum suffecit aegro quantitas; eadem urinarum proportio est. Ab hoc tempore, usque ad dimidium mensis augusti, aegrotus in clinico remansit; quo tractu temporis

sanabantur ulcera, neque multa morbus offerebat symptomata. Sitis nempe vix ulla, hinc et potus et urinae vix naturales excedebant. Morbosam istae dulcedinem amiserant; fames vero aucta fuit, noctes placidissimae, carnes et vires indies redibant.

Domum reduce aegro, per quindecim adhuc dies eodem convalescentiae statu ille permansit. Ast primo mensis septembris sub adventu, defervescente solis aestu, mutatur illico morbi facies, et priora iterum, sed pejora, symptomata ingruunt. Jamque sitis iterum se prodit ardentissima, inexplebilis: quae, licet continua, certis tamen horis, constante quasi morbi lege, intenditur, aut remittit. Mane siquidem vix expergefactus est aeger, cum omnium asperior ac violentissima haec urget. Copioso tunc hausto potu, liquidorum desiderium remittit post bihorium. Duabus a prandio horis vix elapsis, hoc iterum, etsi minus, increscit, sedatur denuo; donec simili post coenam tempore, iterum augeatur, sed mitius coeteris. Sitis intensitati et gradui, potus quoque copia respondet. Tanta vero illa est, ut interdum vix *pintae* aquarum *quatuordecim* sufficiant. Largissimo vero huic potui nonnulla confestim succedunt abdominis incommoda: praeccordiorum scilicet angustia, ventris tensio et gravitas, borborygmi, tormina, molestaque fluidi huc illuc percurrentis, ad ilia imprimis descendens, sensatio; quae quidem singula, erumpente copioso urinarum profluvio, desinunt.

Lotii porro secretio, tum siti, tum potui, quoad tempus, minus respondet. Cum enim haec mane essent maxima, minora vespere, et ad noctem vel omnium minima; illa, e contrario, matutino tempore vix ulla, vespere major, omnium vero maxima ad noctem observatur. Si quis ordinem, quo vere elapso tum sitis, tum potus, una eademque die, variis tamen ejusdem horis, augebantur et remittebant, cum illo, quem hoc autumno servant, contulerit; varietatem et in hoc subesse, perfacile sentiet. Praeterea paulo profundior nunc urinae color est, quam vere elapso fuerit; etsi sapor aequae dulcis in illa se prodat. Continua vero et nunc ad somnum est propensio, quam facile continua, vel potandi, vel mingendi necessitas, et somni vel brevissimi repetita interruptio, explicant.

His sub aerumnis corpus iterum contabescit, excavantur orbitae, et cutis haeret ab ossibus. Debilitas summa gressus impedit; pedes vix atollere aeger, ac digitos vix flectere potest. Pollices manuum pedumque, prae aliis torpent, ac sensu fere destituti jam ab anno languent. In hac vero adynamia, sensum membrorum quasi contusorum aeger refert. Post pastum assumptum, mox debilitas major fit, per horas aliquot, prae aliis, extensa. Spectabilis vero ad oculos, a paucis tantum diebus, mutatio aborta est; nam cum antehac acutissima polleret visus acie, objecta nunc aeger, ad decem vix passus posita, distinguere nequit. Coeterum et

vespertina iterum febricula, et cutis summa ariditas ut hieme ac vere elapsis, rediverunt. Interrogatus aeger, num inter potulenta, quae sors ipsi vel ars hactenus supeditaverint, genus quoddam distinxerit, quod ad sitim exstinguendam, prae alio, satisfecerit? *Vinum* hoc esse refert, quamvis et *lacti* vimaliquam inesse concedat.

Tam flebili igitur in statu, hiemem iterum transegit, ac aestivam stationem attingit aeger. Remittunt tunc singula symptomata. Coeterae vero functiones corporis peraguntur quam optime; mens libera est, spiritus facilis, appetitus ciborum viget ac auctus est; cibos vero *siccos* abhorret aeger, humescentes desiderat. Alvus quotidie movetur, nulli unquam dolores accusantur. Dentes adeo firmi sunt, ut trium spatio annorum nonnisi unicum ex illis amiserit, et si debilitatem maciemque hominis excipias, reliqua, ut sanis esse solent, se offerunt (1).

EPICRISIS.

Periodici exempta diabetis non desunt (2). Nostro vero, ex propriis iterum diariis, alte-

(1) Morbum cum summa praecisione ac industria conscripsit Auditor noster *Joannes de Felici* Med. Doctor. Aeger nunc iterum ad suos reversus est, nec sors ejusdem ulterior ad nos usque, quod dolumus, pervenit.

(2) Plura collegit *Trnka*, de diabete *Commentarius* p. 11. sqq. Refert etiam *Butter*, *Treatise on the Kinkcough*.

rum hic breviter subjungimus. *Antonius B.* initio novembris 1789 repente subriguit, incaluit febre exigua. Accesserunt levis cephalalgia, *sitis inexplebilis*, oris amaror, borborygmi, tormina ventris constipati. Altera die, mane, omnia remittunt, surgit et labores peragit; sed eadem iterum hora, febris illum adgreditur. Idem typus ad plures dies protrahitur, donec nullum amplius ea servet ordinem, et modo horis matutinis, modo ad meridiem, modo versus noctem, febris accederet, non semper sat manifestis remissionibus intermediis. Sic per duos menses et ultra cum morbo conflictatur aeger, nunc debilissimus. Sitis jam magis urget, neque ad eam, noctis imprimis tempore, fallendam, viginti aut viginti quatuor librae aquae sufficiunt. Urinae copiosissimae sunt; sed potum copia non superant. Dolor insurgit in regione umbilicali vehemens et fixus, qui post nycthemerum imminuitur, mox vexante dolore ad *suras*. Alvus pertinacior, appetitus tamen viget. Die prima martii 1790 clinicum Institutum *Ticinense* adivit. *Die 10^a* martii nullum nobis de diabete mellito dubium superfuit. *Die 23^a* mensis junii, hoc a morbo convaluisse visus, ad suos aeger decessit. Ineunte vero mense novembre, quo, anno elapso, morbus incoeperat, diabetes iterum recrudit, ex quo, jam sub fine decembris ejusdem anni, aegrum domi e vita excessisse, experti sumus. Per aliquas ante obitum hebdomadas, urinas parce,

et cum summo dolore fluxisse, relatum nobis fuit.

Concludimus ex istis : *non satis fidas semper esse diabetes sanati, nisi morbus per annum et ultra non rediderit, historias.* Atqui haec ipsa morbi, ad annos saepe tres, quatuor, et plures adeo extensi, longitudo, in causa est, quod raro in nosocomiis, vel etiam sub vulgari artis exercitio, integra ejusdem delineari queat, fidelis satis, imago. Vel enim plures per annos in nosodochiis detineri aegri aut nequeunt, aut nolunt, vel extra illa, curationis, plerumque inutilis, taedio correpti, a medico ad medicum confugiant, ac morbi sic historias detruncant. Cum autem post nostra circa diabetem (frequentius nobis, quam medicis, etiam senioribus, multis aliis, oblatum) tentamina (1), egregia hoc de morbo monographia comparuerit (2); melior sane, quam quae nobis tunc nota fuisset, et quae in omnimoda a victu vegetabili abstinentia potissime consistit, medendi methodus simul fuit exposita. Eadem vero hic,

(1) Epitome de curand. hom. morb. Lib. V. P. I. §§. 476 — 483. p. 38 — 67. Mannhemii 1794.

(2) Cases of the diabetes mellitus; with the Results of the Trials of certain acids, and other substances in the cure of the Lues venerea. By John Rollo. 2e Edition. London, 1798. In germanicum Idioma hanc editionem transtulit Auditor noster, Dr. Heidmann, Viennae 1801. Etsi vero cl. ille Auctor, operis sui eximii exemplar nobis humanissime communicaverit; nostri tamen, eundem circa morbum, laboris, forsitan tunc in Anglia necdum satis cogniti, mentionem non injecit.

ut experti loquimur, medicos difficultas expectat; rari nempe inter nos aegri sunt, qui *solo victu animali* per annum et ultra contenti vivant; atque dum *Vilnae*, sub isto, urinas juvenis diabetici revera suam deposuisse dulcedinem observassemus; post viginti jam dies, aeger, cui panem adeo detrahi jusseramus, » se tanti vitam non emere, « respondit, ac ad victum vegetabilem simulac animale reversus, mellitas iterum urinas excrevit.

Ob tantam igitur morbi extensionem, incompleta est ejusdem, quam hic tradidimus, historia; non tamen ideo, ut supponimus, Lectorum attentione indigna. Ac primo quidem, *narium profluvium cruentum*, cui a prima pueritia, ad annum aetatis usque trigesimum vir hic adsueverat, mox a prima siti morbosa, parcius simul ac rarius comparuit; tandem vero prorsus conticuit. Nec a tam largae, ac fere quotidianae secretionis cruentae suppressione, urinae illam, a sana alienam, excitari *posse*, quicumque ipsum hydropem *energicum* a tali causa hinc inde oriri non ignorat, negaverit. Alterum morbi nostri momentum in ardoris, *ustionis* ad cordis scrobiculum a pastu perceptione est positum. Languentis, ac acidam in crambem proni ventriculi illa sensatio effectus est; et qui impeditae ciborum assimilationi diabetem attribuunt (1) hoc lubenter phoenomenon in

(1) Dr. *Place*, Diss. de vera diabetis causa, in defectu assimilationis quaerenda. Goettingae 1784. Ante hunc, jam *Listerus*, in Exercitat. med. de morb. chron. p. 71. *Cullenius*, first Lines §. 1448; alique.

partes suas rapiunt. Nec tertium symptoma, quod *ascarides polliculares* in casu nostro, ad anum excitarunt, ab illis, qui morbos vix non omnes ex vermibus deducunt, praetervidebitur. Majoris, aliis, ponderis esse, *terror*, tum ille, quem aeger ex inopinato vermium in glomerem convolutorum aspectu, mox insequente siti insolita, passus est, tum insignis alter, quem tribus ante morbum mensibus idem subiverat, videbitur. Quos vero humoralis magis pathologia delectat, illi et pustulis ad coxas utrimque exortis, et ulceribus, tum ad istas, tum ad crura serpentibus, et ingenti denique abscessui, foetidissima materia impraegnato, quasi *criticae*, in homine puerili sub aetate scrophuloso, *metastasi*, subsequens mox conspicuum aegritudinis levamen adscribent.

Quotidianae vero et communes nimis pleraeque ex his causis sunt, quam ut morbum rariorem satis explicent. Innumeri sunt homines, quibus sanguis per annos e naribus, pulmone, intestino recto, vel utero profuse disperditur; medios tamen inter illos, pars medicorum, etiam seniorum, vel maxima diabetem vel ex nomine modo novit; nec si haec mali scaturigo esset, aut hujus morbi sanatio tam rara, aut in victu animali potissime quaerenda foret. Familiare admodum debiles apud homines symptoma, *acidorum* in ventriculo evolutio est; ac si *farnem* haud raro haec excitent, absurdorum, parumque nutrientium ea potius ac inordinatum desiderium est; et quae hoc

sequitur laboriosa et difficilis assumptorum subactio, ea diabeticorum in cibis subingendis promptitudinem nec a longe quidem adaequat. Nec de *siti* violenta, eos, qui *soda* laborarunt, conqueri unquam audivimus. Interrogavimus quondam diabeticum, in clinico Instituto degentem: num *acidum* in ore *saporem* perciperet? atque constanter hunc ipsum adesse negavit. Nec duo *Homii* aegroti diabete adfecti, hunc saporem in ore accusabant, aut tumidum abdomen offerebant (1). Salivam quidem *vermes* pueris, diarrhoeam aliquando tum his, tum etiam adultis movent, ac suo in nervos abdominis stimulo, ipsum adeo systema uriniferum attingere queunt; sed qui in puerulo vel ex dentitione, vel ex vermibus venisse refertur diabetes (2), ille auctus potius urinarum fluxus, quam lottii ipsius a statu sano aberratio fuisse censendus est; et qui *spasmodum* pro diabete causa assignant (3), hystericarum illi urinas, per diem unam alteramve copiosas et limpidas, cum morbo toto coelo diverso confundunt. Sic *terror* utique urinas alvumque subinde movet, nec tamen illarum indolem, nisi momentaneo influxu, pervertit aut immutat.

(1) Principia medicinae, Clinical lectures, histor. and dissections.

(2) Jo. Herm. Fürstenau, Acta phys. med. Vol. V. Obs. 61. p. 240.

(3) Richter, chirurg. Bemerk. I. B. 4. C. S. 76. 77. 80. 81. 82. Nicolai, progr. de diabete ex spasm. Jenae 1772. Cullen, first Lines. Trinka, l. c. p. 43. 44.

Dum vero nos ipsi, in *Epitomes* L. V. P. I §. 481. p. 36. 37. pustulis in aegro nostro ad coxas, cum levamine morbi, exortis, quasi criticae metastasi, nimiam forsitan et aliorum observationibus (1), et nostrae, auctoritatem concessimus; fassi tamen jam tunc sumus: « morbum quidem illico disparuisse, post longam tamen moram rediturum. » Ac revera, cum et ante annum, quin ullae pustulae prodiissent, sub aestivo scilicet calore, diabetes ille vix non evanuerit; non his pustulis aut ulceribus, etsi novus in alia parte stimulus, principalis morbi suspensionem secundare, vel accelerare omnino potuerit, sed *periodi* imperio, tam prompta morbi in melius conversio adscribenda esse videtur. In explicatione vero hujusce periodi, non minus, quam in cujusvis alterius circuitus morborum enodatione, nos prorsus coecutire, lubenter concedimus. Diabetem systemati vasorum lymphaticorum interno, ad promptiorem avidumque nimis chymi, ac principii in eodem saccharini, necdum satis subacti

(1) Metastasium, diabetem sistentium, exempla plura collegit *Trnka*, l. c. 102 -- 104. Ex suppresso adeo fluore albo, diabetem venisse, refert idem; de Leucorrhoea, p. 131. Puella *Parmensis*, cujus historiam refert *Tommasini*, quoque vere impetiginis speciem pati solebat, sub qua in coeteris perfecte valere solebat. Quo vero anno, mense aprilis, diabete laborare coepit, vel effectus, vel causa sit, impetiginem sibi solitam experta non erat. *Jacopo Tommasini*, Storia ragionata di un diabete. Dalla Reale Tipografia Parmense, 1794. p. 6.

et in animale naturam conversi, resorptionem excitato adscribendum esse, sicut, quondam in *Epitomes* l. c. §. 481 indicavimus, ita adhucdum supponimus; pathologiam olet haec quoque opinio, quod negare non possumus, humoralem; cum tamen crassiorem illam nos ipsi jam diu rejecerimus; ab omni culpa corporis animalis liquida liberare in omnibus non possumus. Nec magnas amplius, ut quondam verebamur (l. c.) *diabetes insipidus* difficultates nobis pariet, cum mulieris, a *Josepho Frank* ex hoc ipso diabete, A. 1799, in nosocomio *Vindobonensi* pertractatae, urinae, per cel. *de Jacquin* chemicae analysi, submissae, non dulcem quidem gustum, sed neque saporem, neque odorem, neque alia principia, quae urinis sanorum sunt propria, manifestaverint.

Singularia quaedam ac insolita in aegro nostro phaenomena sistuntur: unum, quod, *ustionis* ad ventriculum sensu molesto affectus, certum in *decubitu* per horulam quieto, qui aliis, a soda correptis, haud confert, auxilium habuerit; alterum, quod a primo sitis morbosae ingressu, ardoris illius sensatio disparuerit; et ultimo in illam *ponderis* ad ventriculum, corpus inferius trahentis, conversa sit. Difficile est, indubiam de omnibus, quae in morbis, imprimis complicatis, ad viscera succedunt, rationem reddere. Erit forsitan aliquando plaga una ventriculi, frequenter stimulati, sensibilior altera: sub qua, corporis in hanc,

vel aliam partem positio, irritantis acidi effectus divertat, imminuat, vel augeat; vel supino sub decubitu, fluidum ventriculo infestum, viam sibi ex isto, in duodenum parat. Comparente tandem siti morbosa, potus quantitas assumpti, crambem acidam, diluit, ac ventriculo detenta, ponderis ibi sensum ustioni substituit. Coeterum attentionem meretur, aegri, de *vin*o, in siti moderanda, prae aliis proficuo, ac de *lacte*, post vinum, sitim magis fallente, assertio, quae certe cruciatus ex acido in aliis adaugent. Cum tantam principii saccharini jacturam apud diabeticum *Ticinensem* miraremur, lactis, cum saccharo commisti, usum liberalem, pro potu, concessimus. Non juvit quidem tentamen, erroneo innixum iudicio; sed tamen id aegro acorem, aut pondus ventriculi causasse, experti non sumus. Dentes aegro nostro, praeter unum, omnes plena integritate substitisse, cum *Homii* aegro diabetico, sub fine morbi, gradatim dentes numero sexdecim exciderint, si coeteris aegris, quos eodem ex morbo tractavimus, dentes ullo modo laborassent, miraremur. Praevium *emollitioni ossium* diabetis exemplum referunt *transactiones philosophicae* (1).

DIABETES CHYLOSUS.

Josephus Antonius Gorini, hortorum cultor, 70 annorum, post insigne pondus humeris per tria milliaria superimpositum, vix octo praeterfluxerant dies, prehenditur magno ad ultimas lumborum vertebrae dolore. Nosocomium hinc *Ticinense* petit, mense junii 1791. Febris hic quotidie ad meridiem exacerbatur. Balneis, aliisque auxiliis adhibitis, senex a morbo restitutus videbatur; sed post mensem, parvus iterum dolor ac febricula eundem invadunt, quae, exiguis intervallis, suspenduntur, et redeunt. Tandem a quindecim diebus, dolores ejusdem, ac pridem, indolis, sed lancinantes, pungentes, ac admodum vehementes, simulque febricula, omni vespere exacerbanda, insurgunt. Post quatuor dies remittunt hi dolores, non cessant, febricula continuat. Talibus vero ad lumbos doloribus alii respondent ad hypogastrium, cum pruritu ad penem, non tamen continuo. Attentionem vero merebantur quoque sitis et urinae copia insignis, quae in primis hisce diebus quindecim primo fuerunt animadversae: cum duas potulentorum amulas hauserit, et tres urinae matulas, nycthemeri spatio cum urinis repleverit, non sine conspicua corporis, antehac torosi ac succipleni, macie. Urinae sapor subdulcis fuit.

Cucurbitulae octo scarificatae lumbis admotae, ad locum doloris, vesicans emplastrum, purgans alvum ex tamarindis reme-

dium ob oris amarorem, et decoctum hordei pro potu, praescripta fuerunt. Dolores haec lenierunt, alvus aliquoties mota fuit. Appetitus ciborum viget, et victum lautiorē aeger sibi expetit. Interim dolores adhuc aliqui ad lumbos et ad hypogastrium; sitis et urinae copia continuant.

Die 5 Octobris, urinae ad quindecim libras et ultra minguntur, quasi lactei coloris. Hodie sitis minor fuit. Aliqui adhuc ad spinam et ad hypogastrium dolores.

Die 6^a Urinae pauciores, licet sapore urinoso non instructae, dulcedinem tamen haud offerunt, simul vero crassiores ac profundius tinctae sunt. Dolor ad lumbos et ad hypogastrium minus urgent.

Die 7^a Amulam aeger potavit, ultra binas minxit. Sitis hodie et urina pauciores sunt, dolores fere nulli.

Die 9^a Duas heri amulas potavit aeger, duodecim vero urinae libras minxit. Urina vitro suscepta *lacteum* omnino prae se fert colorem. Dolores adhuc aliqui ad lumbos.

Die 10^a Urinae vix ad octo libras, potus ad amulam. Sudor, a multo jam tempore, nullus. Urinae interdum paucae; ad noctem, quod fere constanter accidit, uberimae. Dolores nunc nulli.

Die 11^a Urinae iterum, ad duodecim fere libras, auctae, colore serum lactis aemulantes. Potus duas ad amulas. Dolores nulli.

Die 12 Heri amulam potavit; decem circiter urinae libras minxit. Dolores nulli.

Die 13^a Sitis magna; amulam potavit, libras decem circiter minxit. Dolor nullus.

Die 14^a Quinque libras aquae hausit, octodecim urinae minxit. Profundioris hae coloris sunt, ac sedimentum album deponunt. Major urinae copia constanter ad noctem excernitur.

Die 15^a Libras quinque liquidi ingessit, sexdecim vero minxit. Sedimentum in urinis album, mucosum, cremori lactis simile se offert. Dolores nulli.

Die 16^a Vingt-tres libras urinae excrevit, quinque vix libras aquae potavit, excepto scilicet vino et jusculis ad prandium coenamque assumptis. Dolores nulli.

Die 17^a Quinque libras potavit aquae; sexdecim urinae librae sunt.

Die 18^a Octodecim urinae libras excrevit. Potulentorum quantitas quinque librarum fuit.

Die 19^a Quinque libras aquae ingessit, viginti unamque libras lotii excrevit. Vespere, calor parvus, pulsus frequentior, os siccum, observantur.

Die 20^a Potus ad libras quinque, urinae ad libras octodecim ascendunt.

Die 21^a Urinae librae sexdecim, cum potu hesterno, fuerunt.

Hactenus, ac donec lux major diagnosi accederet, negativa quasi medendi fuit ratio. Nunc decem grana aluminis omni bithorio cum saccharo porriguntur.

Die 22^a Sitis nonnihil imminuta, pau-

cioire potu indiguit. Urinae tamen novemdecim librae excretæ fuerunt.

Die 23^a Urinae librae septendecim, sub siti fere hesterna, defluxerunt. Tormina sese manifestant, mox vero iterum disparent.

Die 24^a Sub potu fere hesternò, urinae librae tredecim excretæ fuerunt. Tormina nulla sunt. Aluminis nunc grana quindecim porriguntur omni bihorio, ac serum lactis aluminosum pro potu porrigitur.

Die 25^a Urinae librae octodecim, potus idem fuerunt. Aluminis grana viginti per bihoria propinantur.

Die 26^a Urinae libras octodecim, sub potu eodem, constituunt. Alumen, præter serum aluminosum, ad grana viginti quinque praescribitur.

Die 28^a Tredecim libras lotii minxit. Tormina aliquot; alvus constipata. Alumen ad drachmam dimidiam assumitur.

Die 29^a Urinae nonnihil imminutæ. Alumen ad grana triginta quinque augetur.

Die 30^a Decem tantum libras urinae minxit. Aluminis grana quadraginta exhibentur, cum sero lactis prædicto. Tormina nulla, alvus constipata.

Die 31^a Urinis fere iisdem, aluminis grana modo quatuor, cum sero, ingeruntur.

Die 1^a Novembris. Febris heri vespere aliqua cum doloribus ad vesicae lumborumque regiones; sitis aucta. Urinae libras viginti quatuor aeger minxit; alvus clausa,

tormina, et turbæ nonnullæ. Suspenditur alumen, ac duo vesicantia lumbis adponuntur. Absolutis feriis academicis, aeger ad nosodochium deferitur. Nova hic se diabetis symptomata manifestarunt. Aeger idcirco, curationis inutilis tædio prehensus, ad domum propriam se contulit. Sors illius ulterior ignota mansit (1).

EPICRISIS.

Tam ex violentia externa, morbum hic breviter modo expositum prægressa, quam ex primis ejusdem phœnomenis, fatemur, nos minus *diabetem*, quam aut *nephritidem*, aut *spinitidem traumaticam* expectasse. Hinc in *Epitomes* L. V. P. I. §. 479. p. 40. diximus: « multis *purulentam*, cum
« urinis certe non raro copiose remistam,
« pro *chylo* imposuisse, suspicamur mate-
« riam. « Praesentis interim casus occasio-
ne ibidem subjunximus: « non interim *lac-*
« *teum* colore diabetem, viri scilicet sep-
« tuagenarii hoc in *Ticinensi* nosocomio
« degentis, observatione freti, existere pror-
« sus negabimus. « Quodsi nempe appeti-
tum ciborum vigentem, sitim maximam,
insignem urinae subdulcis quantitatem quo-

(1) Historiam hujus morbi nobis communicavit jam laudatus Dr. *Joannes de Felici*, qui tempore feriarum academicarum, aegros, in clinici Instituti cubiculis degentes solus pertractare solebat.

tidie , per duos menses , excretam , et corporis , antehac torosi , maciem conspicuam spectemus ; praecipua sane diabetis melliti symptomata , — etsi colorem urinarum quasi lacteum , sedimentum in illis cremori lactis fere simile , miremur ; diabetis simul *chylosi* , *chyluriae* , *coeliacae urinalis* auctorum , phaenomena coram oculis versantur (1). Ex altera tamen parte , considerando : sitim per plures dies vel a quinque libris aquae potuisse sedari , — urinas , die 6^a mensis octobris , etsi sapore urinoso haud instructas , non tamen dulces , aut limpidas , sed ea die non minus , quam 14^a ejusdem mensis , profundo colore tinctas , ac simul crassas fuisse , — de dulcedine urinae hinc modo in locis mentionem interjici , — chemicam vero urinarum analysin , quae saccharinam ex illis materiem , evaporationis ope , eduxisset , nullam , quod sciamus , institutam fuisse ; dubium , si non de diabete , saltem de chyluria , eo minus suppressere valemus , quod a diuturna ponderis gravioris gestatione , et dolor magnus lumborum , et febris , quotidie ad meridiem exacerbari solita , — post mensem vero febricula lenta cum dolore lumborum lancinante , pungente , vehementiore successerint ; qui dolor ,

(1) Plura diabetis chylosi , vel lactei exempla collegit *Trnka* , Commentar. de diabete , c. 1. p. 807. Nunquam vero hic auctor ipse diabetem conspexerat. Hanc speciem cum fluxu coeliaco compararunt ; et coeliacam urinalem vocavit *Ettmüller* , in colleg. pract. Sect. 19. c. 1. art. 3.

ex lumbis cum hypogastrio respondens, et pruritus ad penem aliquando inducens, paulo ante ac urinae lacteae secederent, imminutus fuit. Non quidem hic vomitus, qui, praeter recensita symptomata, *renis* inflammationes comitari solet, — non inferiorum paralysis artuum, quae internos spinae lumbalis abscessus insequi consuevit, praecesserunt; ast vero symptomatum istorum absentia, suppurationis illam vel renalis, vel spinalis non comprobat; penis autem ille pruritus, de rene, aut vesica adfectis, quamvis aeger dolorem ad ultimas lumborum vertebrae retulerit, non aequivoce facile testimonium largitur. Est igitur, cur internam purulentiam, praeter diabete, eo magis allato in morbo suspicemur, quod jam *Ruyschius*, binos casus similes, id est *abscessus renalis cum diabete* exempla, descripserit (1); qua sub rerum positione vel *lacteum*, vel *chylosum* eo minus appellari hunc diabete vellemus, quod aut pus, aut humor puriformis aut forsitan mucosa etiam materia, copiose cum urinis remista, tum odorem lotii, tum saporem pervertere, ac forte adeo hunc ultimum *subdulcem* reddere, etsi aut chemica analysis aut gustus hoc necdum evicerint, videantur.

Coeterum, cum dubia hinc inde mota

(1) *Observ. anat. chirurg.* 13. et *dilucid. vul.* cap. 4. *Obs.* 13.

fuerint, num in ipso diabete urinarum copia liquidorum ingestorum pondus superaret? exposita historia, in qua potulentorum ac urinarum mensura fideli calamo quotidie adnotata fuit, quaestionem hanc solvit. Etsi etiam a nobis in genere non aurificis statera, sed oculari modo judicio tam potus, quam urinarum quantitas apud nostros diabeticos examinata fuerit; longe tamen majorem istarum, quam illius copiam fuisse constanter reperimus. Sic, ut pauca modo, ex multis exemplis referamus, aeger, ex diabete, in *Edinburgensi* nosocomio A. 1778 defunctus, cum ultra quatuor libras non bibisset, libras tamen urinarum duodecim minxit, et urina semper potum duabus pintis superavit apud *Cullenium* (1). Sic puella Parmensis saepe duplo majorem potu urinae quantitatem minxit, sumpta cum studio liquidorum ingestorum cura (2).

Ne tamen ad diabetis praesentiam, copiam urinae potu semper majorem requiri credamus, sicut nos ipsi in morbi hujus definitione animadvertimus, §. 478 tam *Rol-*

(1) Dubitavit *Bosquillon*, in opere hujus viri, in Gallicum idioma a se ipso translato, tam insignem urinae copiam potuisse excerni. Diabetem certe commentator ille non viderat, cum et *libras quinquaginta duas* lotii, una die, hoc in morbo evacuari conspexerimus, raro tamen satis exemplo.

(2) *Tommasini*, l. c. p. 8.

loi (1), quam *Cawleyi* (2) observationes ventant.

DIABETES CUM DOLORE PLEURITICO.

Ignatius de Filippi annorum 36, agrorum simul possessor et cultor, antehac robustus, sanus ac pinguis, in cibo potuque sobrius, cum pridem colles inhabitasset, hos, sex abhinc annis deseruit, ac profundius prope *Padi* fluminis ripas, habitaculum elegit. Hic vero parens ejusdem, munere chirurgus, filio consuluit, ut, si hoc in solo humidiorē saluti propriae prospicere contenderet, in vini usu frequentiore hanc quaereret. Paterno igitur suasu coepit quotidie binas vini pintas et amplius haurire, usu autem continuato augebatur indies meri desiderium bibendique necessitas. Post annum, a quo vinum majore copia hauriebat; sitim adauctam percipiens, quam consueta illius portione satis fallere non potuerat; rem male cessuram praevidens, ad aquam reversus, totidem hujus pintas quotidie potavit. Tres sic annos ad *Padi* lectum, salute prospera gravisus, transegit; his elapsis, ad patrios colles se contulit, ac, eidem vitae ritui fidelis, per

(1) „ We have hitherto found the quantity of urine to correspond with the quantity of fluid actually drank. “ *Rollo*, l. c. p. 391.

(2) *Medical giornal*, Vol. IX P. 3. An. 1788. p. 286. transl. in *Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte* B. XIII. S. 102.

biennium sanus hic vixit. Nec enim, praeter sitim, aut ciborum desiderium, aut alia functio morborum quid habebat; nec major fuit urinarum, quam potus ratio. Mense vero novembris 1788, sitis inextinguibilis hominem ex improvise, quin causa ipsi nota praecesserit, adortur; quam sitim ut falleret, sex, pluresve aquae pintas, atque simul unam alteramve vini, assumebat. Praeter potus desiderium, ciborum quoque illud, ad voracitatem usque, adauctum fuit; nec interim in secretionem lotii, aut in viribus, morborum quid animadvertit. Quamprimum vero ad bacchanalia pervenerat, sub siti potuque iisdem, urinas sibi indies augeri sensit aeger, et abundantiore sub victu, vires vacillare, corpus vero contabescere percepit. Medicum tunc adit, pilulasque, e sapone acido paratas, ab eo obtinet. Cum istae nil efficerent, decoctum quoddam alter illi praescribit ex carne bubula cum multis amygdalis contusis confectum; sed nec istud promissum effectum praestat, et praedictis symptomatibus, nempe siti ardenti, continuae, urinis, potum, licet copiosum, superantibus, debilitati ac tabi, lentae quoque febris ad noctem indicia junguntur. Mitis primum haec fuit febricula; sub finem vero aprilis, evidentior facta, binis quotidie insultibus aegrum devexat. Post prandium scilicet primus ac levior ex illis, post horam, vel paulo tardius dissipandus; alter vero, ac simul fortior, aegrum media nocte invadebat, post

bihorium, vel trihorium, cum sudore aliquo ad frontem solvendus. Dolor quoque intercurrents insurgit quo loco scapulae sinistrae angulus inferior costis incumbit; finitimasque costas simul amplectitur; tussis sicca, ad pectus irritationis sensus, cum dolore illo respondens, a levi frictione cito dispellendus, accedunt. Sub profundiore inspiratione et a decubitu in latus sinistrum, exasperatus dolor. Appetitus praeterea deijcitur; panem aeger ac solida quaeque aversatur, modo illa, quae humida sunt, expetens. Consilium nunc medicum aeger explorat. Ex lienis infarctu, cujus tamen desunt vestigia, repetuntur a medicis hujus morbi symptomata. Resolventia igitur, et carnum iterum juniorum juscula, pro potu vero emulsio ex papaveris seminibus adhibentur. Nec ista quidem aegro profuerunt; debilitas enim, macies, ac sitis augebantur, et maji mensis initio febris magis fit continua, post prandium accedens, ad mediam noctem adaucta, et non nisi sub auroram moderanda. Consulitur nunc venaesectio. Per duos tresve dies ab ista, febris contineuit, dolor evanuit et appetitus non minus, quam vires aegro videbantur restitui. Sed breve hoc et fallax morbi levamen fuit: sitis nempe, praesentis adhuc morbi insigne indicium, neutiquam remiserat. Quare tres vix elapsi erant dies, cum et febris, et pristina symptomata reversa sunt. Venam alteram aperiri jussit tunc medicus. Sanguis, licet ex pede emissus, corium den-

sum albumque contraxit. Chinae decoctum cum lacte hauriendum jam praescribitur. Nullus ab isto effectus fuit; nec alvum purgans medicina auxilium tulit. Post octo hinc dies, 31^a scilicet maji, aeger ad nosodochium *Ticinense* deferitur, ac experto hujus medico sequentia prodit symptomata: sitim intensam, potu superiorem, febrim lentam, dolorem pectoris molestum, tussim, a decubitu in latus adfectum mox auctam, maciem ac adynamiam insignes, pedes sub itinere tumefactos, altera tamen die collapsos, urinas copiosas quidem, sed, quod primo intuitu morbus adfectionem pectoris prae se ferre videretur, necdum satis observatas. Gummi igitur arabicum, et oxymel, in aqua soluta, pro medicina fuerunt. Post paucos interim dies, sub majore morbi indagine, cum, potulentis non ultra sexdecim libras ingestis, viginti septem urinae dulcescentis librae secederent, diabetis non ultra latuerunt vestigia; ac primum quidem serum lactis cum alumine paratum aegro propinatum fuit. Cum vero ab isto, et vomitus et aliae molestiae sequerentur, aqua calcis cum lacte, pro potu, et chinae pulveres, praescripta fuerunt.

Hac tandem sub methodo, morbi facies sensim sensimque in melius mutari videbatur. Febris nempe primum imminui, et levis modo calor ad mediam noctem comparere, dein vires gradatim augeri, maciesque non parum dispergi coeperunt. Urinarum copia quotidie minor reddi, et cum

potus libras quinque non excederet, illa ad libras 19. 14. ac 10 descendere est visa.

Hoc igitur feliciore sub aspectu, aeger nosocomium, sed infausto sub omine, deseruit: post tempus scilicet haud longum, eundem pristinum in morbum relapsum, ac tabe tandem extinctum fuisse innouit (1).

EPICRISIS.

Diabetem, de quo hic agitur, febris lenta citius, quam alios quos vidimus, comitata est, non sine labis in pulmone simul latentis suspicione. Quam facile autem diabete phthisis pulmonalis, apud praedispositos, accedat, mulier 53 annorum, *Vindobonensis*, nos docuit. Haec nempe plurimis jam a morbis, a prima aetate, correpta, circiter ab anno, siti fere continua et superabundante urinae profluvio, quo etiam quatuor aut quinque ejusdem mensuras excerneret, laboraverat. Circa medium tandem decembris 1795, ea derepente ab horrore, cum summa virium prostratione prehensa fuit. Continuavit hic status per quatuordecim dies; dein cessavit, reliquis tamen prioribus constitutionis infirmae incommodis. *Die 1^a februarii 1796* in nosocomium *Viennense* aegra se contulit. Labes pectoris

(1) Historiam nobis communicavit iterum Joannes de Felici.

hic se manifestavit indubia. Urinas tamen, ob suam exsuperantiam examinavit versatus plurimum in rebus chemicis auditor noster Doctor *Spenchuch*, easque melleam dulcedinem offerre reperit. Ulterius igitur earum indolem explorans, ex quatuor earum libris, obtinuit substantiae bruneae, melliformis, ac admodum dulcis, uncias quatuor cum dimidia. Cum vero nunc phthiseos tubercularis, ac febris lentae subintrassent symptomata; urinae quantitas longe imminuta fuit: ut potu etiam multo minor aut paucior esset. Adstitit huic aegrae, sub ultimis vitae diebus ad clinicum Institutum delatae, *Antonius Fierlinger*, medicinae Candidatus. Foeminae vero hujus, die 17^a mensis martii 1796 defunctae, cadaver, tubercula pulmonum suppurata exhibuit. Similem diabetis et quidem insipidi, in phthisin pulmonalem exitum, in foemina, Vindobonense in nosodochium suscepta, observavit *Josephus Frank*, ejusdem loci tunc medicus. Pleuriticos quasi dolores vir a diabete insipido enectus, expertus est *Ticini*; ac *Friburgi* in Brisgovia, vir celebris *Eckerus*, et hos thoracis dolores, et phthisin pulmonalem in diabetico conspexit; quae observationes eo majorem attentionem mereri nobis quidem videntur, quod jam *Hippocrates*, signum in phthisi lethale *sordes hominis in auribus dulces* esse dixerit (1); quod hanc divi senis pro-

(1) Lib. VI. Epid. Sect. 5.

gnosin apud foeminam, tabe defunctam, confirmari viderit *Hünerwolf* (1); et quod *Listerus*, postquam urinas in diabete paulatim dulcescere advertisset, adjunxerit: « huic rei fidem facere phthisicorum plurimorum in ultimis vitae mensibus, insignem ac ad nauseam usque molestantem *sputorum dulcedinem* [2].

DIABETES CUM ENURESI.

Senex 60 circiter annorum, aegrorum, conductor *Papiensis*, vir antehac obesus et pinguis, jam ab anno quamplurimum urinae in se ipsum minxit, non semper tamen facultate, lotium retinendi, destitutus. Quotiescunque vero urinae praeter voluntatem huic viro non affluebant; brevi temporis spatio magna earundem copia in vesica colligi, ac tandem, ad matulae vel maximae plenitudinem, excerni solebat. Post varia remedia, contra hunc morbum incassum praescripta, cum aeger non adeo macilentum reddi, quam habitum leucophlegmaticum prae se ferre, simul vero pedibus intumescere coepisset; ad eundem, tunc rure degentem, quo cum illius medico or-

(1) Eph. N. G. Dec. II. ann. III. obs. 91. p. 192. *Cassius* etiam iatrosophista, cerumen aurium in moribundis dulcem saporem agnoscere testatus est. Naturales et medicinales quaestiones. Edit. Gesner. 3. Tigur. 1562. vid. *Sprengel*, Geschichte der Arzneykunde, II. Th. S. 119.

(2) Vid. *Allen*, Synops. c. VII. art. 1543.
Frank tom. I.

dinario circa morbum hunc rebellem conferremus, accersiti fuimus. Virum quadratum, ac, ut referunt, quondam robustum, nunc pallidum, facie tumidulum, fractum viribus, in aegro, cui pedes simul, ad suras usque oedemate laborabant, invenimus. Pulsus minime febriles, sed potius lentiores fuerunt. Appetitus vigeat; sitis erat intensissima. Urinas quamplurimas, tum nolenti aegro in lectulum aufugere, tum ab eodem aliquando libere deponi, pallidas ac minime foetentes, percipimus. Cum de paresi vesicae prima nobis cogitatio subintraret; num insultus apoplecticus praecessisset; vel num aeger violentiam ad lumbos, aut rheuma, aut impetiginem, quae forsitan ex parte alia recessissent, inquisivimus. Nihil vero ex istis, vel ex causis aliis, accusari potuerat. Omnem indicationem hinc ex debilitate aegri, tam universali, quam locali, scilicet ad vesicae sphincterem, desumpsimus, ac opportuna huic malo remedia proposuimus. Post octiduum, de novo accersiti, nullum ex praescriptis morbi levamen haberi, experti sumus; cum vero prope lectum aegri, vas quoddam ligneum, aqua, ut videbatur, ad mensuras novem circiter, repletum videremus; quem in finem hoc liquidum tali loco servarent, interrogavimus. *Urinam* esse referunt, quam, utpote nycthemeri spatio, praeter illam, quam aeger in semet ipsum minxisset, emissam, ut illam nobis intuendam offerrent, conservaverint. Partem hujus urinae,

vitro claro susceptam, pallidam, ac straminei coloris, odoris, ab illo urinae, prorsus diversi, fere mellei, eandem esse reperimus. Sub hac urinae conditione diabetis, saepius jam conspecti, mox idea nos percellit, ac eandem igitur gustari curavimus. Dulcis erat sapor huius lotii; succo, quem *Betula Alnus*, verno tempore incisa, fundit, tum gustu, tum colore similini. Instituta nunc rectiore morbi flebilis diagnosi, urinae copiam *Ticinum* deferri, ac chemicae analysi submitti jussimus. Docuit haec, de quo amplius dubitari non licuerat, saccharini principii huic urinae magnam inesse copiam. Quaecunque vero contra hunc morbum tentaremus auxilia; nihil ea profuerunt. Aliquando, secretione urinae conspicue imminuta, corpus aegri integrum, imprimis abdomen, ab aquis intumuit, fluentibus vero magis magisque urinis, tumor omnis concedit, ac macies corporis vel maxima comparuit. Ad alios nunc medicos miser, sed eodem sub fato, se convertit, ac eidem tandem post annum succubuit.

EPICRISIS.

Descriptus hic diabetes mellitus cum enuresi, videtur fuisse *diabetes indesinens Aretaei*
 » in quo non cum intermissione lotium red-
 » dunt, sed perinde ac canales laxati es-
 sent (1). Exemplum hoc levi calamo in *Epi-*

(1) De morbis diut. L. II. c. 3.

tomes L. V. P. I. §. 479. p. 41. tetigimus. Plura ejusdem indolis specimina collegit *Trnka* (1), ac simile descripsit *Daniel* (2). Coeterum saepius nos *diabetem cum hydrope alternasse* observavimus; atque magnam, utrumque inter morbum, affinitatem intercedere, mature inspicati sumus. Cum vero haec nobis primum idea non parum satisfaceret; casu quondam, in vetusti scriptoris locum de diabete incidimus, qui hunc morbum cum hydrope eundem esse, jam diu ante nos, edixerat (3). In sexto interim *epitomes* nostrae libro, P. I. illam ipsam, de affinitate hydropis cum diabete, ideam, cum non spernendo certe argumento suffulsimus: aquae scilicet per abdominis paracentesin *Petropolis* ex hydropica eductae cum exemplo, quae aqua *saporem*, qualem diabeticorum urinae offerunt, *dulcem*, viro claro (4), nulla hujus indolis hypothese imbuta, exhibuit. Quamvis nempe longe non omnem hydropem de diabetis natura participare contendere velimus; aliquando tamen eandem vasorum exhalantium vel abdominis, vel cavi corporis

(1) L. c. p. 19.

(2) Beiträge zur medicinischen Gelehrsamkeit.
I. Th. S. 130.

(3) *Garioponti*, vetusti admodum medici ad totius corporis aegritudinem remedium praxem. Lib. V. cap. XVIII. p. 102. „Quibus haec passio
„(diabetes), inquit, contigerit, ut *hydropici* juvari
„debent, quoniam prope est illis una passio.

(4) *Rudolph*, Academiae Imperialis Petropolitanae socio, et Acad. med. chirurg. Professori.

alterius, quam vasorum renalium, urinas secermentium, conditionem, qua serum, quacunque demum ratione, parte saccharina abundans ex sanguine separent, subintrare, ac ea quidem ratione vasa illa, nunc hydropem, nunc vero diabetem generare, supponimus. Summatim, *diabetes* nobis magnae familiae morbosae, generico suo nomine hucusque destitutae, sed super animale non magis, quam vegetabile super regnum late dominantis, modo *species* esse videtur: cujus character principalis in abnormi secretione materiae maxime nutrientis et saccharinae consistat, vel per vasa renalia haec ipsa, *diabetis* sub nomine, — vel per arteriolas cutaneas, sub *sudoris colliquativi* appellatione, — vel per vasa bronchialia, sub *phthiseos pituitosae* titulo, — vel per tunicae intestinorum villosae exhalantes ramulos, sub *fluxus coeliaci* vocabulo, — vel denique per uteri, vaginae, urethrae, vesicae, aut ani superficiem, sub *floris albi, medorrhoeae, haemorrhoidum vesicae, intestini recti* significatione, e corpore aufugiat. *Chymorrhoeae*, vel *chylorrhoeae* nomine hoc morbi genus amplissimum, indignum non foret; et si *lactis secretio* apud sexum foemineum, ut functio naturalis, nec morbosa, revocari huc non potest; quandoprimum ei vel limites praescriptos, *gallactirrhoeae* sub nomine, excedit; vel, ut aliquando res contigit, viriles per mammas locum habet; tunc ea, jam morbus, *diabeti* adfinis, est, neque liquidi color secreti vel pallidus, serosus, vel lacteus, neque gradus mali minor aut major,

neque demum substantiae saccharinae, quae ex lacte, et quae ex urina diabetica chemice elicitur, diversitas, differentiam hic pariunt.

CYSTIDIS FELLEAE DILATATIO MORBOSA.

Faemina annorum circiter quinquaginta, corpore male conformata, dolores olim pluries in hepatis regione passa, jamque diu cutis flavescente colore instructa, post novos ejusmodi dolores cum vomitu, ab ictero universali, et a febre correpta fuit. Post plures ab hac accessione dies, nosocomium *Mediolanense* aegra petiit. Tunc ea, praeter flavum totius corporis et oculorum colorem, pulsusque febriles, tumorem quendam, qui ab hypochondrio dextro, usque ad hypogastricam regionem fere extendebatur, exhibuit. Tumor hic ad attactum dolebat, huic ipsi resistens; diligentius tamen exploratus, fluctuationem quandam praebebat. Urinae croceae, alvus tarda, faeces subvirides ac durae, lingua mucosae albo ac tenaci defoedata, os amarum, fuerunt. Horripilationes hinc inde accusantur.

Videbatur primum tumor cysticus huic malo subesse, cujus natura non tam facile potuerat definiri. Cum vero symptomata in unum collecta considerarentur, de vesicula fellea, bile turgida dubium subesse vix potuit. Pilulae hinc, et potus ex sic dictis resolventibus praescripta fuerunt. Supervixit aegra per septem adhuc dies. Sub istis,

diarrhoea successit ex faecibus constans tum foetidis, tum sanguine commistis. Insignis virium prostratio, hoc alvi profluvium insecta, et aliqua mentis alienatio fecerunt, ut solventibus suspensis, majorem vitalis indicationis rationem habuerint medici. Pertinaciter interim diarrhoea; colliquativae quasi indolis tympaniae, sub fine morbi simul juncta, perseveravit, ac finem tandem vitae miserae imposuit.

SECTIO CADAVERIS.

Hepar aliquantisper hinc illinc obstructum duriusculum, cystis fellea, bile copiosa et fluida turgidissima, ita ut quintuplo, vel sextuplo justo major esset, reperta sunt. Ductus hepatici, cysticus atque cholelochus, ad insignem amplitudinem extensi fuerunt; nullibi tamen calculus comparuit. Ductus bilis communis, prope duodenum intestinum, scirrhusus, pancreas quoque durum et obstructum fuerunt.

EPICRISIS.

Hepar hujus aegrae cum cera quidem injectum, nobisque *Mediolano*, ab egregio Auditore nostro, *Augustino Casanova*, M. D. sollicite transmissum, sub via interim diruptum fuit; unde pars ejus modo aliqua, potissima tamen, in museo pathologico *Ticensi* conservata, ad nos pervenit.

Icteri hujus lethalis causa, in scirrhus,

finem ductus choledochi, quo intestino duodeno inseritur, obsidente, et, quod dolemus, hic rescisso, constitit. Etiam sine tanta cystidis fellea extensione, iterum, ad omnia rebellem, a scirrho pancreatis, vicinum sibi ductum choledochum comprimentem, quondam deteximus (1). Facile tanta cystidis felleae dilatatio, cum hoc malum diuturnum et horripilatio, et febris, et dolor, ab attactu, et fluctuatio comitarentur, pro hepatis, vel et peritonaei pro abscessu incautis imposuisset, quemadmodum celebri quondam *Petito*, vix non imposuit. Icteri tamen praesentia, positio tumoris quo loco cystis fellea residet, justam circumspecto medico, bilis, non puris collectionem hic latitare, suspicionem moverunt. Non interim haec sola, quo vera retentae bilis causa pateret, suffecit. *Duverneyus* quondam ductum choledochum liberrimum, ac simul adeo ut digitus eidem immitti potuerit, dilatatum observavit; cum interea cystis fellea, summopere extensa, duas materiae biliosae pintas continuerit. Quamvis autem fibris muscularibus cystis fellea destituta sit; nimiae tamen ejusdem repletioni, parietum illius in bilem contentum, non minus quam vesicae urinalis nimis extensae in lotium inertiam, vir celebris, non vanis ut putamus

(1) Similia viderunt alii, imprimis *J. F. Meckel* et *Koreff*, Diss. sistens theoreticam considerationem icteri novis quibusdam causis simul superstructam. Halae 1763 §. 12.

ex rationibus (uteri, de cujus fibris muscularibus diu disputatum fuit, violenter non minus sese sub partu contrahentis exemplo) attribuit (1).

Quam facile cystis fellea, aut a bile, aut ab aquis turgida, pro tumore cystico habeatur, ut audaci adeo manu non semel pro tali fuerit sauciata, in *Epitome*, sub tractatu de ascite, jam indicavimus; et quam magnam sibi attentionem bilis vesicula nimis extensa, apud gravidas mulieres mereatur, illustri quondam faeminae parturientis exemplo, cui mulieri haec cystis, cum utero vicino adhaerens, sub partu rupta, bilis vero ex hac descendente actione abscessus circa ovarium natus fuit, et vaginam exesit, docuimus (2).

Cum plura nobis in sexti voluminis *Epitomes*, parte secunda, tum de hac materia, tum de ictero dicenda reservemus; in id unum hic attentionem movebimus: *pneumatosin* scilicet *intestinalem*, ex bilis nempe in canali cibario defectu, in hac quoque aegra, ut multis in aliis, occurrisset.

VESICULAE FELLEAE INFLAMMATIO ET GANGRAENA.

Promissam in secundo *Epitomes* volumine, §. 247 p. 271 *vesiculae felleae inflammatae*

(1) Mém. de l'acad. R. des Sciences. A. 1701 p. 200 sq.

(2) Observationes medico-chirurgicae. Obs. I. de singulari abscessu hepatico etc. actis Moguntinis A. 1783 insertae.

historiam hic tradimus, qualem nempe in propriis diariis adnotatam reperimus. Mense scilicet decembris 1787, faemina, quadraginta circiter annorum, ad Institutum clinicum *Ticinense* defertur, per quatuordecim jam dies ab hepatitide detenta. Summus, et nec minimum attactum ferens, dolor ad dextrum hypochondrium, nullus vero ad scapulam, erat. Vomebat aegra hinc inde; abdomen modo parum tumebat. Icterum nunquam, sed colicos aliquando dolores experta fuit mulier. Cum pulsum conditio id exigere videretur, venam aliquoties secuimus; partemque dolentem emolliente cum decocto fomentavimus. Dum haec minime dolorem leurent; vesicans emplastrum hepatis regioni impositum fuit. Decoctum tamarindorum cum sero lactis, simulac clysteres praescripsimus.

Postquam vero aegra per tres dies apud nos commorata esset, frigus forte eamprehendit. Gangraenam tunc praediximus. Quarta die, 18 scilicet decembris, e vivis erepta fuit mulier.

SECTIO CADAVERIS.

Hepar prae grande fuit. Lobus ejus dexter, convexa sui parte et inferiore, a puriformi materia obtectus erat, cujus ope leviter cohaerebat cum peritoneo costas spurias obtegente. Peritoneum nequaquam, nisi in levissima parte, quae paulo intimius cohaerebat cum hepate, magis rubrum erat.

In superficie convexa hepatis, durioris ac tumidioris hac in parte, semicirculus adparebat lividus et ater, pollicem latus, et pollices fere tres diametri ita habens, ut vesiculae felleae regio eidem fuerit pro centro. Pars circulo intermedia coccineum magis hinc inde colorem, alibi vero maculas gangraenosas superficiales offerebat. Loco vesiculae felleae, comparuit *tumor albus*, splendens, quasi tendineus, oblongus, profunde ad hepatis incisionem prope lobulum *Spigelii* descendens, cum vicino colon intestino connexus, ac duodeno etiam adhaerens, durus, tactui resistens. In parte hujus tumoris crassiore, ad limbum hepatis, abscessus erat adpertus, sphacelosus, pollicem habens latitudinis. Ex laterali et sinistra hujus parte prominebat calculus nudus, felleus, triangularis, apicem suum per duas fere lineas super ulcus, perpendiculariter erigens. Vesiculam felleam hic subesse mox visum est; hinc tumorem hunc longum adperimus. Tam crassi erant parietes, ut pollicem aequarent, ex infinitis lamellis albissimis, sibi parallele superimpositis, constructi, et cartilaginis in modum splendentes et albi. Adparuerunt in medio cavoque tumore calculi duo, castaneae fere magnitudinem habentes, fere retundi, pluribus aliis magis parvis, uno iterum triangulari, circumdati. Interna vesiculae felleae superficies, sphacelosa, foetidissima, crassa et cinerea materia oblita, non plena, ita ut nihil bilis adesset. Detersa per spongiam superficie, comparebant sinus, ex hac

in profundum hepar descendentes : quibus compressis, purulenta, melliformis, ex cinereo nigrescens materia foetidissima effluebat. Hepar igitur, quoad circulus ille externus, lividus, illud notabat, interius videbatur excavatum, circulusque ille gangraenae internae confines indicabat. Hoc viscus morbosum, museo pathologico commisimus.

EPICRISIS.

Plurima quidem vesiculae felleae praeter modum dilatatae exempla, tum nos ipsi conspeximus, tum alii descripserunt (1). Rara inflammationis, hanc cystidem occupantis, — rarissima vero illa sunt, quae vel ex calculis felleis, vel ex vicinarum partium incendio non venerint. Suppurationes etiam hujus vesiculae sat copiosae, et quae partim eandem, vix non omnem, destruxerint, descriptae fuerunt (2); nullibi vero, quod sciamus, *gangraenae*, hujus cystidis cavum devastantis, historia exstat. Rarissima etiam dicatur tanta parietum hujus vesiculae crassities, et media super gangraena splendor et *albedo*. Hanc ultimam tamen jam *Lancisius* conspexit (3), atque illa ex puriformi, numerosissimis parietum istorum

(1) Potissima ex istis collegit F. G. Voigtel, Handbuch der pathol. Anatomie, III. B. S. 70 -- 73.

(2) I. c. p. 76 -- 79.

(3) Opera omnia, p. m. 46.

lamellis cellulosis interposita et condensata materia derivanda est. Sub vita aegrae magis protracta, facile calculus ille felleus, jam fere duas ad lineas hoc e tumore prominens, viam sibi in cavum abdominis parasset. Nisi morbus, antequam ad nos aegra accessisset, per duas jam hebdomadas durasset; inflammatae cystidis felleae symptomata forsitan, ab illis inflammati hepatis ipsius, magis distincta nobis sub oculos venissent; notari interim merentur: doloris ad scapulam vel humerum, ant jugulum absentia, ac tumor abdominis fere nullus. Supplebit tamen quodammodo ea, quam in viro *Bruchsaliensi* conspicuo quondam fecimus, observatio. Hic scilicet, quin ullam, unquam in facie, hucusque semper rubra, flavedinem, aut ullum hepatis adfecti signum nobis exhibuisset, de atrocissimo dolore ad limbum costarum dextri lateris spuriarum, subito conquestus est. Attactum digiti non ferebat hic dolor; nec tamen aut alvus obstructa erat, aut venter praeter morem tumult. Vomituritio quidem, nullus autem vomitus urgebat, nec dolor fuit ad scapulam. Peritonitidis muscularis, ejusque rheumaticae, idea tunc nos tenuit, et linimentum loco dolenti volatile inungi curavimus. Die sequente, cum de vesicante emplastro, dolenti loco admovendo cogitarem, aegrum ab ictero universali detentum, a dolore vero circa costas liberatum deprehendimus. Vel spasmus fuerit vesiculae felleae; vel obstaculum quodcunque

bilis ex ea effluxum impediverit; vel denique rheuma hos cruciatus excitaverit; dolor tamen solam ad cystidem concentratus, nec sensibilem abdominis tumorem, nec juguli aut scapulae consensum, solo scilicet ventriculo symptomatice adfecto, induxit; quo igitur signo, cystidis inflammationem biliferae, ab hepatis incendio, in quantum haec mala non confluunt, distingui posse arbitramur. Icterum hoc in casu quasi criticum fuisse, doloremque cystidis sedasse: ex bilis, hucusque in systemate biliario arctius coercitae, communem nunc humorum in alveum susceptione, ac minore jam in ductum choledochum impulsu, repetimus. Cum vero icterum hujus viri, blandiore solventium atque evacuantium usu, quin calculi secesserint, sat facile sanaverimus; non tam felix sane mulieris, cujus historiam exposuimus, ob scirrhum insanabilem, sors esse potuit.

DE TRISMO INFANTUM TERGESTI ENDEMICICO (1).

Inter proles *Tergestinas*, vix utero exclusas, maxillae inferioris spasmus endemicus est, quem vocabulo corrupto *Muxce* adpellant incolae. Post tertium a nativitate diem

(1) Ex epistola R. Protomedici Doctoris *Reuss*, die 27 decembris 1795. *Vindobonam* nobis transmissa, et ex Italico idiomate in latinum translata.

hic morbus foetum, etsi partu prospero, ac sine ullo morbi, aut labis organicae vestigio in lucem editum, etsi bono colore praeditum, voce sonora vagientem, ubera cum sapore sugentem, et meconium sat abunde egerentem invadit. Prodromum hujus mali signum, plumbei coloris circa labia circulus est. Mox voce miseri privantur, ubera cum aviditate quaerunt; sed ob oris constrictionem sugere impediti, pauculum illud lactis, quod nutrix instillat, libere ad stomachum deducunt.

Post praevia haec symptomata, augetur sensim sensimque pusionum debilitas, vagitus in lamenta permutantur, tremor aliquis eorum ad artus suboritur, extremitates tumefiunt, livescunt: frigidae ac duriores redduntur; donec octava circiter morbi die, cum stertore respirantes, moriantur convulsi.

Longiore retro tempore antiqui hujus civitatis medici quaecunque demum ipsis ad spasmum indicari visa sunt, remedia huic morbo opposuerunt. Qui nostris temporibus medicinam mecum *Tergesti* exercent, meliora ii antispasmodica, et alia auxilia, castoreum, moschum orientale, camphoram, balnea tepida, leniora evacuantia, enemata emollientia, oleosa, praescripserunt. Hirudines quoque, ac tandem escarotica, sed omnia incassum, tentavimus: nec me pudet fateri, nullum a me infantem, quem morbus hic indubie lethalis invasisset, ab interitu fuisse servatum.

Cum primum, anno 1767, mense aprili, hanc ad urbem adpulissem, incognitum prorsus mihi pro *trismo*, a *Sauvagesimo* egregie descripto, habebam; cum vero nunc ipsemet eundem observassem, differentiam in eo esse positam expertus sum: quod symptomata morbi nostri leviora, — in *trismo Sauvagesii*, graviora, et quandoque ipso universali cum tetano combinata sint. Hunc scilicet ultimum morbum *Tergestini* nominant *sciare*, *Galli* vero *Sarette* adpellant, quadraginta interdum per dies extensum, et sensim sensimque in salutem terminandum; cum, e contrario, prolium nostrarum adfectio *octavum* vix diem attingit, omnemque medicorum industriam, ut prorsus supervacaneam, eludit.

Vera hujus morbi causa hucusque nos latet. Sunt, qui illum urbis nostrae expositioni physicae ac territorio maritimo attribuant; sunt, qui eundem ex atmosphaerae apud nos inconstantia, ex subitaneo illius in frigidam transitu, pusionibus his, ob suppressae transpirationis rationes funesto, vel ex hiemis apud nos rigorosioris effectu derivent. Concedo quidem, ex mutatione atmosphaerae praecipiti nervosum systema, atque irritabilitatis momentum non parum perturbari, et ex rigore hiemali similium morborum causas conspicue augeri; ast vero, cur haec non quovis anno vel in *Bosniae* vel in *Tarciae*, vel in *Moscoviae* Imperiis contingerent, ut in quibus, foetus, vix utero exclusi, corpus integrum gelidis-

simae, et quidem rigidissima sub hieme, immergitur? et cur *Tergestina* in urbe spasmus, de quo agitur, sub coelo etiam aetivo atque fervidissimo, continuat non modo, sed strages adeo majores inducit? cur *Istriae* in urbe, *Maggia* vocata, et a *Tergesti* non nisi quinque miliaribus distante, ubi medici stipendiati vices antehac agebam, hic morbus, cum tamen et positio geographica, et ventorum conditio eadem ac apud nos observentur mihi nunquam oblatum est?

In modum, quo obstetrices nostrates post partum cum prolibus procederent, inquirens, mox expertus sum: quod, usu hac in civitate antiquo, insciae illae mulieres, recens nati infantis ori digitum unguibus armatum inferre, et linguae fraenulum cum impetu lacerare solere, credentes nimirum quod absque tali auxilio nec ubera sugere, nec verba quondam articulate proferre puer valeret. Consuetudini tam stolidae ac barbarae, qua nempe linguae, tot vasorum ac nervorum ramulis ornatae structura tam facile laeditur, obicem posituri, tum ego ipse, tum socii hujus civitatis medici, obstetrices, quo tam stupidam consuetudinem deponerent, atque, si quae circa linguam operatio instituenda ipsis videretur, chirurgus experto eandem committerent, graviter et sub amotionis a munere comminatione monuimus.

Quod ex indice mortuorum colligo, a primo mensis martii, currentis anni die,
Frank tom. I.

quo *Protomedici* honorificum officium in me collatum fuit, ad ultimum decembris, *quinguaginta octo* modo proles, hinc minore longe, ac pridem, numero, defunctae sunt; sed morbus de quo agitur apud nos etiamnum continuat, et forsitan inter obstetrices mulieres nostrates, erunt aliquae, quae praedicto temerario in abusu occulte perseverent. Tuam igitur vir spectabilissime, pro mea in te fiducia, opinionem, num scilicet morbus, quem hucusque descripsi ad Trismum *Sauvagesii*? qualis ejusdem tibi origo, quae medendi methodus, pristina opportunior, arripienda tibi videatur? efflagito.

EPICRISIS.

Tardius nobis haec epistola reddita fuit, et cum eidem respondendi occasionem quaereremus, temporum hanc injuria prohibuit. Non magna interim viri clari jactura id contigit; nam praeterquam quod digitis obstetricum audacibus tantum quidem morbum ac *Tergestini* foetus patiuntur, adscribendum esse ex eo nobis verisimile non esset, quod ineptae hae mulierculae et in *Germaniae* quondam provinciis perversam hanc *linguae*, ut ajunt, *solvendae* methodum absque effectu tam lethali secutae sint; causam satis certam, quae hunc trismum nascentium *Tergesti* endemium induceret, indicare, nobis minime licuisset. Nigritarum in Americam deportatorum foetus, nisi calidiore in atmos-

phaera per octiduum et ultra degentes, primis a nativitate diebus crebrius a tetano, vel trismo trucidari, — frequentem nascentium hunc morbum esse in *Jamaica*, *Carolinae meridionalis*, *Cayennae*, aliisque coeli calidioris regionibus, hoc quidem ignotum nobis esse haud potuit (1). Ipsam per *Hispaniam* spasmus maxillae inter infantes endemium esse, novimus (2); sed quae *Tergestum*, civitatem soli meridiano minus, quam aliae *Italiae* magis meridionalis partes, expositam, huius mali occasio premeret, hoc quidem indicatu nobis perdifficile visum est. Non interim nos latet, hanc urbem, quam nos ipsi quondam visitavimus, tum altioris ad radicem montis; tum profundiore ad maris adriatici ripas et angustiore territorio exstructam, nunc ab aquilonaris venti turbinebus gelidissimis perflari, ac vix non rigescere; nunc vero a solis meridiani radiis, tum a vicinis saxis, tum ipsius tranquilli maris a speculo reflexis, vix non exuri; maximis vero ac subitaneis atmosphaerae mutationibus exponi. A solo quidem aere maritimo trisimum endemium sub coelo calido produci, minus est probabile (3); sed cum a tergo sa-

(1) *Hillary*, Observations on the epidemical diseases in the island of Barbadoes. *Lionel Chalmers*, in *London Medical. Observations ad Inquiries* Vol. I. *Bajon*, Mémoires, I.

(2) *Hyacinthi Andreus*, Append. ad compend. *Riverii*.

(3) *Dazille*, observations générales sur les maladies des climats chauds. vid. *Hufeland* N. Annlen. T. I. p. 265.

xoso, fere igneo, et a splendente maris unda, solis radii unum quasi in punctum, undique circumscriptum, concentrantur, aeri-sque magnae simul vicissitudines conspirant, nil nobis ad tetanum vel spasmum maxillae in tenerrima nascentis hominis aetate producendum, deesse videtur. Sporadici quidem, et a nobis observati, trismi apud nascentes causae variae esse possunt, atque maxime nunc in meconii retentione, nunc in cibis foetui praepostere ingestis (1), nunc in refrigerio subitaneo (2), nunc vero in lacte matris perterritae (3), vix tamen, ut nobis videtur, ex funiculi umbilicalis, qui sensu destituitur, laesionibus (4), querendae sunt; sed morbi talis *endemici* ratio, ex causa magis generali repetenda, non alia, saltem a nobis, ab ejus sede nimis remotis, quam ea, cujus mentionem injecimus, adduci potest.

Quodsi vero haec ita se habeant; mulieribus illis civitatis praegnantibus, saltem gracilioribus, et quarum opes id genus auxilii concedunt, ut partum atque puerperium in loco magis elevato, adperto, et ab urbe marique distante absolverent, — quibus vero focum domesticum deserere non licet, ut illae, saltem novem a puerperio die-

(1) *J. Hamilton* observations on the utility and administration of purgative medicines.

(2) *Formey*, med. Ephemeriden, I. B. 2. Heft, S. 19.

(3) *Ackermann*, de Trismo, p. 26.

(4) *Lafosse*, avis aux habitans de S. Domingue. *Morand*, vermischte Schriften, II.

bus, prolem anxie a quovis refrigerio, aestivo quoque tempore tam facili, custodiant, ac ut lacte proprio, eoque solo, sub debita animi quiete, prolem nutrant, consilio essemus.

SANGUINIS IN CAVUM PECTORIS EFFUSIO.

Martinus Schmid, Medicinae Doctor, *Vindobonensis*, aliquot ante dies in sublevando pondere viribus superiore, dolorem in pectore persensit, qui dolor post breve tempus auctus fuit. Venam sibi quater aperiri, posthinc medicum seniore in auxilium accersiri curaverat aeger. Spasmodicae indolis hos pectoris dolores esse credens, volatilia hic praescripsit. Nullum abhinc malorum levamen fuit.

Vigesima prima mensis octobris 1799, hora quarta matutina, amicus alter medicus accersitur. Cum, pectore oppressus, loqui vix posset aeger in symptomata urgentia hic magis, quam in istius, interceptam saepe, relationem, attentus esse potuit.

Caput erat penitus liberum, mens sibi praesens, oculi lucem ferentes; acies tamen eorum valde infracta, lingua madida, vix non pura, sitis nulla, sputa pauca, aliquibus striis sanguineis intermista, adpetitus non prostratus, ructus rari, non olentes, fuerunt. Facies sibi non similis et admodum mutata fuit. Tussis fere nulla, respiratio impedita, loquela dolorem in pectore excitat. Dolor hic ad praecordia haeret interna, sem-

per quidem urens, ad certum tamen temporis intervallum vehementius sese manifestat, mox evanescens, breviter atrocius rediturus, et sic alternans. Ardor, dolore etiam evanescente, permanet. Ab attactu dolor pectoris non augetur. Decubitus aegri in utrumque latus, parum impeditus est. Abdomen attactum satis rudem ubique tulit, molle, nec tumidum fuit. Refertur, urinam quidquam magis tinctam, pleno tamen flumine fuisse excretam. Calor corporis moderatus, cutis sudore vaporoso madida, mollis est. Vires non penitus deletae. Pulsus interim, ultra quinque minuta prima exploranti, in manu dextera nullus comparuit; in sinistra, parvus; debilisque, minime tamen frequens fuit. Sub dolore vero ad praecordia redeunte, pulsationes arteriae et hunc ad carpum nullae sunt. Tendinum subsultus se nulli manifestant.

Difficilis admodum hujus morbi diagnosis fuit. Ad vitium interim topicum in cavo thoracis concludi licuit. Ex pulsum cessatione repetita et longiore, non minus quam ex vultu, sibi prorsus non simili, fatalem morbi exitum amicus praevidit medicus. Cum vero nullum sic dicta antispasmodica effectum hucusque praestitissent, mixtura oleosa, cum tincturae anodynae guttis decem et syrupo papaveris, praeterea vero enema ex aqua chamomillae, cum ejusdem tincturae guttis viginti, ac fomentationes emollientes ad pectus, praescripta fuerunt. Doloribus interim continuo acutis, et quovis sub re-

ditu acrioribus , ad camphorae simul ac moschi usum confugitur ; incassum vero haec omnia propinantur , ac ipsa hac die , hora quarta pomeridiana , vitae finis imponitur.

SECTIO CADAVERIS.

Habitus cadaveris externus , nihil , quod notatu dignum esset , obtulit. Pulmo dexter , praesertim vero lobus ejus superior , cum pleura concretus detegitur. In parte hujus lobi pulmonalis superiore , tubercula duo , ad nucis juglandis magnitudinem aucta , et dura , comparent. Facies coeterum hujus visceris exterior , sana , nec ullum inflammationis vestigium fuit. In cavo dextro thoracis , etsi cauta manu adperto , sanguinis nigri uncia una cum dimidia stagnavit. Pulmo sinister , pleurae hinc inde firmiter concretus , coeterum vero sanus fuit. Cor ipsum cum suo velamento , nil morborum ostendit , nec ullum in ejus vasis majoribus vitium , aut signum aneurysmatis , varicis repertum fuit. Viscera abdominis meliore modo constituta fuerunt.

Hanc nobis morbi descriptionem communicavit indefessae vir industriae , ac noster quondam in clinico *Vindobonensium* Instituto Auditor , *Josephus de Sandorffi* , Hungarus. Antequam vero tristem hanc morbi commentemur historiam , sequentem e nostris diariis extrahimus adfectionis non minus lethalis memoriam.

Floridi corporis juvenis *Helvetius*, medicinae candidatus, annorum circiter octodecim, morum integritate non minus, quam ingenii dotibus, praestans, *Ticini* in febrem acutam, inflammationem, incidit, ex qua per venaesectiones aliquot, et per blandiora ventrem evacuantia remedia perfecte convalescerat; cum sex post menses, nova febris, ut videbatur; ejusdem indolis, eundem, ingluviei quidquam indulgentem, prehenderit. Postquam aeger venam sibi bis adperiri curavisset, ad Institutum clinicum deferri expetiit. Hic paucarum dierum spatio febris omnis evanuit; sed ab ea, testiculus sinister intumuit, doluit, ac durior, incaluit; ex urethra vero humor albescens, sub nulla dysuria, effluxit. Num hoc genus vitii per contagium contraxisset, interrogatus, nunquam sibi ullum cum muliere commercium fuisse, respondit; nec certe nobis, si quid fragilitatis ei accidisset, id nobis reticere voluisset ingenuus in omnibus ac sincerus admodum juvenis. Cataplasma emolliens tumenti testiculo impositum, ac althaeae decoctum pro potu praescriptum fuit. Tres reliquos per dies aeger belle se habuit, ac tumor, minus dolens, mollior, quidquam subsedit. Talem, quarta die, horis matutinis, aegrum conspeximus. Cum vero, ob salutis propria incommoda, clinicum Institutum, pro nostra consuetudine, vespere adire non possemus; aeger primum

inquietus fieri, suumque nostrum desiderium medico, vices nostras agenti, et commilitonibus exprimere cepit. Hi vero, cum nihil in rebus aegri mutatum, nec ullum a morbo periculum portendi reputassent, quietum ac animi compositi eum esse amice monuerunt. Aucta, versus noctem, aegri anxietas fuit, respiratio ei suspiriosa, gemebunda, difficillima, accessit, ac adstante clinices chirurgus, post mediam noctem jactabundus ille animam efflavit.

SECTIO CADaveris.

Praeter sex circiter sanguinis sinceri, ferre coccinei, in dextro thoracis cavo fluitantis, uncias, nihil quod a debita partium constitutione recederet, deteximus. Unde cruor effusus huc venerit, anxie, sed incassum, inquisivimus; nec enim aut cordis vitium, aut arteriae, aut venae morbosa expansio, nec lacerationis, solutionis cujuscunque vasorum aut pulmonis, aut pleurae, aut mediastini, aut diaphragmatis, vestigium repertum fuit.

UTRIUSQUE MORBI EPICRISIS.

Quam tenui filo, quem nec subtilissimi digitus anatomici prosequatur, vita hominis pendet! — Quod nervorum, quorum fabrica intima oculi humani aciem fugit, laesiones tam saepe a morte nos lateant: hoc quidem, licet summi ac lethales has effectus

secuti sint, non est quod miremur; sed vasorum, quae sanguinem vehunt, ac eundem, cum ex capillaribus esse non queant, laesa, quantitate conspicua plorant; hoc anatomici mentem pathologi, nisi alia huiusce phoenomeni explicatio subintraret, percellere deberet. *Secretiones* interim *cruentas*, sicuti serosas lymphaticasve, sub morbis diversis fieri, non primi quidem nos docuimus, sed maxime in quinti *Epitomes* libri §§. 584. 641 tum ratione, tum experientia suffulti, demonstravimus. *Inflammationis* ad superficies secernentes effectus frequens est, sanguinis ex ista, non laesa certe aut rupta, sed integerrima, distillatio; ac centenis peripneumonia in casibus, hunc sanguinem, vel sero plus minus copioso dilutum, vel lymphae coactae filamentis remistum, vel sincerum, in thoracis cavo effusum, absque omni continui laesione, deteximus (1). *Pleurae* quidem, secundum nostras observationes, frequentior, sed et *peritoneo*; ac ipsius *cerebri velamentis*, communis haec, rorem sanguinolentum, sub certis conditionibus exhalandi, dispositio est. Nec in sola inflammatione hanc ipsam subsistere dicendum

(1) Simile exemplum *Morgagnius* adducit, ex eo potissime memorabile, quod, cum pulmo sinister, excepto lobo superiore, ubique inflammatus esset, ex eo tamen lobo sanguis guttatim, ultra libras quatuor destillaverit, etsi ad aspectum sanissimo. De sed. et caus. morb. Epist. XX. art. 17.

est. Quovis sine impetu sanguis menstruus, ab utero aversus, per uberum papillas, aut digitorum per apices periodice ac tacite aberrat; et cruorem per cutis spiracula, non aliter quam ipsum sudorem, aegri hinc inde sudarunt. Quaevis partium, inflammationis etiam expers, irritatio, hos aliquando effectus producit; ac *petechiarum* non minus, quam *sugillationum*, *macularum* aliarum, absque conspicua vasorum solutione, quam injectiones vasorum, et hoc sub statu felices, réfutant, copiosa exempla id testantur. Verisimile quidem est, in casu *Vindobonensis* aegroti, a gravi nixu pulmonis aliquam laesionem contigisse; hanc vero laesionem in continui solutione, aut in vasorum ruptura constituisse; hoc quidem sectio pathologica, si ob possibilem laesionis exiguitatem cum certitudine in totum negare non queat; saltem illam, cum majore industria licet, quaesitam, non comprobatur. Nec etiam probabile videtur, tam paucam sanguinis effusi copiam, majorem hic, quam causa, quae cruorem effundi coegit, effectum habuisse. Verum quidem est, liquidi etiam non multi in pectoris cavum, semper et ubique plenum, celerem ac subitanam effusionem, non minora saepe, quam si copiosior ea, sed lentior inundatio fuisset, symptomata provocare; difficile vero est, actionem cordis et arteriarum vix non omnem a sanguinis in thoracem effusi uncia una cum dimidia suspendi, quam actionem in majore hydrothorace, nisi cordis aut vasorum hujus majorum a vitio pro-

ducto, librae seri complures effusae, vix ante mortem adeo suspendunt. Quare sanguinem, hoc in exemplo, ad thoracem collectum, partem quidem malorum sat magnam, — causam vero, quae cruorem hunc aut secerni, aut alio modo effundi, induxit, vel maximam et potissimam habuisse; ac probabili ratione magis in nervi, in cordis systema influentis, tensione subitanea, violenta, vel laesione, quam in vasis pulmonalis solutione, quaerendam fuisse putamus.

Quid effusionem sanguinis in *Helvetii* juvenis thoracem induxerit, arduum certe est dicere. Nunquam saltem hoc nobis communissimis sub testium inflammationibus cujuscunque demum indolis, obvenit phenomenon. De *cynanche parotidaea*, in *Epitomes* libro II. §. 174 monuimus: tumorem parotidum in ea subito dispersum, quod et *Burserius* (1), et nos vidimus, inopinante interdum in viris ad testiculum, ad mammas, vel et ovaria, in mulieribus, cum acuta abhinc febre, converti. Hoc etiam testium tumore concidente, *Hamiltonius* lethales ad cerebrum metastases contigisse advertit (2); nec miraremur sane, tale quid

(1) Instit. med. pract. Vol. III. p. 275.

(2) Legendus super hoc morbo imprimis est *R. Hamilton*, transactions of the Royal Society of Edinburgh, T. II. — et London medical Journal, Vol. XI. 1790. P. II. p. 190 übers. in Samml. auser. Abhandl. f. pr. Aerzte. B. XIV. S. 34. sqq.

nostro in aegro ad pectus magis , quam ad caput , locum habuisse ; sed quamvis ille , testiculi tumorem sibi nullo a contagio accessisse , sancte adfirmaverit ; nulla tamen in morbi ejus historia , praegressae cynanchis paratydeae , coeterum in *Italia* frequentioris , fit mentio .

In genere haemorrhagiarum internarum diu non satis exulta doctrina fuit , et quaevis illarum historia eo magis medicorum attentione digna est . De illis cruoris in cava corporis effusionibus , quas aut vulnera , aut ulcera , aut externae injuriae producunt , vel quae saccos aneurysmatis aut varicis disruptos sequuntur , et quas ex propria non minus , quam aliena observatione jam alibi descripsimus , hic non agitur ; nec de profluviiis cruentis , quae apud aegros scorbuticos ad interna corporis sat crebro contingunt , et quae vasorum debilissimorum solutionem haud raro pro origine agnoscunt , hic sermo esse potest . Sed illa praeprimis internorum cavorum profluvia cruenta , quae absque his causis succedunt , huc spectant . Talem quoque *Morgagnius* notatu dignam , et nostrae fere similem , observationem adducit : viri scilicet ex dysenteria defuncti , in cujus thorace sanguis non paucus , etsi nulla viscerum laesio comparuerit , repertus fuit (1) . Non multum hoc ab exemplo abludit altera , ejusdem scriptoris summi , observatio , de viro nempe , in

(1) I. c. Ep. XXXI. art. 14.

cujus cavo thoracis, cruoris quamplurimum repertum fuit, etsi, praeter aortae aneurysma non ruptum, coeterae quoque partes nec minimum laesionis, unde sanguis ille propullulasset, vestigium prodiderint (1). Ex *apoplexiis*, ut vocant *sanguineis*, ut fusius quondam referemus, non paucas ex *secretione* magis *cruenta*, quam e vasorum cerebri *solutione* venisse, opinamur.

DOLOR INGUINIS PERIODICUS.

Quartus jam agitur annus, a quo *Andreas Rossi*, adolescens vix pubertatem adeptus, et gracili corporis habitu, sub finem aetatis, vel ineunte autumnno a febre prehenditur gastricae indolis. Annis elapsis statim sociabatur, vel et praecedebat dolor eo loci, quo glandulae inguinales insident in latere dextro, assidue quidem, sed interdum minus, alias magis molestus. In ea parte nihil praeter naturam, nisi quod glandulae aliquantisper tumerent, et tactum refugerent. Abdomen molle. Evacuancia ex natura febris indicata, et pro ratione repetita, omnem tum febris, tum etiam doloris curam absolvebant.

Hoc in casu gastrica colluvies, quae febrim incendebat, symptomatico modo dolorem etiam produxisse videbatur.

Mense junii 1793 ad finem vergente, de novo intermittente febre corripitur, cepha-

(1) I. c. Ep. XVII. art. 17.

lalgia et gastricis symptomatibus stipata; nullus autem dolor ad inguen. Secatur vena, et pluries adhibitis pharmacis sollicitatur alvus. Febris fugatur. Post octo dies recidivam patitur, quae tertianae duplicis typum observat. Iterum purgatur, et iterum a medico curante (in civitate autem degebat studiorum causa); nulla obtinetur febris remissio; imo supervenit dolor ad inguen, non assiduus quidem, ut coeteris annis, sed periodicus: talis, qui ingruente paroxysmo intensius urgeret, remittente febre remitteret, in apyrexia fere cessaret. Domum reduce, cum nulla observarem gastrica symptomata, summam vero astheniam animadverterem: statim ad corticem confugi, ut qui par esset non tantum feбри debellandae, sed etiam dolori, feбри pedissequo consopiendo. Ast febris quidem fugata fuit, dolor vero quotidie, eadem hora, qua febris invadere solebat, fulminis ad instar, aegrum adgrediebatur nullis precedentibus indiciis; per quatuor horas circiter saeviebat; sensim inde decrescente, ingruerat somnus, a quo experrectus se liberum gratulabatur. Talem dolorem mere nervosum esse, tum illud praecipue indicabat, quod perfectam servaret periodum, tum quoque defectus alius causae, quae accusari potuisset. Nullus nempe observabatur cum coeteris partibus consensus; nullus tumor in abdomine; adpetitus integer, cum alvo adperta; nec dubium de adfectione haemorrhoidali, aut acri quocunque latente fuit. Opium igit-

tur cortici nuptum porrigebatur binis horis ante paroxysmum, tum etiam maiore dosi statis intervallis apyrexiae, ut ita dicam, tempore. Neque ommissa fuerunt alia antispasmodica; tum etiam vesicans loco dolenti admotum fuit. Omnia autem incassum. Constanter etenim recurrebat morbus; imo ultimis diebus, ingruente paroxysmo, tussis sicca aegrum excruciabatur cum cephalalgia, et pulsus quidquam elevatiores facti sunt. In tanta morbi pertinacia tuum, praeceptor colendissime, effatum audiendum esse duxi. Suasisti ergo fomentationes frigidas *Schmuckeri*, loco dolenti adplicandas; linimentum volatile cum laudano liquido, ad partem femoris internam illiniendam; corticem vero peruvianum cum valerianae radice nubendum esse. Quodsi haec, dicebas, nullius essent utilitatis; tunc octo hirudines adplicentur inguini, experientia scilicet edoctus, quod aliquando, deficientibus etiam plethorae universalis indicibus, non desit plenitudo localis: qua nisi sublata, opiatorum vis eluditur. Res voto cessit. Coeteris enim irritis, hirudinum ope multus sanguis, isque densus, eductus fuit. Denuo porrectus est cortex cum opio. Sequens paroxysmus mitior fuit, altera vero die siluit omnis dolor, siletque feliciter.

EPICRISIS.

Morbi hujus rebellis descriptio debetur Auditori antehac nostro, *Petro Fogliani*,

M. D. *Mediolanensi*, tunc oppidi *Casalis-Pistorii*, medico stipendiato, felicissimo.

Glandularum inguinalium dignitas, non tanti hucusque, ac quidem merebatur, est habita (1). Morborum, quos contagia generant, non solum eorum, qui homini a coitu impuro insidiantur, sed febrium adeo vel maxime lethalium, has glandulas esse aut praenuncias, aut malignitatis testes, aut iudices, — effectuum etiam morborum diversorum, sedem eas sistere ultimam, non raro, prae illis, pertinacem — haec quidem medicorum neminem fugiunt. Sed de istis hic quaestio esse non potest; nostram vero attentionem meretur extrema harum glandularum, maxime in sexu virili, adproximante pubertate, sensibilitas, qua in pueris, si non omnibus, saltem in plurimis, vel antequam inguen pube contegatur, tenduntur ac turgent, incalescunt, subrubescent, attactum recusant, et pueri ingressum fere impediunt. Quo tempore haec ad inguina puerorum contingant, corporis in longum extensio celerius quam antehac augeatur; quae ratio est, cur hi tumores diversis in Germaniae provinciis *die Wachsbeulen*, *Wachsknoten*, seu nodi, futurum corporis incrementum denotantes, vocantur (2). Plu-

(1) Dignitatem earum perspexit P. J. G. Cabanis, et egregie exposuit in *Rapports du Physique et du Moral de l'homme*. Paris 1805. T. I. p. 344.

(2) Bubonem crescentium vocat *Sauvages* & alii *fugacem* adpellant.

res interdum per menses tumores hi, ab inexpertis interdum pro herniis falso declarati, continuant; febriculam interdum ac morositatem inducunt, nunquam tamen, quod sciamus, aut suppurant, aut contractam duritiem conservant (1). Quid sexus sequioris inguina hac pubescente in aetate patiantur, id, ob rei levitatem, illiusque verecundiam, rarius ad medicorum notitiam venit; ac forsitan glandularum mamillarum auctus tunc sensus ac tensio major, eorum, quae in pueris ad inguina contingunt, vices peragunt. Quodsi ex primo semine, a vasis lymphaticis resorpto, apud istos haec pendeant; quam

(1) Singularis morbus, et qui nonnisi ratione loci dolentis, et periodi, quam observat, adduci hic meretur: febris nempe anomala *elephantiam* inducens, seu pedis enormem tumorem. Oritur scilicet hoc malum cum *glandularum inguinalium* tumore inflammatorio; post nycthemerum aut longius tempus succedit tumor cruris inflammatorius, glandulae inguinales subsident. Plures ejusmodi insultus absque typo manifesto sequuntur, post quorum singulos pes magis magisque intumescit ad molem monstrosam. Cortex peruvianus in praecipiendo hoc malo perutilem se ostendit. Hunc insulae *Barbados* morbum describunt *Town*, on the diseases of the West-Indies, *William Hillary*, observations on the changes of the air, and the concomitant epidemical diseases in the Island of Barbados, pag. 304 *Hendy*, a treatise on the glandular disease of Barbados, *J. Rollo*, Remarks on the disease lately described by *Dr. Hendy*.

prompte hoc vasorum systema novo huic stimulo adsuescat, vel ex eo deduci potest, quod, priusquam prima seminis evacuatio locum habeat, inguinalium tumor glandularum jam diu subsederit.

Ad aegrum, cujus historiam hic tradidimus, quod spectat, rarissimus sane dolor ille inguinis est, quatuor ante annos, sub febre continua comparens, ab ista sanata, dispersus, tertium post annum, occasione febris intermittens, reversus, atque hac licet fugata, eadem sub periodo pertinaciter ac diu continuans. Justum erat sane, hunc dolorem, hora semper eadem tum reverti, tum dissipari solitum, cum cortice, — atque dum iste non sufficeret, cum opio, debellari. Cum interim ea, quae aliquo cum stimulo agerent, nullam hucusque opem tulisse compertum haberetur; non minus nobis aequum visum est, phoenomeni hujus causam simul ex vasorum sanguineorum ad glandulam inguinalem infarctu ac repletionem repetere; etsi, cur specialis haec plethora non continuo, sed modo periodice aegrum torqueret, minus esset intellectum. Hirudinum igitur officium, localium ejusmodi adfectionum, hoc demum subsidio devictarum exemplis edocti, proficuum fore duximus; ac revera, eodem adhibito auxilio, periodus quidem ipsa non protinus deleta, sed, quo per corticem opiumque tolleretur, praeparata, et combinato localis depletionis, cum internis remediis subsidio, felicissime fugata fuit; ut qui re-

rum eventus, eorum, quae, quondam de morbis periodicis monuimus (1), doctrinam confirmat.

Quo interim morborum periodicorum causis minus communibus plus lucis adfulgeat, sequentem hic observationem subnectimus.

CARUS PERIODICUS A VERMIBUS.

Antonius Chizzoli, annorum circiter tredecim, die 20 maji 1790, hora secunda pomeridiana, nullo praevio horrore, paulatim a somno corripitur, sensim tam profundo, ut sexta hora accedens, nullis eum irritamentis excitare potuerim. Respiratio erat admodum pacata; flaccidis omnino artubus puer jacebat prostratus. Pulsus mollis, expansus erat, facies pallida; maxilla inferior perdifficulter a superiore deduci potuerat. Per omnem noctem hoc in statu permansit aeger, mane vero expergefactus, ferme stupidus erat, ac de lassitudine conquestus est. Lingua flava, et mucos obducta sistitur. De ventris torminibus elapsis diebus puerum conquestum esse adstantes affirmant. Accedente hora pomeridiana secunda, ille iterum hesternum in statum delabitur, et sex dierum spatio hanc morbi periodum constanter observavi. Tertianae, aut perniciosi generis febres tunc temporis apud

(1) Oratio Academica de periodicarum affectionum ordinandis familiis, *Ticini R.* mense maji 1791 recitata. Continetur haec oratio in *delectus nostri opusculorum medicorum*, Vol. X.

nos minime regnabant. Nullum verae febris aderat signum. Facies non erat, qualem in febribus soporosis omnibus vidi, vidi autem et curavi quamplurimas istarum in atmosphaera paludum *Pontinarum* malesana medicinam antehac exercens. Lurida etenim ejusmodi aegrorum facies a medico dignoscitur quidem, sed calamo describi non potest. Hae igitur considerationes dubium mihi omne de febre perniciosa sustulerunt; morbum hunc autem *carum periodicum a vermibus* nominavi, cujus scilicet exemplum nec ipse videram; nec apud alios Auctores descriptum legisse memini.

Primis tribus morbi diebus incassum adhibita fuerunt et anthelmintica et laxantia, quovis mane, dum evigilaret puer, propinata. Porrigebatur autem pulvis ex radicis *Valerianae sylvestris* et *Seminum Santonici* ââ *Scrupulo uno*, ex *diagrydii sulphurati granis duodecim*, et *mercurii dulcis granis sex*. Hinc dicto huic pulveri adjunxi unctionem ex olei laurini, tincturae *Myrrhae*, et *Aloes* ââ *drachmis duabus*, pulveris *Gummi aloes drachma una* (1). Et revera, repete quater aut quinquies unius diei curriculo hoc unguento, circa umbilicum illito, copiosos aeger ascarides lumbricoideos deorsum rejicere cepit, et sex dierum spatio, hospitibus his ad judicationem

(1) Hoc unguentum summopere commendarunt cl. *Brugnatelli*, *Bibliotheca fisico-medica T. VIII.* et *Dr. Boy.*

perfectam expulsis, excusso somno, ad pristinum valetudinis statum revocatus fuit (1).

EPICRISIS.

Longe absumus certe, quin vermibus potentiam in corpus humanum tribuamus, quam toties causae aliae, negligenter nimis erutae, jure longe majore sibi vindicant. Interim si visceralia haec et nobis domestica animalcula, ex primis viis in nervos longinquos, his amicos, agendo, et vocem puerorum, et visum pro tempore, quod et nos experientia docuit, abolere queunt; cur sensus illa plures sopire, hominemque in somnos prosternere non possint, non perspicimus. Nec periodice hos ab illis effectus produci mirabitur, qui nova ad fercula, periodice oblata, vermes data hora adrepere, suumque cum homine prandium, non satis aequa semper bilance, dividere, considerat.

Febres periodicas cum caro aut lethargo incedentes, plerumque ad *perniciosas* spectare, certum est; in praesente vero casu *larvatam* magis *febrem* (sollicite a nobis, in *Epitomes* L. I. §§. 32. 36. 46. destinctam) quam *malignam* subfuisse, adparet. Nullum nempe, morborum licet diversissimorum, symptoma est, quod illa sibi arripere, propriumque sub illo characterem,

(1) Observationem hanc, pluresque alias, nobiscum communicavit Joannes Vinelli, M. Dr. noster quondam Auditor egregius.

solius periodi, minorisque ac in *perniciosa* discriminis ratione internoscendum, abscondere non valeat. Cum vero clandestina morborum pericula vel sero nimis patefieri, vel ex signis parum fidei praesagiri, sortem aegrorum, in primo casu, funestam, in altero, ambiguum valde, et quam medicus, ob firmæ diagnosis defectum, vix corrigat, esse sinit; hinc, quanti intersit, ut larvam hic febris, *perniciosa* simulanti, mox detrahat, vel sponte elucet. Non minoris certe momenti, matura febris, quam *subcontinua* vocavit *Tortius*, a vera continua remittente, distinctio est; sed utraque in re, paludosis imprimis in locis, iliacos intra muros peccatur et extra. Sic anno 1789 in conspicuo ducatus *Mantuani* oppido regnavit sub autumno, febris epidemica primo aspectu continua, quam per sanguinis missiones, cum insigni aegrorum strage debellare conatus est medicus. Alter tunc, qui hanc averteret, a *Mediolanensi* supremo Gubernio missus fuit; qui recte quidem cruoris detractionem damnavit; sed morbum pro febre *biliosa* declarando, emetica et alvum evacuantia non pauca, cum eventu non minus sinistro, propinavit. Junior tunc, sed circa febris tum *perniciosa*, tum *subcontinuae* indolem prope instructus, medicus accessit. Hic, tempus autumnale, loci positionem paludosam, regnantes in vicinis pagis circumcirca febres periodicas; morbi epidemici, inter duas accessiones, breves quidem, sed notabiles, certisque fere horis

concessas aegris inducias, — num quidam ex istis, antequam eos febris acuta prehensisset, febre primum periodica, quae in continuam transivisset, laboraverint? — num inter paucos, qui ex febre epidemica evaserint, fuissent aliqui, in quibus haec intermittentem in febrem mutata fuisse videbatur? — atque dum utrumque confirmari audivisset, num urinae aegrorum plurimorum sedimentum lateritium deponerent, num febris accessiones cum sudore conspicuo sederent, num exacerbationes sub suo ingressu vehementius mox urgerent, vel modo sensim sensimque ad ammen pervenirent, inquisivit; his singulis ita se habentibus, febrem ad subcontinuum pertinere conclusit, eandem solo cum cortice, ad artis regulas porrecto, in omnibus, quos curandos susceperat, felicissime ac prompte fugavit.

Non aliter cum febribus *larvatis*, aut adeo cum *perniciosis*, res constitutae sunt. Ac primo quidem *perniciosae*, dum caput suum exserunt, vel nullum eae, quo a febre periodica benigna distinguantur, proditrices, phaenomenon offerunt; vel minus subdolae, terrificae mox, et interdum sub quovis paroxysmo mutata facie comparent; sed donec prima per funera character earum deletilis se prodat ac cives consternat, paucae sunt, quae easdem, larvatis a febribus, nisi forsitan mitioribus, distinguant, symptomata. *Gregales* tamen fieri, vel adeo *epidemicas* esse amant *perniciosae*; dum *larvulae* febres, *solitariae* magis, modo

hunc vel illum corripiant. Regionibus illae paludosis, sub coelo minus rigido, nisi character epidemicus haec suppleat, fideles sunt; *larvatae* vero febres indistinctim ubique nascuntur, nec praegressis funeribus infames sunt. Extensissimas in *Polonia* et *Russiae* Imperio paludes conspeximus, ac de noxiis harum in *Italia* effluviis edocti, ex simili causa similes effectus timuimus; paucae interim febres intermittentes illas inter paludes, — *perniciosae* vero paucissimae succrescunt. Septentrionalibus nempe magis in oris sol aestivus, etsi fervidissimus, ac a nocte breviori modo parum interruptus, vix duorum spatio mensium, terrae superficiem ad non magnam profunditatem penetrare, nec inferiorem huic glaciem solvere consuevit: unde superiores huic fundo congelato paludes nec tam intense putrescere, nec tam infesta mortalibus effluvia spargere queunt. Atqui si haec, febrium *perniciosarum*, nisi epidemico magis, quam paludoso influxu natarum, proventum fere impediunt; non tamen *larvatas* hinc inde subnasci vetant. Manet igitur, secundo, idem de his febribus *larvatis*, quam quod de *subcontinuis* retulimus, iudicium: ac aeris, loci, aquarum natura, anni tempus, morborum simul regnantium indoles, aut etiam absentia, in genere vero, alia, de morbo epidemico in ducatu *Mantuano* regnante capta indicia, medicum rectiora docebunt. In puero, cujus historiam hic tradidimus, interea ac nullae intermittentes febres, vel

benignae, vel perniciosae, regnarent, ventris praecesserant tormina, hac in hominis aetate frequenter a vermibus produci solita. Etsi vero *stupiditas* cum lassitudine post absolutum paroxysmum reliqua, *Werthofio* quondam, furente scilicet epidemia, justum *perniciosae* febris metum incusserit; plures tamen, suspecti licet, paroxysmi ab aegro absque vitae dispendio transacti, maxime vero coloris illius luridi, ac strangulatis vix non hominibus in facie fere proprii, notique medico ordinario, in perniciosarum cura non parum certo versato, habitus his febribus proprii absentia, diagnosin morbi, aliis difficilem, minus arduam reddere, debitamque methodum indicare valuerunt.

FEBRIS INTERMITTENS URTICARIA.

Demetrius Rostislavov, Academiae medicochirurgicae *Petropolitanae* alumnus, medicinae ac chirurgiae candidatus, aetatis 23 annorum, constitutionis debilis, parum bene nutritus, vitam agens sedentariam, ac refrigerio frequenter expositus, praeter exanthemata aetati juvenili propria, tribus abhinc annis alterum passus est, per squamas saepe resolutum. Ob hoc ipsum, per multos menses, et emetica sumpsit, et alvum purgantia repetite adhibuit, viresque non multas sibi magis infregit. Mense julii 1805 morbum, ei, quem nunc descripsi mus, similem, per duas hebdomadas passus est.

Die scilicet 31^a mensis januarii 1806, calere incepit, ac deinde, ob nimium sudorem languidus, in lipotymiam incidit; a qua tamen, frigido liberoque coelo expositus, mox iterum restitutus fuit.

Die 2^a mensis februarii, circa horam septimam matutinam, vix a somno, per omnem noctem minus quieto, excitatus, horrorem ac frigus persentiens, lectulo se denuo commisit; mox vero de capitis dolore ac nausea conquestus est. Sequitur haec, vomitus ter quaterve repetitus, nil praeter mucum tenue, aquosum rejiciens. Post vomitum, calor ardens illico per totum corpus expansus fuit, a quo, capitis dolor, pristino longe vehementior, ventris tormina, sitis maxima, secuta sunt. Frigidam, vix haustam, aeger cum summo rejecit impetu. Sub hoc rerum statu tandem proruperunt incute papulae, primum quidem distinctae, paulo post tamen confluentes illis similes, quas cutis ab urticis caesa, pati consuevit. Simulac vero hae papulae per cutem omnes effloruerant, dolores undique atrociter fuerunt adaucti. Insignis abhinc anxietas, jactatio, inquietudo, ac morituri quasi hominis pallor et debilitas insecuta sunt; atque hoc sub statu, miser juvenis in clinicum Institutum *Petropolitanum* delatus fuit. In lecto tepido aliquamdiu detentus, pruritus aeger atrocem, sub quo cutem sibi cum unguibus vix non lacerabat, persensit.

Mox balneo tepido commissus fuit aeger. Praeterea infusum Sambuci, cum aceti am-

moniacalis uncia una , et spiritus nitri dulcis drachma una , omni semihorio ad cyathum dimidium sumendum , praescriptum , simulque clyster ex infuso chamomillae, cum oleo lini , injectus fuit.

Post horas aliquot , multum sese sublevatum sensit aeger ; et ad vesperas , maxime vero die subsequente , quam optime se habuit.

Non diu interim res ita se habuit : cum enim hic juvenis et sibi, et sociis, a morbo restitutus videretur ; die 4^a februarii, prima post mediam noctem hora, de novo invasus fuit. In hoc tamen hodiernus paroxysmus a pristino differebat : quod frigus deesset , ac cephalalgia , quod antehac non contigit , antecederet ; quod nullus ab exanthemate pruritus esset ; quod istud minus hodie conflueret, nec insulas, quas heri, formaret. Quamvis interim mitiora haec videri potuerint ; major tamen aegri debilitas insecuta est , pulsus exiles celeresque , capitis dolor admodum molestus , anxietas ferre continua fuerunt. Praeterea singultus per plures horas, etsi non violens, aegrum vexabat ; somnus nullus, sed perpetua corporis jactatio fuit. Urinae rubrae et crassae , majore tamen copia , quam sub prima invasione , secedunt ; alvus vero nulla est.

Hac sub rerum positione , infusum radicis angelicae cum spiritu nitri dulci, quavis hora , dimidium ad cyathum , intermedio vero tempore granum camphorae pro-

pinantur, clyisma injicitur, ac tepidum in balneum aeger iterum demittitur.

Die 6^a, ante mediani noctem, nova denovo suboritur accessio, brevior tamen pristina, et mitior. Exanthema minore copia superiores modo extremitates obsedit, mox vero disparuit. Sudor minus abundans a paroxysmo secutus, alvus vero aperta est. Major interim oris amarities, simulque evidentior aegri debilitas comparent. Inquietudo continua inter coetera symptomata eminet, omnemque somnum prorsus excludit.

Periodo morbi evidentius nunc cognita, Corticis chinae flavae, in vino rubro maceratae, grana viginti quavis hora porrecta fuerunt.

Die 7^a Duplex hodie chinae dosis omni hora ingeritur. Sequitur nox tranquilla, nec ullus sub ea paroxysmus aegrum invasit.

Die 8^a Cum res optime incederet, corticis modo decoctum cum spiritu nitri dulci, quovis bihorio porrigitur. Post paucas dies, amarorum sub usu, sanitas perfecta aegro restituta fuit (1).

FEBRIS INTERMITTENS URTICARIA.

Joannes Volk, faber ferrarius 20 annorum, tres ante annos gravi morbo per decem hebdomadas detentus, ab eo sanus

(1) Historiam hujus aegri conscripsit *Gregorius Elpidinky*, Academie Petropolitanae medico-chirurgicae alumnus.

vixit. *Die* vero 22^a aprilis 1804, post validiora corporis exercitia, vino quidquam indulgit. Ad noctem ille a calore prehenditur eaque insomnem transigit. Ad horas matutinas sudor aliquis subsequitur.

Die 23^a melius se habens aeger, lectum deserit et cum sociis cursu certavit. Calefacto abhinc corpore atque defatigatus, cerevisiam ingurgitat.

Die 24^a *Scena* prima de nocte repetitur. Cephalaea fortis, tussis frequentior, dyspnoea, dolor pectoris, calor, somnum arcent. Sudor subsequens morbum sublevavit.

Sic omni tertia die febris rediit usque ad 27^{am} aprilis; sub cujus die paroxysmo, medio sub calore nocturno, exanthema prodit, urticariae, secundum aegri descriptionem, simile, sed quod hac ipsa die nosocomium adiverit, e cute dispersum.

Die 28^a Aprilis 1804, aeger in clinicum Institutum *Vindobonense* suscipitur. Compagem corporis ille offert sat firmam. Calor moderatus, pulsus debiles, non admodum frequentes sunt. Dolet caput, ardent oculi, sitis magna est; tussis frequens et sicca, respiratio, propter dolorem punctionum in latere sinistro difficilis, decubitus hanc in partem impediens. Urticariae exanthema sub quavis accessione comparuisse refertur.

Decoctum radicis althaeae stipitumque dulcamarae, cum roob sambuci praescribitur.

Die 29^a De nocte fere nihil aeger dor-

mivit. Pruritus per omnem corporis superficiem, tussis, calor febrilis hominem vexarunt. Exanthema urticariae nunc a nobis quoque in plena efflorescentia conspicitur. Sputa sunt mucosa, tenacia. Dolor pectoris punctorius disparuit. Acetum ammoniacale decocto supra dicto superadditum fuit.

Post largum sudorem, vespere exanthema disparuit; perstabat tamen febris, sitis erat magna, tussis multa.

Die 30^a Nocte bene dormivit, non multum tussiit, sputa mucosa, tenacia, cum notabili ad pectus levamine rejecit; alvum, et urinas sat multas excrevit. Ad vesperas apyrexia notabili gavisus est aeger.

Die 1^a Maji. Nox fere insomnis fuit, calor magnus, febris valida accesserunt, sub quibus urticariae denuo exanthema prodixit. Sputa sunt tenacia. Praescribuntur sequentia:

R. Infus. fl. sambuc. onc. vij.

Tartari emet. gr. j.

Spirit. Minderer.

Syrup. simpl. â unc.

Capiat omni bihorio unciam.

Hora prima pomeridiana, sub sudore, exanthema iterum disparuit.

Die 2^a Maji. Febris nulla. Tartarus emeticus in medicina omittitur.

Die 3^a Hora septima matutina frigus aegrum concutiens accessit, ad duas horas extensum. Sequitur hoc calor trium hora-

rum . Sudor successit , quem plena apyrexia excepit.

Decoctum corticis peruviani saturatum , cum liquore anodyno minerali praescribitur . Ob oculi dextri inflammationem (1) , decoctum emolliens pro fomento huic parti imponitur.

Die 4^a Nulla febris.

Die 5^a Hora septimā matutina , haec iterum comparuit . Ob dolorem oculorum ac ruborem , nuchae vesicans impositum et sequens collyrium praescriptum fuit.

R. Aquae rosar. unc. vj.

Mercurii sublim. corros. albi , granum unum.

Mucilag. gum. arab. Dr. j.

Tincturae anodynae Dr. β.

Ter in die oculis immittantur guttulae collyrii aliquot.

Vespere , febris nulla , inflammatio oculi , imminuta.

Die 26^a Apyrexia adest perfecta, sub qua, cortex chinae flavae ad drachmam dimidiam omni bihorio in pulvere porrectus fuit.

Die 7^a Febris nulla accessit. Ophthalmia leviora offert symptomata.

Die 8^a Ob febrem fugatam , infusum

(1) Ex dispersa e cute urticaria, ophthalmiam adnotat Koch , Pr. de febre urticata. Lipsiae 1792 p. 14.

amarum porrectum fuit. Ophthalmia sensim sensimque disparuit (1).

FEBRIS INTERMITTENS URTICARIÁ.

Joannes Michelieux, textor sericarius, aetatis 29 annorum, compagis corporis mediocriter firmæ; superatis infantiae morbis, bona semper gavisus est valetudine; donec militiae in *Italia* addictus, febrem intermittentem contraxerit, sub cujus recursu sanguinem e pulmonibus rejecit. Fugata per corticem febre, tum haec incommoda, tum aliqua ex commercio cum foeminis impuro contracta, silaerunt.

Vindobonae, artem sericariam exercens, vir hic juvenis die 15^a junii 1804 a febris intermittens symptomatibus corripitur, per sudorem terminatis.

Die 16^a Junii febris nulla.

Die 17^a Eadem, qua nudius tertius, hora, febris aegrum corripit, accedentibus vomitu, doloribus colicis, et exanthemate urticariae cum pruritu. Solvitur paroxysmus cum sudore.

Die 18^a Febris mane nulla. Alvus hodie ab accersito medico, exhibito purgante, trigesies evacuata fuit. Eadem adhuc die, post talia, febrilis paroxysmus validissimus, ac per integram noctem continuans, secu-

(1) Medicus aegro adsistens fuit et historiam ejus conscripsit *Paulus Macerata*, Medicinae Candidatus.

tus est. Hac etiam sub accessione , post sudorem , pruriens urticariae exanthema aegro molestum fuit.

Die 20^a Apyrexia huic conceditur.

Die 21^a Rediit quidem , sed mitior paroxysmus fuit ; nec enim aut vomitus , aut dolores colici , aut exanthema redierunt ; sed levis sudor accessioni finem imposuit. Ad institutum clinicum *Vindobonense* aeger se contulit. Caput hic liberum esse , sitim vigere , abdomen , molle quidem , in regione epigastrica tamen tumere , comparuit.

Ob febrem periodicam satis manifestam , corticis peruviani flavi drachma integra quovis trihorio porrecta fuit.

Die 22^a Febris nulla. Eadem medicina porrigitur.

Die 23^a Consueta febris non accessit.

Die 24^a Optime dormivit , nec de re ulla conqueritur aeger.

Seposito cortice , infusum amaricans praescribitur. Post paucas dies aeger sanatus dimittitur (1).

EPICRISIS .

Cum in *Epitomes* libro III. §. 308. de urticariae divisionibus ageremus , monuimus breviter : « nos quidem hoc in morbo aut nullam febrem , aut certe benignam , leni-

(1) Historiam morbi hujus , idem , qui priorem , conscripsit medicus.

terque inflammatoriam observasse; sed aliorum, de morbo satis maligno, vel cum remittente, ac *intermittente* febre conjuncto, observationes non deesse. » Huc nempe *Sauvagesii* tertianam urticatam, qualem *Planchon* (1) descripsit, — huc *Esseram*, quam ad urticariam revocavimus, et quam *Cleghorn*, in modum tertianae febris in Insula *Minorca* incedere monuit (2), retulimus; atque huc denique *Kochii*, larvatas sibi febres intermittentes cum urticaria occurrisset, assertionem (3), referimus. Ab eo vero tempore, quo haec scripsimus, innumeras inter urticarias, modo *tria intermittentis urticariae exempla* nobis ipsis obvennerunt; quae igitur ad morbi, sub facie tam varia comparentis, meliorem cognitionem communicare hic volumus.

Ob eandem rationem raram, viri clari, in Academia *Pisana* nunc medicinae practicae et Clinices Professoris, *Aloysii Morelli*, nostri antehac Auditoris, observationem de urticaria cum typho et cum gangraena incedente, qualem nobis jam multos ante annos communicare voluit, hic simul subjungimus.

(1) Journal de Médecine juillet 1765. p. 75.

(2) Observations on the epidemical diseases in Minorca. London 1768.

(3) Pr. de febre urticata. Lipsiae 1792, p. 14.

Mulier quadragesimum primum aetatis annum emensa, quae decimo quarto vitae anno menstruis subjecta, vigesimo autem, viro nupta fuit, solitis in juventute exanthematibus absolutis, exceptis quibusdam febribus tertianis, semper perfecta valetudine gavisa est, donec anno 1789, nosocomio *Bononiensi* suscepta, febris, quam rheumatico-gastricam vocabant, symptomata exhibuerit. Alvus aegrae primum cum sale amaro, et cum rhabarbari radice evacuato, tres vero posthinc venaesectiones institutae fuerunt. Quinta jam morbi die, typhi symptomata comparebant. Sextam inter et septimam febris diem, noctis tempore haec mulier, non adeo de pruritu, quam de sensu, ac si quavis universae cutis plaga multis pungeretur aciculis, conquesta est. Altero die, brachia aegrae undique a maculis rubris, inordinatis oblecta fuerunt. Qui cutem hominis cum urticis caesam unquam conspexerat, ille circa indolem hujus exanthematis dubius haerere non potuit. Multae conspiciebantur areae albae, seu cutis colorem naturalem referentes; aliquae ex maculis rubro colore, quasi per epidermidem transparente instructae erant. Major harum numerus et brachia, et dorsum obsedit; ad crura paucissimae comparebant. Nullum morbi ab hoc exanthemate decrementum fuit, sed intenso febris ordine continuavit. Clinices hinc antistes febris pu-

trido-malignae urticariae morbo nomen imposuit. Per omnem morbi diem septimam, exanthema in cutis superficie sic floruit; octava vero fere in integrum ex ea disparuit, paucis maculis exceptis, quae ad pisi magnitudinem assurgebant, ad basin intense rubrae, versus apicem vero subalbidae. Nona morbi die fortis dolor extremitates inferiores corripuit cum rubore magis pallido. Die decima, color crurum, quae dolor deseruerat, lividescebat. Cum omni ratione perspicacissimus Professor gangraenam vicinam praevидit, atque camphoram hinc, cum tinctura myrrhae, aquae calcis ope praeparata et corticis peruviani decocto praescrispsit. Die undecima, singula gangraenae symptomata in cruribus offerebantur. Lintea tunc, decocto Corticis saturato, et Tinctura aloes cum aqua calcis praeparata, probe imbuta locis gangraenosis superimposita fuerunt. Omnis haecce cura fuit inutilis: sphacelus nempe his locis superaccessit, et cutis per frusta secessit. Chirurgo nosocomii primario in consilia accersito, pulvis corticis chinae locis sphacelosis inspersus, in fomentationibus vero et interno corticis usu continuatum fuit. His interim non obstantibus, aegra, morbi die decima quarta, e vivis erepta, ejusdem vero cadaver, ob contagii formidinem, non dissectum fuit.

Ex relata observatione apparet, corrigendum esse locum *Epitomes* L. III. §. 311 p. 112 quo » facile nobis videri dicebamus, exempla, quae de *urticariae malignitate* referuntur, ad aliam longe aegritudinem fuisse referenda. » Quamvis nempe casus, quem *Lachausse* sub febris *urticariae* nomine descripsit, et in quo, dum sub pessimis ille symptomatibus incederet, exanthematis vesicae virulentam habuisse indolem, ac pus, contagii non expers, continuisse dicuntur (1), ad *pemphylum* magis *acutum*, quam ad *urticariam* referendus esse videatur; verae tamen specimen *urticariae*, cum summo vitae periculo incedentis, descriptionem tradidit *Monsey* (2); et apud *Kochium*, pleuritidem subito sublatam, febrisque nervosae symptomata, simulac papulae urticae in cute efflorescerent, cito pacata fuisse legimus (3). Ab *urticaria*, cerebri hydrops describitur (4), et ab impedita *urticariae* ad cutem efflorescentia, exitiosam metastasin ad encephalon subito

(1) Journal de Médecine, année 1772. T. 37 p. 28.

(2) Medical transactions published by the college of physicians in London. Vol. I. p. 173.

(3) Koch, Pr. de febre urticata. Lipsiae 1792. p. 14.

(4) Sammlung auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. IX. B. S. 368.

factam esse retulit *Cleghorn* (1), In casu a *Morelli* descripto, et a nobis hic exposito, febris qua mulier laborabat, pro rheumatico-gastrica declarata, eademque primum debilitante, admodum cum methodo tractata fuit; sed typhum vel jam primis morbi diebus hac sub febre latuisse, vel eundem dicta sub methodo citius evolutum fuisse eo magis suspicamur; quod non rarum sit, hunc etiam morbum, in suis principiis, et dolores quasi rheumaticos, et falsam pulsum plenitudinem, et gastrica symptomata fingere. Fatemur interim, quod, dum typhum petechiae, echymoses, miliaria, parotides, pemphigus acutus, erysipelata, frequenter comitantur; *urticariam* hos inter typhi satellites nunquam nobis esse oblatam, atque hinc primum magis morbum, quam typhi symptomata hoc in casu exhibuisse, nobis videri. *Rheuma* interim, quod per quatuor jam menses dolorem in brachio continuum excitaverat, comparente ad cutem urticaria, subito dissipatum fuisse, in feudis *Italiae* Imperialibus A. 1792 observavimus.

Sed de quo, in Epitome nostra, nullis nempe tunc propriae observationis exemplis muniti, mentionem nullam injecimus, *chronicus* est *urticariae habitus*. Jam *Heberdenius* interim retulit, se vidisse aegros, qui per plures menses urticaria laboraverint; alios autem, qui per duos annos nonnisi

(1) On the epidemical diseases in Minorca. London 1768. p. 240.

brevi temporis spatio hoc a morbo liberi vixerint ; alios demum , qui per septem , vel decem annos hoc de morbo essent con-questi (1). Verisimile quidem est , non paucos homines , frequentius in vita , vel et plures per annos , hoc a morbo vexatos , ideo , quod levioris eum momenti esse credant , nullam apud medicos ejusdem mentionem injicere ; miramur interim , a tempore quo *Italiam* liquimus , non modo plura , sed summopere incommoda aegris , *chronicae urticariae* nobis exempla occurrisse , quorum numerus septentrionalibus , quas serius petiimus , in oris longe fuit adauctus. Inutile foret , diuturni adeo morbi historias hic vel multas , vel integras referre ; hinc paucas modo ac breves aliquorum , quos ipsi conspeximus , narrationes , non historico modo , sed prope quotidiano sermone exponemus.

URTICARIA HABITUALIS MENSTRUUA.

Habitualement ac menstrua vidimus *Esseram* , die 26^a maji 1796 , in foemina , quae , ob colicam saturninam , in clinicum *Vindobonense* Institutum suscepta fuit. Per septem jam annos haec mulier , semper per octo fere dies , antequam menstrua ipsi prorumperent , ad dorsum , brachia , pectus , hanc esseram est passa ; atque tunc etiam ,

(1) Arzneykundige Abhandlungen der Aerzte zu London. II. B. No. XI. S. 131.

cum absoluti jam menstruis haec aegra nos adivit, morbum illum in cute adhuc perstantem observavimus (1).

URTICARIA HABITUALIS ALTERA.

Nobilissima virgo *Vindobonensis*, cum in tenera adhuc aetate versaretur, continuum fere in cute pruritus persensit, ita ut a scalptu cum unguibus, quibuscum superficiem corporis vix non dilaniabat, arceri satis non potuerit. Dimidio anno prius ac menstrua prodierint, prodiit huic virgini urticaria, imprimis ad crura, ut maculas palmae magnitudinis hoc exanthema formaret, gressusque frequenter impediret. Continuarunt haec, nec ulli medicamento cesserunt, donec et venam sibi aperiri curasset, ac tandem menstrua secretio sibi viam parasset. Post haec satis bene se habuit puella; sed jam iterum, cum menstrua essent parciora, et chloroseos subintrassent symptomata, per duos jam annos, saepissime comparet urticaria, quam oculis nostris A. 1797 subjecit; tum ad brachia coeterumque ad corpus, tum imprimis ad crura. Valde elevatae sunt hae maculae, sub frigore potissime erumpunt, ac pruritus intolerabilem virgini producunt. Notabile hoc in exemplo est, *pruritus* insignem in tenera aetate per plures annos, *absque ma-*

(1) Eandem mulierem bis urticaria, menstruorum ante tempora, laborasse, observavit *Samuel Vogel*, Handbuch der Arzneywissenschaft. 3. B. S. 275.

culis , — tandem vero et istas , quin interim pruritus cessasset , accessisse.

URTICARIA HABITUALIS EX TERRORE RECIDIVA.

Nobilis matrona *Vindobonensis* , 45 circiter annorum , pluribus retro ab annis urticaria per omnem corporis superficiem dispersa , continuo laboraverat. Cum anno 1802 per plures menses haec mulier decocto radicis sarsaparillae , ac pilulis , a nobis , ex gummi guajaco , extracto dulcamarae , camphora et aethiope antimoniali praescriptis , uteretur : exanthema hoc in integrum disparuit . Dum interim , duos circiter post menses , balnea in ducatu Salisburgensi *Gastrinensia* frequentasset haec aegra , et sub itinere , ex lapsu rhoedae , in vitae periculum incidisset : eo ipso momento exanthema urticae , majore ac unquam alias copia , ad omnem cutem prorupit ; ab illo vero tempore hanc more solito infestare continuat.

URTICARIA HABITUALIS COELI RIGIDIORIS SOBOLES.

Insignis eorum , quos urticaria per annos sibi subjugat , in *Russia* est numerus , in *Italia* fere nullus . Alienigenae , qui coelo magis benigno adsueti , suam hoc in imperio sedem figunt , huic morbo cutaneo prae aliis subjecti vivunt. Sic nos ipsi , dum anno 1804 , mense octobris , senescentes , *Vil-*

nam in *Lituania* petiimus, primis mox mensibus urticariam experti sumus, per quatuor annos, partim hac in civitate, partim *Petropoli* transactos, extensam. Nec adeo in *Austriam*, dein vere in patriam reduces, haec nos cutis adfectio, etsi hic longè mitior, deseruit. Sine febre constanter hic morbus incessit, saepe ipsam ad faciem, ad frontem, brevi tamen tempore hic dispariturus, effloruit. Saepe profundum, quasi culicis, ictum sub cute persensimus; a frictione vero istius, urticariae mox papulae prodierunt. Scalptus in una parte locus, ut pars vicina scalperetur, coegit. Manus, matutinas ad horas cum tepida lavantes, ad illas, praevio ustionis sensu, mox papulas assurgere conspeximus. Nulla tamen nobis ex disperso e cute exanthemate anxietas successit.

Majore cum furore urticaria faeminae juvenis, familiae nostrae addictae, et cum ea *Russiam* advectae, cutem longè sensibilio-rem vexavit. Corpus nempe illa universum, aurae frigidae vel quidquam expositum, per quatuor annos, non maculis modo latissimis, ac igneis, sed simul hinc inde, ad crura potissime, tuberibus, ovi gallinaei magnitudinem aequantibus, occupavit; ac per horas, ob intolerabilem pruritus, ardorem somnum omnem, donec omne sub lecti calore exanthema evanesceret, exclusit. Nec trienni fere spatio, quo aegra meridionales magis ad plagas reversa est, cutis transitoria haec labes, etsi multum in-

fracta , a suo dejicitur imperio ; sed levio-
re adeo frigidiusculae aerae favente adflatu,
pristina mox sede cutanea , indomabilis hu-
cusque potitur .

URTICARIA TUBEROSA .

Etiam si forma urticaria exterior , vel uno
eodemque in aegro , nunc haec , nunc illa
esse soleat ; ita ut in pueri septennis artu-
bus , praecipue inferioribus , communem ea
nobis aspectum lacerum offerret , in facie
fidelem *esserae* imaginem exhibuerit ; non
inutilis tamen varietatum hujus morbi , ne
pro alterius familiae prole declarentur , de-
scriptio est. Quod de *urticaria tuberosa*
exemplum in *Epitomes* nostrae L. III. §.
309. p. 108. sq. descripsimus , ac M. D.
Paulo Eusebio M. Berdoni , medico *Man-
tuano* , ac nostro quondam Auditori egre-
gio debemus ; illud , anno 1794 , in juvene
rustico , 25 annorum , variis tamen sympto-
matibus exceptis , observavimus . Hic nem-
pe juvenis , sub hieme anni 1793 , absque
causa sibi cognita , tumoribus cutaneis , ru-
bris , quamplurimum elevatis ac prurienti-
bus , per diem unum aut alterum obtectus
fuit. Disparebant hi tumores , sine quavis
tamen anxietate , sub calore non magis ,
quam sub frigore , unius vel alterius diei
spatio , et quin ulla cuticulae separatio con-
tingeret. Mox vero alii aliis in partibus com-
parebant , ubi vino indulgeret aeger , majore
cum pruritu erupturi. Interdum hic ju-

venis, hoc a malo, per quindecim dies immunis incedit; sed iterum efflorescit hoc magnum exanthema vel ad artus; vel ad truncum, vel ad faciem, quae ultimae summopere abhinc tument, ut oculos fere claudant. Antequam vero hi tumores compareant, somnolentus sit aeger, quae tandem somnolentia, a facta exanthematis explosione, protinus disparet. Venam aeger sibi absque emolumento aperiri curavit. Decocto, cujus nos compositionem ignoramus, absque fructu adhibuit. Quo tempore, ad nos consulendos, iter susceperat aeger, ad pedes hi tumores praemagni, incessum praepedientes, pernionibus adspectu non dissimiles, exsurrexerant.

Plerumque certe urticaria in frigida atmosphaera efflorescit, in calida fere, aut in totum evanescit. Jam *Carolus* interim *Musitanus* de *essera* dixit: « solent aliquando haec tubercula, ut multoties observavimus, dum aegri in loco calido sunt, emergere, et dum frigido se exponunt aeri, evanescere; quandoque contra, in frigido emergere, et in calido evanescere » (1). Nostro tamen in juvene, hi tumores tam sub frigore, quam sub calore, aequali ratione, disparebant; nec est cur vel in illo, vel in isto, signum morbi characteristicum quaeras. Fixius etiam hi tumores, quod communis urticaria non facit, per diem unum alterumve in cute persistebat. Promp-

(1) Opp. om. T. I. p. 45.

tior interim eorum ex hac dispersio , reditus frequentior ac subitaneus , pruritus insignis , praecedens illos somnolentia , ac istius ab efflorescente exanthemate cessatio , *urticariae* hunc morbum familiae cum jure subordinant.

GANGRAENA PEDUM A FRIGORE .

Josephus Gyurkovits, equorum in saltu instruendorum stabularius , 56 annorum , die 13^a mensis novembris 1798 , tempestate frigida et humida , iter pedestre instituit , cui absolvendo tres horas vix impendit . Vestibus interim in totum madefactis , ac coeli injuria saeviente , tantam vir hic lassitudinem , ut media in via fere concideret , persensit ; maxime vero *titillationis ardorisque* ad plantas pedum sensus , gressus impediabant . Curru hoc rerum sub statu susceptus , diversorium tandem accessit , ante cujus limina prae virium jactura sustinere sese ac descendere impos , in humum concidit , pectus leviter , inguen vero ad lapidem tanto cum impetu , ut statim hernia prodiret , allidit . Defertur ad hypocaustum probe calefactum , atque hic , aliquo virium sub reditu , mox dolorem utroque in pede magnum atque pulsantem percipit : quo sensim ad summum gradum provento , dum calceos aeger ac tibialia deponeret singulos pedum digitos sibi livescere , coeteras vero illorum partes ad malleolos usque rubere atque tumere observat . Ad noctem ,

in pedis sinistri digitis bullae eleuantur, quae die subsequente vel sponte diruptae, serum cruentum effundunt. Huic malo, praeter unguentum de cerussa, nihil auxilii adponitur, sed suae sorti commissus aeger, viribus aliquantulum restitutis; nec a frigore, nec a calore correptus, ad Vienneuse nosocomium defertur: ex quo, tam ob morbi, hac tempestate, his in terris non tam rigida, raritatem, quam ob magnam instructionis publicae occasionem, etsi hic casus ad chirurgiam magis spectare videretur, ad clinicum Institutum die 19^a novembris ad vespertas susceptus fuit, atque mox sequentia nobis phoenomena obtulit: praeter auris dextrae, in quam aeger ceciderat, susurrum, atque herniam scrotalem facili satis opera reponendam, atque illico bracherio munitam, nullum morbi symptoma comparet; appetitus adeo viget, sitis nulla, calor corporis sano similis est. Pulsus interim centum et septem ictus in primo minuto offert; paucam, vir structurae robustae, debilitatem accusat. Instituto extremitatum inferiorum examine, pars extrema pedis utriusque ad usque malleolos, quidquam rubescit ac oedemate turget. Digni pedis sinistri omnes, in totum, ex atro livent, sensu et calore naturali spoliati, mollesque. In pollicis parte inferiore, bulla, humore livido, transparente repleta, turget; ad rudiorum attactum, vel ad motum harum partium, dolor magnus exurgit; omnis calor istarum naturalis disparuit.

Per ungues, partes subjacentes lividae transparent. Dextri pedis digiti tres ultimi eodem modo se habent; pollex tamen hic prorsus sanus conspicitur, ac vicinus huic digitus in dorso minus aliis livescit. In pedis hujus dorso supra ultimos duos digitos ad dimidium pollicem etiam extensa livedo est. Plantae pedum, aspectum sanum conservant; ab attactu tamen in vicinia digitorum valde dolent; absque illo vero modo parum adfectae sunt.

Cum pulsuum frequentia, de parte, quam systema universum, a frigore ac sequente hoc artificiali calore, non parum adfectum, hoc de malo locali sibi assumeret, testaretur; cum nulla hucusque limitum gangraenae positorum vestigia se proderent; moschi optimi grana octo, opii grana duo, sacchari albi drachmas duas, in sex doses divisa, praescripsimus, atque singulo bihorio partem unam horum pulverum porreximus. Praeterea, aetheris sulphurici drachmam unam cum aquae menthae unciis sex commiscentes, istorum unciam unam post pulveres propinavimus. Ad partem adfectam, fomentatio, ex herbis aromaticis vino infusis, parata, tepide fuit adposita.

Die 20^a Nox quieta fuit; tumor oedematosus minor est hodie; dolor vero ardens in digitis perstat. Pulsus hesternis frequentiores sunt; calor major, cutis sicca est. Praeter pulveres praescriptos, decoctum corticis cum aethere sulphurico propinatum fuit. Partes gangraenosae cum infuso aro-

matico atque corticis decocto foveantur. Tussis hodie se prodit.

Die 21^a Nox satis placida, tussis rarior, alvus bis mota fuit. Abdomen tensum. Ardoris sensus in pedibus minor est, et gangraenae limites poni suppurationis in circumferentia illius vestigia comprobant. Pulsus elevationes, frequentes sunt, calor moderatus, et cutis submadida est. Pulveres, moscho quidquam aucto, omni trihorio porriguntur. Decocto corticis pro usu interno, et pulvis istius ad drachmas tres superadditur.

Vespere, tussis nulla, alvus bis mota fuit; abdomen non tensum, calor non tantus est, pulsus minus magisque elevati sunt. Pes sinister magis tumet, rubet ac dolet. Cortex in fomentis suspenditur.

Die 22^a Ob dolores pedum, nox minus quieta fuit. Aliquis nunc capitis dolor. Limites gangraenae evidentiores, inflammatione et suppuratione distincti sunt.

Die 23^a Nox fuit quietior. Dolores in pedibus non tanti sunt. Tumor oedematosus pedis sinistri ad malleolos extenditur cum superficiali inflammatione.

Die 24^a Nocte aeger copiose sudavit, et sudor hucusque continuat. Dolores in pede imminuti, pulsus minus frequentes, magis vero elevati sunt. Ob sudores profusos, suspenduntur pulveres.

Die 25^a Nox fuit placida, sudor nullus, calor et pulsus vix non naturales. Pes dex-

ter minus tumet, gangraena non proserpit; epidermis secedens separationem inchoat. Dolores non tanti sunt. In pede sinistro epidermis necdum separatur; duo vero digiti, pollicis vicini, reviviscere videntur.

Die 27^a Eodem pede res continuant, separatio absolvitur; foetor notabilis se prodit. Cortex nunc, ut vocant, in substantia porrigitur.

Die 30^a Nocte multum sudavit aeger. Partes gangraenosae magis separantur; tumor pedum paucus est. Ultimae phalanges digitorum in dextro pede, excepto pollice, nigerrimae sunt. In sinistro pede, trium ultimarum digitorum phalanges extremae insensiles observantur.

Die 3^a Decembris. Sudor per biduum continuavit, hac nocte vero nullus fuit. Suppuratio in pede sinistro larga, in dextro vero minor est. Adplicatur nunc partibus his unguentum digestivum cum camphora, ac fomentum aromaticum superimponitur.

Die 6^a Vires augentur, febris nulla est. Continuat gangraenae separatio.

Ad 10^{am} mensis aprilis 1799, in integrum fere aeger restitutus est. Separatae autem fuerunt, in pede dextro, trium ultimarum digitorum phalanges primae; in pede sinistro digitus minimus conservatus, vicini duo ad secundam phalangem separati fuerunt. Digitus primus a pollice, ipse-

que pollex sanati sunt. Fulcris suffultus aeger per cubiculum incedit (1).

EPICRISIS.

Non tanti quidem ponderis, et satis ordinaria foret praesens observatio, nisi ab illa nobis, aliqua de praepediendis deleteriis frigoris effectibus dicendi porrigeretur occasio. Ex gelu moderato, in aegro nostro, gangraena pedum, non ob aliam rationem, quam quod calido sese hypocausto is prompte nimis commiserit, insecuta est. Anno 1783 hiemali sub frigore, longe tamen rudiore, *Bruchsaliae*, ac vicinis in locis, octodecim circiter homines, ex eadem ratione, pedum gangraena correpti, partim mutilati, partim vero, proserpente ulterius male, enecti fuerunt. Major populorum septentrionalium, circa funestos frigoris intensioris effectus, experientia, rariores apud illos hos redderet, nisi frequens apud plebem spirituosorum abusus hanc ipsam copiose nimis eluderet. Cum, quatuor per annos in *Russia* degentes, tam potentem morborum in causam non minus, quam in rationem, qua coeli inclementis incolae ab illa se defenderent, oculos converterimus; non ignota quidem multis, sed

(1) Historiam hujus adfectionis adnotavit *Martinus Schmidt*, Hungarus, Medicinae Candidatus.

majori tamen numero utilia proferre hic possumus.

Haud rarum est *Petropoli*, thermometrum *Reaumurii* hiemali tempore, ad gradum *trigesimum*, vel *trigesimum* adeo *secundum*, sub congelationis puncto, descendere. Per plures interdum dies hocce gelu, diversis *Siberiae* in provinciis longe adhuc intensius atque constantius continuat; plerumque tamen mitius, ac viginti quinque, aut sex gradus non superans. Quodsi tanta caloris detractio, magnam viventibus perniciem jam sola minetur; majorem adhuc subitanea illa, nullibique tam notabilis, atmosphaerae ex temperata, in gelidissimam transitio, et quasi saltus est. Haud raro, matutinas ad horas, sub gradu frigoris primo, vel altero; — ad vesperras, sub vigesimo reversuri, domu exivimus. Sub gradu quidem frigoris *decimo septimo*, ex lege, clauduntur theatra; sed iisdem minore sub gelu apertis, post horam unam alteramve, saepe thermometrum quinque sexve gradibus descendit, dum interea rhedarii non minus, quam equi, etsi *Petropoli*, maxima theatrum ambiente in area, foci amplissimi decem excelsis succensi flammis continuo crepitent, vix non congelant. Resistunt tamen, et saepe ultra, matutinas usque ad horas, perflatis undique gelidissimis in atriis, hilari sub cantu, reluctantur istis aurigae, tum senes, tum decennes pueri; veniuntur et equi per horas multas, media in glacie, nec avena refecti, nec

ullo modo stragulis obtecti. Tanta scilicet contractae a primis vitae annis habitudinis firmique corporis habitus hunc bonum apud populum vis est atque potentia!

Nec tamen ideo subsidia, quae *artus* maxime defendant, *Russus* unquam postponit. Tunica quidem pellicia longior, corpus integrum, non tamen jugulum, quousque illa non pertingit, sed quod antè barba proluxa et profusa fovet, ac adumbrat, amplectitur. Pedum vero cura plebi longe est maxima: hos enim rustici, aurigae, operarii, multiplicibus cum pannulis vinciunt, tibialibus reticulatis involvunt firmantque, ac demum cum talaribus, ex pannulis intertextis paratis, custodiunt. Tunicarum manicis praeterea, super carpos extensis, sensibiliores ad frigus has partes muniunt; manus vero chirothecis pelliciis, densioribus quidem, flexilibus tamen, excepto pollice indivisis, ac medium fere ad brachium antè protensis, tuentur. Pileum, seu galerum, coloris ad lubitum varii, circa frontem pelle villosa et nigra ornatum, superiora versus ampliorem et quadratum, stuppa, vel et lana repletum, capiti simul ac auribus imponunt, omnemque sic frigoris effectum iniquum a calvaria avertunt.

Quodsi tamen, non obstante hac sollicitudine, intensissimo a gelu, aut nares aut genas auresque superficie quasi combustas, *albescere* in localem asphyxiam transire, ac vicinam sibi, aut sociis gangraenam in-

dicari conspiciant; ex momento aut nivem aut glaciem cum vola arripiunt, partesque sic adfectas solerter ac frequentius in die perfricant, atque sic cum stimulo vel minimo, sed magis adaequato, summae cutis astheniae succurrunt, calorem in partes quasi syderatas naturalem revocant, et hac ratione cum remedio millenis in casibus comprobato, absque ulla formidine, gangraenam indubie avertunt. Pro suo vero in homines peregrinos quoscunque, instantis sibi a frigore admisso periculi ignaros, favore, vix albescentes Russiae incolae, ad nares, genas, vel aures illorum maculas insurgere conspiciunt; cum illico eosdem discriminis advertunt, de patrii necessitate remedii admonent; atque si, forsitan idiomatis russici ignari, aut sortis propriae minus solliciti, ad hoc auxilium non promptius recurrant; ipsimet fraternum hoc opus benigni suscipiunt, instansque periculum dispellunt. Sic virgo germana, *Petropoli*, sub coelo rigidissimo, pedibus eleganter nimis calceatis ter centos vix passus absolvit, cum, sub scalarum ascensu, pedem sibi sinistram torpescere, et sub ingressu vix non deficere observat. Ridens illa, quod paucis a momentis claudicaret, amicam salutat. Haec vero, malorum ex frigore intenso non ignara, mox virginis incautae pedes tibialibus exui jubet, ac albescentem, ad sinistram ex illis, maculam sat amplam reperiens, more patrio ingens pedis emorituri periculum avertit. Ultimo, quo e *Russia* discessimus,

anno, mercator indigenus, cum urinam publica in platea lentius ac difficulter adversus ventum gelidissimum expelleret, summum ad genitalia frigus persensit. Domum interim reversus, et praegressi frigoris oblitus, anteriora corporis foco exponit; mox vero ab isto, penis gangraenam contrahit, ac partis hujus jactura multatur.

Magna certe saeculorum series requirebatur, donec dirae necessitas hominem, qua demum ratione se suamque prolem contra summam ac fere constantem coeli inclementiam defenderet, tandem edocuerit! meridionalis homo ipsius naturae filius praedilectus est; novercam haec agit in eum, qui, aut victus ab illo, aut ab adversa fortuna, aquilonares in regiones conjectus, et sale et farre privatus; nives inter et glaciem exsul vivere coactus fuit. Hunc interim, et ignis coeleste donum, et inexhausta mentis observandi experiundique dispositio, ab interitu servavit non modo, sed, corpore per labores, et ipsas atmosphaerae per injurias magis magisque firmato, facultate, qua propriam in fratre, blanditiis maternis enervato, exhausto, sortem vindicaret, et sua hunc haereditate frequentius expelleret, instruxit. Ab ipsa nempe coeli saevitie, quae fructus terrae nobiliores germinare prohibebat, aut progenitos ab ea, plenam ante maturitatem, jam crudeliter destruebat, tum plantas ac radices ad victum sibi necessarias, tum ipsas animalium, venatu, aucupio, piscatuae enecto-

rum, carnes, nivea quasi veste obvelari, et ab omni corruptione conservari, borealis ille homo mox edoctus fuit. Patrum suorum filiorumque dilectorum cadavera *Egyptus*, non sine maximis impensis, in *mumias* convertere, ac, dono satis vili, posteritati tradere didicerat; glacialis vero maris venator, copiam aquatilium, brevissima aestate eidem ereptorum, sibi superfluam, ripae, mare ipsius ab undis excavatae, immortalitatis sedi tutissimae, confidit, post plures annos; in aeternum duratura, incorrupta protrahit, ac in usus proprios convertit. Hunc vero in finem, duce iterum longiore rerum experientia, praedam, tot ab annis congelatam, aquae frigidissimae primum committit, ac eidem, contracto a frigore vix non coactae, novam minusque frigidam superaffundit, donec ita, duris antehac atque vix non saxeis carnibus, naturalem, et qualis primae fuit victimae, mollitiem restituat. Atque hujus beneficio industriae, imperante licet hieme saevissima, victualium omnis generis animalium in *Russiae* emporiis abundantia regnat. Huc etenim, traharum ope, centenis a miliaribus advectae merces hujus indolis, — huc boves integri, vituli, oves ac sues, — huc pisces marium balthici, albi, et caspii, fluviatiles, lacustres, huc alces, cervi tarangi, seu rangiferi, — huc alites volucresque omnimodae, — singula vero sub statu congelationis rigentia, concur-

runt, suae speciem resurrectionis ex frigida, et ignem culinarum expectant.

Non mollis ignaviae hi, ac vitae muliebris, quos sol meridianus excludit, fructus sunt; sed quidquid eorum nolenti naturae extorquetur quasi ac eripitur. Septentrionis id brachio carnoso non minus quam infesso debetur; ac omnis, quae partes sub gelu vix non emortuas revocare docet, scientia, frigidissimis illius provinciis adscribenda est. Sic populus *Sibiricus*, ad partem corporis congelatam ad vitam et functiones amissas revocandam, fortiter eandem, ut dictum est, cum nive perfricat. Vix aliqua hac in parte sensibilitas comparet; non amplius cum nive, sed cum frigida, haec frictio ab illo instituitur. Ubi brevioris durationis fuit congelatio, ac modo sub transitu ab uno habitaculo in alterum enata est; tunc, sicut in *Jakoutsk* in usu est, remedium magis promptum, in frictione partis adfectae cum lanae portione consistit. Quodsi membrum per tempus longum congelatum fuerit; tunc frictio non amplius cum nive, cum frigida, cum lana, perficitur; sed pars adfecta in tali casu nivibus, post istas vero, frigidae, *immergitur* diutius, atque his demum peractis, membrum perfricatur. Populi, quos *Jakoutski* vocant, et a quibus *Russiae* incolae hanc medendi methodum edocti fuerunt, postquam haec auxilia praemiserunt, mox partes, ante congelatas, cum excrementis vaccinis, aut cum argilla, aut cum utrisque inter se commistis, obducunt,

qua ratione, et cujus topici remedii subsidio, illius inflammatio subsequens praevertitur, ac tonus ejusdem restituitur. Tanta vero horum populorum hanc in methodum ponitur fiducia, ut quocunque sub itinere hiemali, quidquam longiore, ac ob gelu praemagnum ominoso, partes, quas frigori subducere haud queunt, hac specie cataplasmatibus obtegant, atque pro tempore custodiant (1).

Non prorsus incognita exteris hucusque retulimus; non minoris vero ponderis sunt ea, quae nobis saltem, dum mense maji 1808, *Moskwam*, antiquam Russiae Metropolim, petimus, nova fuerunt. Ante sex tunc annos, Principis *a Galitzin* munificentia, palatium, magnifice exstructum et amplum, pauperibus pro nosocomio concessum, atque cum omnibus hunc ad finem necessariis, reddituque annuo, pro 110 aegris plusquam sufficiente, instructum fuit (2). Ab utrisque hujus nosodochii medicis et chirurgis egregiis, Doctoribus *Mouchin*, et *Kryloff*, humanissime excepti, praeter alia, quae hoc in liberali miserorum hospitio notatu digna conspeximus, aegros duos, quorum pedes a gelu, per gangraenam, ad medium usque mutilati fuerant, observavimus. Frequenter, quavis hieme, haec infor-

(1) Vid. *Le Clerc*, histoire de la Russie ancienne. Tom. I. p. 320.

(2) Sumtus annui hujus nosodochii, ad 30,000 et 40,000 Rubelionum ascendunt.

tunia illis praecipue, qui, ebrietate correpti, tardius in plateis concidunt, perque horas, a nemine praetereuntium animadversi, jacent ac obdormiunt, hic loci, sicut *Petropoli*, contingere, nobis refertur; simulque novam sibi, jam aliquot ab annis, huic malo, jam plurimum neglecto, quoad ob sphacelum jamjam praesentem licet, mendedi rationem, et quidem hucusque inter omnes felicissimam, aequae ac simplicissimam, in usu esse, expertissimi hi viri exponunt. » Quandoprimum scilicet aeger, inquit, ad nosocomium cum gangraena, per congelationem partis inducta, deferitur, parsque sphacelata reliquis a carnibus separata fuit; ulcus ad istas relictum, continuo, ac donec cicatrix id omne obtexerit, cum glacie fovemus, atque sic dolores non minus, quam reliquam in parte, suspectam semper, inflammationem, ac abundantem nimis puris formationem, cum ingratis ejusdem effectibus, praeventimus. Ulceris ipsius confinibus, seu limbis, linteola oblonga, cerato obducta, ne lintea carpta illis sese nimis agglutinent, circumcirca imponimus. Filis tunc, ex linteo carptis, absque omni unguento et siccis, cum fascia, ulceri adplicitis, glacies continuo, et, quoties haec fusa est, nova admovetur. Ablatis vero semel in die, nec ultra, fasciis, aqua frigida, ope spongiae, ulceri ex alto superius inspergitur. Aegri, ob summum, quod abinde experiuntur, levamen, symptomatum, hanc frigidae inspersionem lubenter ipsimet

suscipiunt. » Ac revera , nostra in praesentia ; uterque aeger , et fasciam , et filios carptos , a plaga pedum , jamjam purissima et laete rubente , magna vero jam ex parte pulchra cicatrice obducta , demebat , frigidamque , cum quadam voluptate , maxima vero cum animi , in tantum remedium , gratitudine , pedibus , super patinam , quae aquas decadentes exciperet , sustentatis , copiosam superinstillabat.

Minora quidem , sub coelo apud nos clementiore , malorum similium pericula nos premunt ; non tamen ista , rigidior aliquando sub hieme , inter pauperes , et rusticolas , maxime autem inter milites , nostro aevo medias inter nives et glaciem castra ponere ac belligerare assuetos , tam inaudita sunt , ut proluxior eorum , quae frigoris partialis effectibus tum praepediendis , tum etiam cum successu felici pertractandis , convenient , expositionem , etsi non in omnibus novam , hic excusandam habeamus.

ERRATA

CORRIGE

Pag. lin.

IX	14	EX	et
5	3	rientium ,	rentium ,
11	15	petitur	petit
17	9	assumptum	assumptum , e così deve es- sere in varj luoghi ,
24	29	noctem	noctem
28	6	modum	modo
34	5	REPICISIS , in alcuni esemplari	EPICRISIS
37	7	tacta	facta
38	21	spectant ,	spectent ,
45	29	libere	libera
49	16	matris	matibus
50	28	ordinem	ordine
69	1	siccitas	siccus
73	29	sentimento	sedimento
76	29	deducitur	educitur
83	ult.	excitatu	excitato
85	27	propinatus	propinatur
90	29	iisde	iisdem
97	16	subsantiam	substantiam
99	6	in praecipiti	in praeceps
101	13	sinivit	sivit
107	17	tumiduscula	tumidiuscula
123	16	uterque	utriusque
135	2	tussi	tussis
141	12	pirae-	pre
ivi	19	morbosi	morbi
151	12	foramine	foramen
155	5	strangulatus	strangulatis
164	28	consumata	consumpta
174	14	asciscant	adsciscant
198	16-17	sommum	summa
227	27	textus	textus
266	24	exempta	exempla
304	3	Sauvagesimo	Sauvagesio
328	14	ammen	aemen
ivi	29	deletilis	deleterius





